

Zwei neue Lamiiden-Arten aus Somaliland (Ceramb. Col.)

Von S. Breuning, Paris

Mein lieber Kollege C. Koch, mit dem mich eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet, war so freundlich mir die Lamiiden seiner Ausbeute aus Somaliland zum Studium zu überlassen, wofür ich ihm hier meinen herzlichsten Dank ausspreche.

Unter dem gesammelten Material befanden sich zwei neue Arten, deren Beschreibungen hier folgen und deren Typen sich im Museum Frey befinden.

Chariesthes (s. s.) *kochi*, n. sp.

Gestreckt. Fühler um zwei Drittel länger als der Körper, das erste Glied ohne Narbe, dorsal merklich konvex. Halsschild seitlich kräftig ver-rundet. Decken parallelseitig. Prosternalfortsatz schmal, niedriger als die Hüften.

Dunkelbraun, weißlich tomentiert. Auf jeder Decke sechs runde, weiße, ziemlich schmal schwarz eingefaßte Makeln: eine seitlich unterhalb der Schulterbeule, eine disko-laterale premediane, eine laterale leicht schief hinter der zweiten gelegene, mit dieser zweiten mehr oder weniger verbundene, eine postmediane diskale, eine laterale leicht schief hinter dieser postmedianen gelegene und eine preapikale sublaterale. Fühler dunkelbraun tomentiert.

L ä n g e : 9-10 mm; Breite: $2\frac{1}{2}$ -3 mm.

Typ von Somaliland: Migiurtinia, zw. Scusciuban & Bender Beila, X-1959, leg. C. F. Hemming. – Ein Paratyp idem.

Die Art reiht sich neben *gestroi* Breun. ein.

Apomecyna (s. s.) *kochi* n. sp.

Sehr langgestreckt, cylindrisch. Fühler die Deckenmitte nicht erreichend, das dritte Glied etwas länger als das vierte, die Glieder fünf bis elf zusammen merklich länger als die Glieder drei und vier zusammen. Untere Augenloben merklich länger als die Wangen. Kopf und Halsschild dicht und sehr fein punktiert. Halsschild quer. Decken apikal sehr schwach abgestutzt (die Randecke wenig deutlich), dicht und fein punktiert.

Dunkelbraun, gelbbraun, auf dem Kopf und den Schenkeln mit weiß untermischt, tomentiert. Halsschild und Decken mit zahlreichen, ziemlich großen, aber unscharf ausgebildeten weißen Flecken besetzt. Die Fühlerglieder drei und vier weißlich tomentiert.

Länge: 16 mm; Breite: 5 mm.

Typ von Somaliland: El Dur, 8-VIII-1959, leg. C. Koch.

In meiner Bestimmungstabelle der afrikanischen Arten der Gattung *Apomecyna* Latr. (1960, Bull. de l'I. F. A. N., XXII, ser. A, p. 575) reiht sich diese Art bei der Nummer 11 ein und unterscheidet sich von *pseudotigrina* Breun. durch viel feiner punktierten Halsschild, feiner punktierte Decken, die Färbung etc.