

NOUVELLE ESPÈCE d'oiseau mouche, décrite par M. PARSUDAKI.

Ornysmia Isaacsonii. *Corpore supra aureo-viridi; caudâ fusco nigra, basi cuprèd: subtus collo viridi, abdomine viridi-cuprescente, caudâ latè viridi, tibiis albis, plumis caligatis: rostro recto nigro*.—L., 11 c. 1/2; du bec 28 m.—Partie supérieure et côtés du cou d'un vert doré peu brillant; couverture de la queue plus foncée et d'un rose cuivreux luisant; dessous de la queue d'un beau vert scintillant; celle-ci fourchue et d'un brun noir; front et gorge d'un vert métallique; ventre à reflets dorés se fondant avec le vert de la gorge et ressemblant à celui du jeune *O. Bonapartei*; ailes plus courtes que la queue, d'une couleur marron luisant, avec quelques plumes vertes aux épaules. Pieds semi-pattus, d'un brun clair; bec droit, noir dans toute sa longueur. Patrie, Santa-Fé de Bogota, très-rare.

Le port de cet oiseau rappelle l'*Ornysmia vestita*; il est plus grand et d'un plumage plus éclatant. Nous dédions cette intéressante espèce à notre ami J. F. Isaacson, amateur distingué, attaché au Jardin zoologique de Liverpool.

DESCRIPTION de dix Coléoptères de Chine, des environs de Macao, et provenant d'une acquisition faite chez M. Parsudaki, marchand naturaliste à Paris; par M. A. CHEVROLAT.

1. *Cicindela flavo-maculata*, Kollar.—Elle est indiquée, au catalogue de M. Dejean, comme variété de la *C. aurulenta* de Fab. Les différences qui l'éloignent du type, originaire de Java, sont : deux belles taches carrées cuivreuses sur le corselet; les quatre taches blanches des élytres plus étendues, 3^e constamment étroite, transverse : elles sont d'un indigo éclatant et velouté, base et suture d'un doré cuivreux plus brillant. L. 16, 19. L. 6, 6 3/4 mill.,

On ne doit la considérer que comme une variété locale de la *C. aurulenta*.

2. *Cicindela dorsolineolata*. — Brunnea, obscura. Labro (valido, septemdentato, margine punctis sex impresso) in mediâ parte, palpis (articulo apicali sed duobus penultimis maxillarum feminis, viridibus), mandibulisque (infra labium apertis) basi, flavis; capite et lateribus thoracis pectorisque infra, metallicis coloribus splendens. Caput valdè rugatum. Thorax scabriusculus, longior latitudine, lateribus rotundatus. Elytra elongata, sub-

parallela, ad apicem marginis subrectangulè rotundata, obsoletè punctata (punctis porosis), sericea; vittâ submarginali, extus humerum nascenti, ad apicem suturæ recurvâ, ultrâ medium intus obliquè et rectè ramosâ, lineolis tribus, vel tantum duabus anticis juxta suturam; aurantiacis. Corpus in latere parçé albo-setosum, abdomine nigro, polito, ad latera rugoso et viridi basi, 3° segmento recurvo acuto. — L. 12, 13. L. 4 1/2, 5 mill.

Les trois articles des tarses antérieurs du mâle sont allongés, élargis, et décroissent chacun de grandeur, les deux premiers sont sub-cylindriques, le troisième est un peu dilaté.

La lèvre chez ce sexe est comme tronquée antérieurement et munie de quatre dents sur la troncature. La lèvre de la femelle se prolonge en une pointe aiguë, et est fortement élevée en dessus au milieu. Elle avoisine la *C. lugubris* de Dejean.

3. *Cicindela Candei*. — Simillima *C. cancellatæ* Dej. et *catenatæ* Fab., sed differt staturâ majore, capite depresso; thorace planiore, elongato, lateribus parallelo, minutiore rugulosis; elytris longioribus, minutè et laxè punctatis; 5° articulo antennarum rubiginoso, etc., etc. Caput, thorax et scutellum cuprea, minutè coriaceo-rugulosa, densè albo-hirta. Mandibulis, palpis (art°. ultimo viridi), labio, elytrisque flavis. In elytris ramulis duobus communibus dorsalibus obscuro-cupreis, nigro fimbriatis, punctatis (punctis nigro-pupillatis); 1° ramulo, notis tribus elongatis et intricatis formato, duabus notis anticis parallelis posticè annexis, tertiâ longâ, obliquâ, suturæ junctâ: 2° ramulo subanchorali; limbo marginali angustè cupreo; epipleuris pallidis. Corpus subtus densè albo-villosum. Postpectus et abdomen medio viridicyanea, nitida. — L. 14, 15. Lat, 5, 5 1/2 mill.

J'ai cru devoir dédier cette espèce à M. de Maussion-Candé, commandant de frégate, que je n'ai pas l'honneur de connaître; je désire que ce navigateur, qui vient d'enrichir les collections d'espèces fort intéressantes, voie dans cette dédicace l'expression d'un sentiment d'estime et de gratitude.

Il serait à désirer que nos officiers de marine suivissent l'exemple de M. de Maussion-Candé et contribuassent avec le même désintéressement à l'avancement des sciences naturelles.

4. *Cicindela speculifera*. — Vicina *C. perplexæ*, Dej., subcylindrica, surdo-viridis, minutissimè coriacea. Labro, mandibulis basi, palpisque (art°. ultimo p. labiorum et duobus ulti-

mis, maxillarum; viridibus), pallidis. Elytra minutissimè rugulosa, punctata; feminae punctis fundo cyaneis; maris, obscurioribus; margine laterali (subtus lunulam humeralem interrupto), lunulis duabus, striga laterali media, punctoque infra; flavis; feminae, cum plaga speculifera quadrata in medio coleoptri versus extremitatem lunulae humeralis. — L. 12, 13. Lat. 4 1/2. 5 mill.

La lèvre, dans les deux sexes, est transverse, un peu sinueuse en avant. Elle offre au milieu une épine noirâtre. Le corps de la femelle, en dessus, est d'un vert un peu plus clair que chez le mâle, dont la couleur est obscure.

5. *Cicindela anchoralis*. — Similis *C. longipedi* Fab. viridicuprea. Palpis, mandibulis (apice piceis), labio, tibiis (extremitatibus piceis), tarsis basi, elytrisque albis: his rugosè punctatis, vittâ anchorali, cum lineolâ ponè humerum (in feminâ amplioribus); cupreis. Thorax truncatus, subconicus, anticè et lateribus longè pilosus. Pedes, præsertim postici, longi, trochanteribus rubris. Corpus nitidum, lateribus pectoris et abdominis basi scabroso-punctatis, albo-hirsutis. Tribus articulis anterioribus tarsorum maris lanatis, elongatis, 3^o dilatato. — L. 12, 13. Lat. 4 1/2, 6 mill.

La lèvre est tridentée au milieu dans l'un et l'autre sexe; seulement elle offre chez le mâle deux échancrures entre ces dents.

6. *Cicindela psammodroma*. — Affinis *C. tenuipedi* Guerini. Viridi-cyanea, nitida, minutissimè coriacea, palpis, mandibulis (apice, dentibusque exceptis), labio (unispinoso), elytrisque; albidis. Thorax truncatus, subconicus. Elytra elongata, ovalia, coriaceo-punctata, vittis quatuor haud integris (1^a sinuosa, 2^a obliqua), suturaque viridibus. Pedes longi, præsertim postici, trochanteribus, tibiis, et 1^o art^o. tarsorum, rubroflavoque pallidis. Corpus infra lateribus albo-setosum. — L. 10, 12, Lat. 3 3/4, 5 mill.

La lèvre est tronquée, étroite, munie d'une épine noirâtre au milieu. Des deux lignes cuivreuses sur chaque étui, la première est sinueuse, part de l'épaule et se dirige aux deux tiers de la longueur sur l'extrémité de la suture; la seconde est oblique, en dehors de la première, commence au delà du milieu, s'élargit près de l'extrémité; elle forme en dessous un petit angle, vers le milieu.

7. *Cicindela nivicineta*. — Viridi-metallica. Palpis (quatuor, articulo ultimo viridi), mandibulisque (apice, viridibus et nigris), pallidis; labio amplo, truncato, eburneo. Thorax minutè coriaceus rugatusque, inter sulcos quadratus, angulis posticis in tuberculo obtuso elevatis. Elytra brevía, plana, parallela, minutissimè rugulosa, crebrè, densè et sculptè punctata, punctis fundo cyaneis, limbo laterali latè albo-cincta, punctulato, limbo externo angustissimè cupreo. Pectus et abdomen longè albo-hirta. Pedes viridi, albo-setosi, trochanteribus et tibiis basi, rubro-pallidis. Mas. — L. 11, lat. 3 3/4 mill.

Cette espèce paraît être très-rapprochée de la *C. Gyllenhalii* de Dejean. Nous la classons à sa suite. La femelle offre sur chaque étui, avant le milieu, une plaque luisante en forme de miroir.

8. *Brachyaspidistes velatus*. — Apterus, griseo fuscoque variegatus; lateribus thoracis, elytrorum basi et femoribus quatuor posticis, calcariis. Caput et rostrum (thorace paululum longiora), vitta longitudinali in thorace (latitudine capitis), nigra. Rostrum latum, subcylindricum, modicè arcuatum, sulcis tribus, sulco medio subintegro, lateralibus post oculos limitatis, ad apicem costulatis. Thorax longitudine et latitudine media æqualis, lateribus parum ampliato-rotundatis, anticè et posticè truncatus, truncaturis cylindricis; inæqualiter tuberculatus, scabroso-foveatus, sulco longitudinali. Scutellum vix conspicuum. Elytra ob-ovalia, anticè conjunctim introrsum attenuata, subreflexa, apice singulatim subacuminata; squamis adhærentibus, coriaceis albido-griseo-fuscoque variegata; punctato-striata et angustissimè sulcata, interstitiis rotundè costulatis. femoribus, præsertim anticis, clavatis; tibiis quatuor anticis, cameratis, intus ordinatim spinulosis; 3º artº tarsorum valdè bilobo, duobus unguiculis mediocribus, basi adnexis, apice approximatis æqualibus. — L. 13, lat. amplissima 5 milli.

Ce genre fait partie de la fam. des Curculionides gonatocères et de la division des Brachydérides. Le *B. velatus* s'éloigne un peu des 3 espèces qui me sont connues, sa trompe étant plus longue, plus arquée, très-sillonnée. Sa forme rappelle celle d'un *Ophryastes*.

Clytus Macaumensis. — Similis Cl. *plebejo* Fab. villosulus, cinereus. Caput angustum, sulco longitudinali haud integro, oculis valdè emarginatis. Thorax obscurior, oblongo-rotun-

datus, in margine antico, posticoque, angustè nigro-reflexus et truncatus, punctis quatuor nigris, transversim positis: duobus dorsalibus conjunctis. Scutellum semi-rotundum, albidum. Elytra thorace duplo longiora, ad apicem modicè attenuata, in extremitate truncata, annulo oblongo humerali, fasciisque duabus nigris: 1^a antè medium, circumflexa, margine ampliata annuloque juncta; 2^a recta antè apicem. Pars corporis in quâ pedes inseruntur nigra. Pedibus et antennis nigricantibus, cinereo-tectis. — L. 11 1/2, lat. 4 1/2.

10. *Coptops annulata*. — Lanugine brevissima tecta, ferrugata. Corpore subtus, elytris infra basin usque ad tertiam partem apicalem semi-circulatim leucophæatis. Caput perpendiculare, sulco longitudinali; mandibulis atris, nitidis, arcuatis, in extremitate bidentatis, oculis mediocribus, rotundatis, supra truncatis, fuscis; antennis ferrugatis, infra villosis, 2^o 3^o-que articulis fere omnino nigris, sequentibus, apice nigricantibus. Thorax subquadratus, valdè convexus, apicibus rectus, ad basin et apicem lateribus angustè et sinuosè sulcatus (margine laterali infuscato), punctatus, punctis intus repletis, setosis. Scutellum griseum subquadratum, lateribus posticis rectangulis. Elytra subcylindrica, posticè declivia, thorace multo latiora, triplo longiora, apice singulatim rotundata, versus apicem subattenuata (humeris prominulis, obtusè rectangulis), punctata (punctis setiferis, anticè foveatis); in medio infra basin apicata, sutura elevata, costulisque duabus medianis leucophæatis, nigroque maculato-fasciculatis. Pedes inermes, breviusculi, validi, approximati, femoribus infra apice sulcatis, tibiis intus subsinuosis, tarsis nigricantibus. — L. 9 mil., lat. 5 1/2.

II. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

LISTE des animaux articulés cités jusqu'à présent comme se trouvant à la Nouvelle-Zélande, avec les descriptions de quelques nouvelles espèces; par MM. Ad. WHITE et Ed. DOUBLEVAY, aides à la partie zoologique du Mus. Britannique.

Classe CRUSTACEA.

1. *Paramithrax Gaimardii*, M. Edw. Hist. nat. des crust. I, p. 325, hab. la Nouv.-Zél. M. Edw.
2. *Chlorodius eudorus*. M. Edw. l. c. p. 402. *Cancer eudora* Herbst, III, pl. 51, f. 3. hab. la Nouv.-Zél. M. Edw.