

C. Antennes capillaires une fois et demie aussi longues que le corps. Corselet plus long que large.

List. collaris.

D. Antennes grêles, de la longueur du corps. Corselet allongé. Corps étroit.

List. tenuis.

La *L. Collaris*, Kl., semble établir le passage d'une subdivision à l'autre. Son corselet est allongé et ses cuisses vont s'épaississant insensiblement du milieu au sommet et d'une manière plus forte que chez les *L. carbonaria*, *aterrima* et *tenebricosa*, sans être en massue. De plus, elle n'offre, ainsi que chez les *thoracica* et *carbonaria*, que quelques vestiges d'aspérités sur le bord des élytres, et les antennes, chez ces trois dernières, sont plus longues et plus grêles.

II. Quinze espèces provenant du Vieux-Calabar (royaume de Bénin), à la côte occid. d'Afrique.

1. *Corethrogaster annulipes*. — Cinnamomeus. Capite rotundato anguste sulcato, geniculisque late nigris. Antennis flavis, palpis rufis. Thorace in dorso septem tuberculato, lateribus obtuse unidentato. Elytris acupunctatis obsoletis duabus lineolis costiformibus, postice rotundatis et parce fulvo setosis (*femina*). — Long. 23, lat. 8.

2. *OEme*, New. (*Sclerocerus*, Dej.), *nigrita*. — Fortiter et crebre punctata, nigra nitida pube rutila partiter induta. Antennis pedibusque validis. Capite magno, rotundato, rugoso antice profunde medioque supra vix sulcato, antennis undecim articulis planis elongatis. Thorace brevi, transverso, subrotundato, lateribus subangulato, antice recto (dein stricto) postice leviter bisinuato et marginato in longitudine postica sulcato. Elytris conjunctim rotundatis, ad medium unicastis. Abdomine quinque segmentis. — Long. 22 mill.; lat. 6.

Ce genre ne renfermait, jusqu'à présent, que des espèces américaines; il est donc intéressant d'en signaler une qui soit originaire d'Afrique.

3. *Smodicum ebeninum*. — Dense punctulatum, nigro-piceum, nitidum, antennis (11 articulis) pedibusque obscure rufis; capite

longitudine sulcatum. Thorace longiore quam latiore, ovali, antice posticeque recto, vix marginato, in dorso circulatim depresso. Elytris rotundatis, bicostatis. Corpore infra nitidior. Abdomine quinque segmentis. — Long. 15 mill.; lat. 4 1/2.

Même observation que pour l'Æme.

4. *Monohammus Thomsoni*, Affinis Lam. Lusæ, F. — Vage punctata, fusca. Mandibulis oculisque nigris, capite longitudinaliter sulcato, antennis pubescentibus, apice infuscatis. Thorace transverso, antice (cinereo breviter et dense piloso) posticeque recto, lateribus acute et valide spinoso. Scutello albo. Elytris cum macula communi magna scutellari alteraque laterali ampla virguliformi atro-holosericeis (femina). — Long. 20 mill.; lat. 7 1/2.

Je me suis fait un plaisir de dédier ce bel insecte à M. Thomson, de qui M. Murray a obtenu tant de magnifiques espèces de ce pays.

5. *Pachystola annulicornis*. — Cinereo-glauc. Capite antice cervino, postice fusco-variegato, longitudine sulcato, mandibulis oculisque nigris, antennis nigris cum tertio articulo apice quartoque basi cervinis. Thorace transverso, antice posticeque (bistricto) recto, lateribus breviter unispinoso, fusco irrorato, vittis tribus glaucis; scutellomagno semirotundata. Elytris remote et subseriatim punctatis glaucinis, cum macula magna scutellari vittaque laterali arcuata, intus ramosa, fuscis. Corpore infra cinerascens, lateribus abdominis fusco-maculatis. — Long. 25 mill. 1/2; lat. 8 1/2.

6. *Pachystola arcuata*. — Fusca. Mandibulis oculisque nigris. Capite truncato, inter oculos angusto et inter antennas angulosim emarginato. Antennis crassis, acutis. Thorace transverso, inæqualiter plicato, antice posticeque recto, lateribus late et acute spinoso. Elytris cum maculis duabus brunneis: prima decussata (e scutello ad mediam marginem); secunda laterali (infra humerum ibique grosse punctata. Vitta alba pectorali. — Long. 23 mill.; lat. 7 1/2.

7. *Tragocephala Galathea*. — Nigra holosericea. Vittis tribus (una antica, duabus lateralibus ad verticem) in capite, duabus lateralibus in thorace. Elytris (tertia parte nigra) croceis; abdomine (nigro trifariam maculato) pedibusque cinereis. Femoribus partim denudatis nigris. Capite rotundato, omnino anguste sulcato. Thorace longiore quam latiore, bistricto, lateribus angulosim dentato. — Long. 18 mill.; lat. 5 3/4.

8. *Sternotomis Murrayi*, valde affinis *St. Amænæ*, West. — Parce punctata, nigro-holosericea. Maculis duabus anticis lineaque

superciliari in capite, lineis tribus longitudinalibus (linea dorsali medio attenuata postice ampliata) in thorace, duabus maculis magnis subanguliformibus duabusque minutis suturalibus in elytris, pectore et abdomine lateribus virenti-albidis (*mas et femina*). — Long. 30, 32; lat. 10, 12 mill.

Je dédie cette nouvelle et belle espèce à M. Andrew Murray, d'Edimbourg, qui s'est montré envers moi d'une rare générosité. Je suis heureux de trouver ici l'occasion de le remercier.

9. *Prosopocera myops*. — Fusca. Mandibulis oculisque (fulvo limbatis) nigris. Capite rotundato, anguste (inter antennis cruciatim) sulcato. Thorace subtransverso, quadristricto, antice recto fulvo dense setoso, postice profunde sinuato, spina laterali brevi acuta. Elytris, præsertim dorso, cinereo-infuscatis maculis duabus ocellaribus nigris ante medium. Pectore cum vitta laterali albida (*femina*). — Long. 32 mill.; lat. 10 1/2.

10. *Tecton* (1) *quadrisignatum*. — Indumento cervino cinereoque indutum; lineolis quatuor nigris duabus in thorace duabusque in elytris basi. Capite magno, lato, inflecto infra et truncato, in vertice transversim convexo, longitudine antica carinato posticaque sulcato. Clypeo transverso. Labio subquadrato dense piloso. Mandibulis latis, planis nigro-nitentibus, apice tantum acutis. Oculis magnis, bifidis. Antennis corporis longitudine, undecim articulis elongatis et subæqualibus. Thorace latitudine capitis, prope basim anguste constricto, cum lineola nigra oblique posita in angulo postico, antice recto, postice leviter bisinuato versus latera, in dorso obsolete costato. Scutello semi-rotundato magno. Elytris mediocriter punctatis, cinereis, lineolis leucophæis sæpe obliquis versus apicem, lineolaque nigra intra humerum basi, thorace vix latioribus, cylindraceis. Abdomine quinque segmentis. Pedibus brevibus brunneis, tibiis subtriangularibus, mediis extus modice emarginatis, tarsis pallidis (*mas*). — Long. 20; lat. 7.

11. *Temnoscelis* (2) *Waddeli*. — Alatus, obscurus, infra violaceo-bituminosus. Capite exserto, antice truncato et cruciatim costato, inter antennis profunde emarginato, longitudine angustissime sulcato. Labro quadrato, villosus, antice modice fisso. Oculis profunde emarginatis. Mandibulis minutis atris. Palpis piceis. Anten-

(1) Τέκτων, charpentier.

(2) Τεμνω, entailler; σκέλος, jambe. Je compte donner plus tard des caractères plus détaillés de ces deux genres, et dont le premier vient remplacer en Afrique les *Oncideres* Américains.

nis corporis longitudine, nigro flavoque dense et longe villosis, undecim articulis, 1° valido ad apicem angulato, magna macula nigra albo fimbriata signato. Thorace latiore quam longiore, antice posticeque recto in lateribus angulosim et acute spinoso, in medio dorso carinis duabus litteram V tresque angulos efficienti. Scutello parvo, rotundato. Elytris elongatis, thorace latioribus, basi et apice truncatis, in angulo humerali spinulosis, fuscis cum maculis tribus atrohosericeis albido fimbriatis : prima parva, circumflexa, suturali ante medium ; secunda elongata, angulata ultra medium exhibenti lineam albam antice obliquam postice curvatam versus latera ; tertia apicali exhibenti lineam albam antice curvatam intusque bifidam. Abdomine quinque segmentis ultimo longiore quarum tribus puncto albo margine albomaculatis. Pedibus elongatis, femoribus sat validis, planiusculis, tibiis extus angulatis et profunde emarginatis ortu. — Long. 31 mill. ; lat. 8 $\frac{3}{4}$.

Dédié à M. Waddel comme souvenir des beaux envois d'insectes qu'il a faits à son ami M. A. Murray.

Ce nouveau genre paraît devoir être placé près du *Mastigocera*, Dejean. Il est remarquable sous plus d'un rapport, et particulièrement par ses jambes, anguleuses en dehors et profondément évasées près de leur naissance.

12. *Phrissoma bufo*. — Alatum bigibbosum remote et fortiter punctatum et obscurum. Capite antice truncato et grosse punctato, declivi in vertice et impunctato, in longitudine anguste sulcato, inter antennas profunde emarginato, clypeo labioque fulvo-setosis. Mandibulis atris. Oculis parvis bifidis. Antennis undecim articulis 3-4 longissimis. Thorace elongato, antice posticeque recto, medio gibboso nigricante et binodoso, lateribus breviter unispinoso supra et ultra medium. Scutello lato, triangulari. Elytris basi depressis (bispinosis), subitoque dorso gibbosis cum seriebus duabus tuberculorum, ad marginem obtuse serratis. Abdomine quinque segmentis. Femoribus tibiisque versus medium nigro-annulatis tibiis in apice extus subemarginatis fulvo-pilosis. — Long. 11 mill. ; lat. 5.

13. *Parmena callizona*. — Alata, impunctata, plumbea. Capite antice truncato, angustissime sulcato, inter antennas angulosim emarginato. Palpis rufo piceis. Antennis undecim articulis, 3° longissimo, 1° et 4° subæqualibus, ultimis brevibus. Thorace cylindraceo, antice posticeque recto ibique prope arcte bistricto, lateribus acutissime spinoso. Scutello albo. Elytris ad apicem sensim

latioribus et dorso convexis breviter truncatis apice extusque obtuse unidentatis, punctato-striatis, cinereo indutis cum fasciis duabus atro-brunneis, duabusque albis. Tibiis quatuor posticis in summo extus subampliatis pallide setosis. — Long. 11 mill.; lat. 4 1/2.

14. *Glenea*, New. (*Sphenura*, Dej.), *quinquelineata*. — Remote punctata, atra, holosericea. Capite vittis quatuor thoraceque quinque albidis (tribus supra, duabus infra). Scutello nigro. Elytris lateritiis, fasciis tribus atris cum macula transversali flava ante apicem. Abdomine albo maculis lateralibus lineolisque transversalibus medio atris. Palpis pedibusque rufis. — Long. 15 mill.; lat. 5.

15. *Glenea carneipes*. — Sat fortiter punctata, parce nigro pilosa, nigra. Vittis duabus in capite, tribus (duabusque infra) in thorace, scutello, quinque maculis (prima elongata) in singulo elytro cum limbo marginis, macula pectorali, lateribus abdominis: albis. Palpis pedibusque rufis. Capite rotundato. Thorace longior latitudine, longitudine convexo. Elytris ad marginem unicastato-sulcatis, apice emarginatis et bidentatis (*femina*). — Long. 7 mill.; lat. 2.

III. Deux espèces des montagnes Rocheuses.

Desmocerus aureipennis. — Rugulosus, nigro-cyaneus, infra cinerascens pube alba indutus. Thorace subtriangulâri, antice recto, postice bisinuato, marginato, ad medium infra tuberculato (tuberculo apice truncato), angulis posticis acutis. Elytris aurantiâcis, ruge et crebre punctatis. Pedibus rugose punctatis, tarsis infra luteis. — Long. 23 mill.; lat. 7 1/2.

Leptura militaris. — Crebre punctata, cyaneo-obscura. Thorace triangulâri, antice posticeque recto, angulis posticis divergentibus, acutis. Elytris ad apicem latioribus, in humero angulosim croceo signatis. Antennis tarsisque (1^o articulo tarsorum posticorum longissimo) nigris. — Long. 6 mill.; lat. 2.

NOTE sur la Trigone fulvipède, par M. FELIPE POEY, de la Havane.

L'article que j'ai publié dans mes *Mémoires sur l'histoire naturelle de l'île de Cuba*, au sujet de la Trigone fulvipède de M. Guérin, renferme une erreur essentielle, c'est d'avoir méconnu le mâle de cette espèce, l'ayant confondu avec la femelle non fécondée. J'ai annoncé qu'il y avait dans chaque ruche environ un mil-