IOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OECONOM. ET CAMERAL. P. P. O.

SOCIET. HAFN. NORW. NAT. CVRIOS. BEROL. LIPS. LVND.

PETR. OECON. TAVR. LOND. HIST. NAT. IENENS.

BOVRD. NEC NON PARIS. AGRICVLT. HIST. NAT.

ET PHILOM. MEMBR.

SYSTEMA ELEVTHERATORVM

SECVNDVM

ORDINES, GENERA, SPECIES:

ADIECTIS

SYNONYMIS, LOCIS, OBSERVATIONIBVS, DESCRIPTIONIBVS.

TOMVS II.

KILIAE

IMPENSIS BIBLIOPOLII ACADEMICI NOVI.

1801.

7. P. ferrugineus, elytris teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 241. 3. * *minutus.*

Habitat in Americae meridionalis Inſulis. Dom. Smidt.

Corpus vix pediculo maius.

134. PRIONVS.

Palpi quatuor, filiformes.
Maxilla cylindrica, integra.
Ligula breuiſſima, membranacea.
Antennae ſetaceae.

1. P. thorace crenato, marginato, vnidentato, ater, elytris apice crenato-dentatis, thorace canaliculato. Ent. ſyſt. 2. 242. 2. * *fuliginoſus*

Habitat in America. Muſ. Brittann.

2. P. thorace marginato, vnidentato, rufo: mandibulis inflexis, acutis, ſterno ſpinoſo. Ent. ſyſt. 2. 243. 3. * *roſtratus.*

Prionus roſtratus. Oliv. Inſ. 2. 66. t. 10. f. 37.

Habitat in Siam. Muſ. D Banks.

3. P. thorace marginato, crenato, vnidentato, niger, albo-vittatus, elytris apice crenato-dentatis. Ent. ſyſt. 2. 243. 4. * *lineatus.*

Cerambyx lineatus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 624. 14. Sloan. Jam. 209. tab. 237. fig. 34.

Brown.

Prioni corpus magnum, oblongum, depreſſum, glabrum, tardum; *capite* magno, transuerſo, plano, inſerto; *oculis* transuerſis, reniformibus, marginalibus; *antennis* diſtantibus, elongatis, ſupra mandibulas inſertis; *thorace* plano, marginato: margine ſaepius dentato; *ſcutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, immarginatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiuſculis, curſoriis; *tarſis* quadriarticulatis; *colore* ſaepius obſcuro

Brown. Jam. 430. tab. 43. fig. 7.
Herbſt. Arch. tab. 32. fig. 1.
Habitat in America. Muſ. Brittann.

nitidus. 4. P. thorace marginato, crenato, vnidentato, cyaneo, nitidus, elytris cupreis. Ent. ſyſt. 2. 243. 5. *

Prionus nitidus. Oliv. Inſ. 3. 66. t. 12. f. 48.
Habitat in Braſilia. Muſ. Dr. Hunter.

Faber. 5. P. thorace marginato, vtrinque vnidentato, elytris piceis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 244. 6. *

Cerambyx Faber. Linn. ſyſt. Nat. 2. 622. 6.
Fn. Sv. 646.
Panz. Fn. Germ. 9. tab. 5.
Friſch. Inſ. 13. 22. tab. 17.
Schaeff. Icon. tab. 72. fig. 3.
tab. 111. fig. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 50. 1.
Habitat in Europae ramis.

ſcabricornis. 6. P. thorace ſubmarginato, vnidentato, ſubuilloſus, nigricans, elytris fuſcis: lineis duabus elevatis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 244. 7. *

Prionus ſcabricornis. Scopol. Carn. 174.
Cerambyx ſcabricornis. Oliv. Inſ. 66. tab. . fig. .
Fuesly Inſ. Helv. 13. 241. tab. 1. fig. 3.
Geoff. Inſ. 1. 210. 6.
Habitat in Europa auſtraliori. Muſ. D. Olivier.

depſarius. 7. P. thorace ſubmarginato, vnidentato, pubeſcente, corpore nigricante, antennis breuibus rubris. Ent. ſyſt. 2. 244. 8.
Cerambyx depſarius. Linn. ſyſt. Nat. 2. 624. 12.
Panz. Fn. Germ. 9. tab. 7.
Schaeff. Elem. tab. 67. fig. 3.

Payk.

Payk. Fn. Sv. 3. 52. 3.
Habitat in Svecia. Muſ. Dom. Zſchuck.

8. E. thorace ſubmarginato, vnidentato, pubeſcence, corpore pallido, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. ſuppl. 141. 8. * *pallens.*
Habitat in Africa. Muſ. D. Lund.

9. P. thorace marginato, bidentato, elytris mucronatis, rufis. Ent. ſyſt. 2. 244. 9. * *mucronatus.*
Habitat in America. Muſ. D. Drury.
Corpus tomento aureo villoſum.

10. P. thorace bidentato: dentibus arcuatis, niger, elytris obtuſis, teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 245. 10. *arcuatus.*
Habitat in Terra Diemenii. Muſ. Dom. Banks.

11. P. thorace marginato, tridentato, niger, elytris cinereo-maculatis. Ent. ſyſt. 2. 245. 11. * *maculatus.*
Prionus maculatus. Oliv. Inſ. 66. tab. 4. fig. 14.
Habitat in Senegallia. Muſ. Gall.

12. P. thorace marginato, vtrinque tridentato, mandibulis porrectis, extus vniſpinoſis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 245. 12. * *ceruicornis*
Prionus ceruicornis. Oliv. Inſ. 66. tab. 2. fig. 8.
Cerambyx ceruicornis. Linn. ſyſt. Nat. 2. 622. 3. Muſ. Lud. Vlr. 65.
Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 6.
Merian. Sur. tab. 48.
Roeſ. Inſ. 2. ſcaráb. 2. tab. 1. fig. 8.
Brown. Jamaic. tab. 44. fig. 8.
Aubent. Miſcell. tab. 90. fig. 3.
Voet. Coleopt. 2. tab. 2. fig. 45.
Habitat in Americae ligno Bombacis.
Larua edulis in deliciis.

bupbtalmus. 13. P. thorace vtrinque tridentato, ater, nitidus, antennis breuibus: articulis vltimis, apice ſpinoſis. Ent. ſyſt. 2. 246. 14. *

Prionus ſpinicornis. Ent. ſyſt. 2. 245. 13. *

Prionus tranquebaricus. Ent. ſyſt. ſuppl. 141. 10. *

Huſſarus Ceylonenſis. Voet. Coleopt. 2. tab. 3. fig. 11.

Habitat in India orientali. Muſ. D. Lund.

forficatus. 14. P. thorace vtrinque tridentato, ater, elytris ferrugineis, antennis comprellis, breuibus, mandibus elongatis, forficatis, extus vnidentatis. Ent. ſyſt. ſuppl. 141. 15. *

Habitat in Tanger. Dom. Schousboe. Muſ. Dom. Lund.

breuicornis. 15. P. thorace marginato, tridentato, atro, nitido: dente poſtico obtuſiſſimo, antennis breuibus.

Habitat in America boreali.

Statura et ſumma affinitas P. coriarii. Diſtinctus tamen videtur, paullo maior, antennis aliquanto breuioribus, thorace latiore, nitido: dente poſtico obſoleto.

coriarius. 16. P. thorace marginato, tridentato, corpore piceo, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 246. 15. *

Prionus coriarius. Oliv. Inſ. 66. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 198. tab. 3. fig. 9.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 622. 7. Fn. Sv. 647.
Degeer Inſ. 5. 591. tab. 3. fig. 5.
Roeſ. Inſ. 2. Scar. 2. tab. 1. fig. 1. 2.
Schaeff. Elem. tab. 102.
Icon. tab. 67. fig. 3.
tab. 9. fig. 1.
Panz. Fn. Germ. 9. tab. 8.
Friſh. Inſ. 13. tab. 9.

Payk. Fn. Sv. 3. 51. 2.
Habitat in Europae Betulis putridis.

17. P. thorace vtrinque bidentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis breuibus. Ent. *gigantеus.* syst. 2. 247. 16. *

Cerambyx giganteus. Linn. Mant. 1. 531.
Oliv. Inf. 66. tab. 6. fig. 21.
Aubent. Miscell. 1. tab. 64. fig. 2.
Habitat in Cajenna.

18. P. thorace marginato, tridentato, obscurus, pectore abdomineque ferrugineis, antennis breui- *cylindricus*
bus. Ent. syst. 2. 247. 17. *
Cerambyx vnicolor Drury. Inf. 1. tab. 37. fig. 1.
Habitat in America boreali. Dom. Blackburn.

19. P. thorace marginato, vtrinque quadridentato, elytris ferrugineis, nigro-marginatis. Ent. syst. *armillatus*
2. 247. 18. *
Priomus armillatus. Oliv. Inf. 66. t. 5. f. 17.
Cerambyx armillatus. Linn. syst. Nat. 2. 622. 4.
Petiv. Gazoph. 525. tab. 15. fig. 6.
Habitat in India.

20. P. thorace marginato, multispinoso, mandibulis porrectis, vnidentatis, apice bifidis, pedibus an- *Luzonum.*
ticis elongatis. Ent. syst. 2. 247. 19. *
Petiv. Gazoph. tab. 74. fig. 1.
Habitat in Insulis Luzonum. Mus. Britt.

21. P. thorace marginato, multispinoso, mandibulis porrectis, apice tridentatis, pedibus spinoso- *serripes.*
serratis. Ent. syst. 2. 248. 20. *
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

22. P. thorace marginato, multidentato, mandibulis porrectis muticis. *mandibularis.*
Oliv. Inf. 66. tab. 8. fig. 31.

Ha-

Habitat in America meridionali. Dr. Pflug. Muſ. D. Lund.

Magnus in hoc genere. Mandibulae capite thoraceque longiores, lunatae, acutae, omnino inermes. Caput canaliculatum, punctatum. Thorax planus, inaequalis, margine multidentato. Elytra picea, apice mucronata.

damicornis 23. P thorace marginato, denticulato, mandibulis porrectis, bidentatis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 248. 21. *

Cerambyx damicornis. Linn. Mant. 1. 532.
Degeer Inſ. 5. 97. 2.
Drury Inſ. 1. tab. 38. fig. 1.
Habitat in America.

bifaſciatus 24. P. thorace marginato, denticulato, corpore nigro, elytris rubris: faſciis duabus, atris, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 248. 22. *

Cerambyx bifaſciatus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 624. 16.
Gron. Zooph. 532. tab. 14. fig. 4.
Habitat in America.

Thomae. 25. P. thorace marginato, crenulato, corpore nigro, elytris glabris, ferrugineis: margine luteo. Ent. ſyſt. 2. 248. 23. *

Cerambyx Thomae. Act. Soc. Berol. 4. tab. 7. fig. 9.
Habitat in Inſula St. Thom. Americae.

bilineatus. 26. P. thorace marginato, albo, bilineato, elytris ferrugineis: atomis albis margineque luteo. Ent. ſyſt. 2. 249. 24. *

Habitat in America. Dom. v. Rohr.
Vix a praecedente ſatis diſtinctus.

Amazonus 27. P. thorace marginato, denticulato, cyaneus, elytris baſi faſciaque rufis, apice aeneis.

Voet.

Voet. Col. tab. 2. fig. 8.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. de Seheſtedt.
Statura parua P. Thomae. Caput canaliculatum, cyaneum. Mandibulae exſertae, apice bifidae. Antennae longitudine corporis, cyaneae. Thorax inaequalis punctatus, cyaneus, magis obſcurus margine multidentato. Elytra punctata, cyanea: margine exteriori baſeos vsque ad faſciam faſciaque lata pone medium ruſis. Elytra pone faſciam aenea, nitida. Corpus cyaneum, nitidum.

28. P. thorace marginato, crenato, capite ſub mandibulis ſpinoſo, mandibulis tridentatis. Ent. ſyſt. 2. 249. 25. * *ſpinibarbis*
Cerambyx ſpinibarbis Linn. ſyſt. Nat. 2. 624. 4. Muſ. Lud. Vlr. 67.
Merian. Surin. 24. tab. 24.
Habitat in America meridionali.

29. P. thoracis lateribus ſcabris, multidentatis: dente poſteriori palmato, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 249. 26. * *palmatus.*
Oliv. Inſ. 66. tab. 7. fig. 25.
Habitat in Guinea. Muſ. D. Banks.

30. P. thoracis lateribus ſcabris, multidentatis, mandibulis breuibus, hirtis, dentatis. *dentatus.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.
Statura P. maxilloſi, paullo minor. Mandibulae exſertae, capite multo breuiores, latae, intus dentatae, acutae. Caput punctatum, canaliculatum. Thorax minus planus, punctatus, lateribus ſcabris, multidentatis. Elytra laeuia, picea, apice rotundata.

maxillosus 31. P. thorace marginato, crenato, mandibulis porrectis, intus hirsutis, quadridentatis. Ent. syst. 2. 249. 27. *
Oliv. Ins. 66. tab. 1. fig. 3.
Drury Ins. 1. tab. 38. fig. 3.
Habitat in America. Mus. Britt.

canaliculatus. 32. P. thorace marginato, crenato: canali dorsali albo, villoso, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 250. 28. *
Habitat in Americae Insulis. Mus. Dr. Hunter.

cinnamomeus. 33. P. thorace marginato, denticulato, mandibulis porrectis, tridentatis. Ent. syst. 2. 250. 28. *
Cerambyx cinnamomeus. Linn. syst. Nat. 2. 623. 10. Mus. Lud. Vlr. 66.
Oliv. Ins. 66. tab. 5. fig. 18.
Drury Ins. 1. tab. 40. fig. 2.
Sulz. Ins. tab. 5. fig. 2.
Merian Surinam. tab. 24.
Habitat in America meridionali.

melanopus 34. P. thorace marginato, dentato, mandibulis porrectis, multidentatis, elytris mucronatis. Ent. syst. 2. 250. 30. *
Cerambyx melanopus. Linn. syst. Nat. 2. 623. 8.
Cerambyx crenulatus. Drury Ins. 1. tab. 38. fig. 2.
Merian Surinam. tab. 24. fig. 1.
Habitat in America meridionali.

crenatus. 35. P. thorace marginato, crenato, elytris ferrugineis, capite canaliculato nigro.
Habitat in India. D. Smidt.
Magnus. Antennae nigrae, longitudine corporis. Mandibulae breues, crassae, medio interiori vnidentatae. Caput valde canaliculatum, nigrum. Thorax planus, marginatus: margine prominulo,

lo, crenato, obſcurus, in medio maculis duabus eleuatis, atris. Elytra rugoſa, ferruginea. Corpus obſcurum.

36. P. thorace multidentato, nigro, elytris vniden- *ſpinoſus.*
tatis, teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 250. 31. *
Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.

37. P. thorace marginato, integro, mandibulis fer- *barbatus.*
rugineo - hirſutiſſimis, antennis mediocribus.
Ent. ſyſt. 2. 250. 32. *
Habitat in America meridionali. Muſ. D. Banks.

38. P. thorace ſubemarginato, mutico, teſtaceus, an- *pectinicor-*
tennis breuibus pectinatis. Ent. ſyſt. 2. 251. *nis.*
33. *
Oliv. Inſ. 66. tab. . fig. .
Habitat in Senegallia. Muſ. Dom. Geoffroy.

39. P. thorace ſubemarginato, mutico, piceus, man- *muticus.*
dibulis exſertis, dentatis, antennis breuibus, ſimplicibus.
Habitat in America boreali. Muſ. Dom. Banks.
Affinis videtur P. pectinicorni. Corpus paruum, totum piceum. Caput punctatum, mandibulis exſertis, medio vnidentatis apiceque emarginatis. Antennae breues, fere moniliformes: articulo primo craſſiori, vltimis compreſſis. Thorax punctatus, vix marginatus, muticus. Elytra punctata.

135. CERAMBYX. *Palpi* quatuor, filiformes.
Maxilla obtusa, vnidentata.
Ligula bifida.
Antennae setaceae.

longimanus. 1. C. thorace spinis mobilibus, elytris basi vnidentatis apiceque bidentatis, antennis longis.
Prionus longimanus. Ent. syst. 2. 242. 1.
Oliv. Ins. 66. tab. 3. fig. 12.
tab. 4. fig. 12.
Linn. syst. Nat. 2. 621. 1. Mus. Lud. Vlr. 64.
Degeer Ins. 5. 102. 6.
Sloan Jam. 2. 209.
Grew. Mus. 161. tab. 13.
Roes. Ins. 2. Scarab. 2. tab. 1. fig. 2.
Aubent. Miscell. tab. 64. fig 1.
Habitat in America meridionali.

moschatus. 2. C. thorace spinoso, viridis, nitens, antennis mediocribus, cyaneis. Ent. syst. 2. 251. 1.
Linn. syst. Nat. 2. 627. 34. Fn. Sv. 652.
Oliv. Ins. 67. tab. 2. fig. 7.
Degeer Ins. 5. 64. 2.
Geoff. Ins. 1. 103. 5.
Frisch. Ins. 13. tab. 11.
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 7.
tab. 55. fig. 1.

Voet.

Cerambycis corpus oblongum, angustum, depressiusculum, glabrum, inmarginatum, tardum; *capite* ouato, inserto; *oculis* paruis, rotundatis, marginalibus; *antennis* elongatis, inter oculos insertis; *thorace* plano, rotundato, inaequali, vtrinque spinoso; *scutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis, cursoriis; *femoribus* compressis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario, interdum nitido.

Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 14.
Habitat in Europae Salice Moſchum ſpirans.

3. C. thorace rotundato, ſpinoſo, corpore viridi, fe- *virens.*
moribus rufis. Ent. ſyſt. 2. 252. 2.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 627. 38.
Oliv. Inſ. 67. tab. 11. fig. 78.
Drury Inſ. 1. tab. 40. fig. 1.
Brown Jam. tab. 43. fig. 8.
Habitat Larua in truncis Amyris balſamiferae Americis.
Imago Eugeniam Jambos ſpirat Dr. Schwarz.
Variat antennis corpore longioribus et breuioribus, femoribus dentatis et muticis, corpore viridi et cyaneo.

4. C. thorace rotundato, ſpinoſo, cyaneus, femoribus *albitarſus.*
dentatis, rufis, tarſis poſticis niueis.
Habitat in Isle de France. Dom. Daldorff.
Statura C. nitentis, paullo maior. Caput cyaneum, nitidum, antennis corpore longioribus, nigris. Thorax inaequalis, ſpinoſus et elytra cyanea, nitida, immaculata. Pedes nigri, femoribus dentatis, rufis. Tarſi poſtici niuei.

5. C. thorace rotundato, ſubſpinoſo, viridi-nitens, *nitens.*
femoribus clauatis; claua anticorum rufa. Ent. ſyſt. 2. 252. 3.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 107.
Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 15.
Habitat in Africa aequinoctiali. Muſ. D. Banks.

6. C. thorace ſpinoſo, aureo, viridi-nitens, elytris *micans.*
cyaneis: ſutura viridi.
Habitat in Guinea. Dom. Meier. Muſ. D. Lund.
Statura et magnitudo C. feſtiui. Caput viride, nitens, antennis corpore longioribus, nigris. Thorax rotundatus, ſpinoſus, aureus, nitidus. Elytra

tra cyanea, futura late viridi. Corpus aeneum, nitidum. Pedes nigri, femoribus quatuor, anticis clauatis, rufis, poſtici clauati, compreſſi.

ater. 7. C. thorace rotundato, ſpinoſo, corpore viridi, antennis pedibusque rufis. Ent. ſyſt. 2. 252. 4.
Linn. Mant. 532.
Drury Inſ. 1. tab. 39. fig. 4.
Oliv. Inſ. 67. tab. 19. fig. 141.
Habitat in Africa. Dr. Solander.

feſtiuus. 8. C. thorace ſpinoſo, viridi, elytris violaceis baſi viridibus, femoribus ferrugineis, vnidentatis. Ent. ſyſt. 2. 253. 5. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 44.
tab. 18. fig. 44.
Habitat ad fluuium Gaboon Africae. Muſ. Dom. Banks.

vittatus. 9. C. thorace ſpinoſo, viridis, nitens, thorace elytrisque nigro-lineatis. Ent. ſyſt. 2. 253. 6. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 2. fig. 10.
Voet. Col. 2. tab. 10. fig. 41.
Habitat in Braſilia. Muſ. Dom. Banks.

velutinus. 10. C. thorace ſpinoſo, niger, elytris vitta atra. Ent. ſyſt. 2. 253. 7. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 6. fig. 41.
Voet. Col. 2. tab. 10. fig. 40.
Habitat in America. Dr. Schulz.

ſericeus. 11. C. thorace ſpinoſo, holoſericeo, ater, elytris, futura vittaque viridibus, femoribus rufis. Ent. ſyſt. 2. 253. 8. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 37.
Habitat in Braſilia. Muſ. Dom. Olivier.

futuralis. 12. C. thorace ſpinoſo, ater, elytris, futura vittaque media aureis. Ent. ſyſt. 2. 254. 9. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 6. fig. 40.

Voet.

Voet. Col. 2. tab. 10. fig. 42. 43.
Habitat in America. Dr. Hunter.

13. C. thorace ſpinoſo capiteque viridi-aeneis, nitidis, elytris obſcuris, antennis longis pedibusque ruſis. Ent. ſyſt. 2. 254. 10. * *elegans.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 35.
Habitat in Americae meridionalis Inſulis. Dom. Olivier.

14. C. thorace ſubſpinoſo, atro: macula lateralı aurea, elytris cyaneis, atro-lineatis, antennis pedibusque ruſis. *regius.*
Habitat in Guinea. Dom. Heſſe. Muſ. D. Lund.
Statura et magnitudo C. ſuturalis. Caput holoſericeum, atrum, ore rufo, mandibulis exſertis, dentatis, apice parum nigricantibus. Antennae corpore breuiores, rufae. Thorax inaequalis, ſubſpinoſus: margine antico eleuato, holoſericeus, ater, macula magna, lateralı, aurea. Elytra cyanea, baſi vittis holoſericeis, atris, ſtriata. Pedes rufi.

15. C. thorace ſpinoſo depreſſo, vireſcens, elytris cupreis, tibiis compreſſo-dilatatis. Ent. ſyſt. 2. 254. 11. * *latipes.*
Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 116.
Degeer Inſ. 7. 655. bb. tab. 49. fig. 3.
Herbſt. Arch. 7. tab. 45. fig. 11.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.

16. C. viridis, nitens, elytris cyaneis, antennis apice albis. *albicornis.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.
Statura C. longipedis paullo minor. Antennae nigrae, articulis quatuor vltimis albis. Caput et thorax viridi-aenea, nitida, immaculata. Elytra

tra cyanea, apice acuminata. Corpus viridi-aeneum, pedibus cyaneis.

longipes. 17. C. thorace ſubſpinoſo cyaneo, viridis, antennis longioribus, femoribus clauatis. Ent. ſyſt. 2. 255. 12. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 3.
Degeer Inſ. 7. tab. 49. fig. 7.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.

cyanicornis. 18. C. thorace ſubſpinoſo, viridis, nitens, antennis breuibus coeruleis, femoribus anticis clauatis, ferrugineis. Ent. ſyſt. ſuppl. 142. 12. *
Habitat in Aquapim Guineae. Muſ. D. Lund.

interruptus. 19. C. thorace ſpinoſo, ater, elytris maculis tribus linearibus albis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 255. 13. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 17. fig. 133.
Habitat - - Muſ. D. Olivier.

Cerdo. 20. C. thorace ſpinoſo, rugoſo, niger, elytris rotundatis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 255. 14.
Cerambyx Cerdo. Linn. ſyſt. Nat. 2. 629. 39.
Oliv. Inſ. 67. tab. 10. fig. 65.
Geoff. Inſ. 1. 201. 2.
Voet. Col. 2. tab. 4. fig. 5.
Habitat in Europa.

heros. 21. C. thorace ſpinoſo rugoſo, niger, elytris ſubſpinoſis piceis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 255. 15.
Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 200. 1.
Friſh. Inſ. 1. 13. tab. 8.
Drury Inſ. 1. tab. 49. fig. 1.
Voet. Col. 2. tab. 5. fig. 9.
Roſ. Fn. Etr. 1. 141. 358.
Habitat in Europae Quercu.

22. C. thorace ſubſpinoſo. niger, elytris viridibus, *ſpinicornis*
apice ſpinoſis. Ent. ſyſt. 2. 256. 16. *
Cerambyx torridus. Oliv. Inſ. 67. tab. 14. f. 95.
Habitat in Sierra Leon Africae. Muſ. D. Banks.

23. C. thorace ſpinoſo rugoſoque, nigricans, elytris *denticornis*
bidentatis, antennis ſpinoſis mediocribus.
Habitat in Guinea. D. Heſſe. Muſ. D. Lund.
Statura et magnitudo C. Bati. Antennae longitudine corporis, nigrae: articulis apice ſpinoſis. Caput nigrum. Thorax ſpinoſus, rugoſus. Elytra bidentata, nigra, pube cineraſcente micantia.

24. C. thorace ſubſpinoſo, ater, antennis mediocri- *ater.*
bus, rufo nigroque annulatis. Ent. ſyſt. 2. 256. 17. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 32.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. D. Olivier.

25. C. thorace rugoſo, ater, elytris laeuibus biden- *bidens.*
tatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.
Statura omnino C. Cerdonis, at duplo minor. Antennae corpore breuiores, nigrae, piceo colore nitentes. Caput atrum. Thorax rotundatus, muticus, punctato-rugoſus. Scutellum cinereum. Elytra laeuia, nigra, apice bidentata. Corpus nigrum, piceo micans.

26. C. niger, thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris *tuberculatus.*
baſi ſcabris apice emarginatis, antennis longis. Ent. ſyſt. ſuppl. 141. 17. *
Habitat in Cayenna. D. Cuvier.

27. C. thorace inermi rugoſo, niger, elytris cine- *voluulus.*
reis, antennis breuibus.

Ha-

Habitat Tranquebariae. Dom. Duldorff. Muſ. D. Lund.

Statura C. bidentis, at minor. Antennae breues, nigrae. Caput nigrum. Thorax inermis, rugoſus, niger. Elytra ſubholoſericea, nigra. Corpus nigrum, abdomine cinereo-tomentoſo.

Batus. 28. C. thorace rugoſo, ſubſpinoſo, elytris apice ſpinoſis, antennis longis aculeato-ſpinoſis. Ent. ſyſt. 2. 256. 18.

Linn. ſyſt. Nat. 2. 615. 20. Muſ. Lud. Vlr. 69. Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 32.

Muſ. Petropol. 652. 154.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis.

ferrugineus. 29. C. thorace acute ſpinoſo-rugoſo, niger, elytris ferrugineis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 256. 19. *

Linn. ſyſt. Nat. 2. 626. 25. Muſ. Lud. Vlr. 70. Oliv. Inſ. 67. tab. 18. fig. 134.

Habitat in India orientali. D. de Slanbuſch.

alpinus. 30. C. thorace ſpinoſo, coleoptris faſcia maculisque quatuor atris, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 257. 20.

Linn. ſyſt. Nat. 2. 628. 35. Fn. Sv. 654. Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 58. Geoff. Inſ. 1. 202. 4. Scheuchz. Itiner. 1. tab. 1. fig. 5. Sulz. Inſ. tab. 4. fig. D. Drury Inſ. 2. tab. 31. fig. 5. Voet. Col. 2. tab. 9. fig. 38.

Habitat in Europae montoſis.

ocellatus. 31. C. thorace ſpinoſo, ater: linea dorſali fulua, elytris punctis ſubocellaribus fuluis, ano bidentato.

Oliv. Inſ. 67. tab. 13. fig. 12. d. tab. 2. fig. 12. a. b.

Ha-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Sehested.

Statura et magnitudo C. ſcalaris. Antennae corpore triplo longiores, atrae. Caput atrum, macula verticali, fulua. Thorax ſpinoſus, ater, linea dorſali fulua, parum albo-marginata. Elytra atra, punctis plurimis, ſparſis, fuluis, annulo albo cinctis. Corpus cinereo-pubeſcens, linea laterali fulua. Anus bidentatus. Pedes nigri.

32. C. thorace ſpinoſo, fuſcus: linea longitudinali alba, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 257. 21. * *ſcalaris.*

Voet. Col. 2. tab. 6. fig. 12.

Habitat in America meridionali. Muſ. D. Banks.

33. C. thorace ſpinoſo, viridi-aeneus, elytris teſtaceis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 257. 27. * *ebulinus.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. Dr. Hunter.

34. C. thorace biſpinoſo, rugoſo, ater, antennis longioribus ferrugineis. Ent. ſyſt. 2. 257. 28. * *Morio.*

Habitat in Cayenna. Muſ. Dr. Hunter.

35. C. thorace ſpinoſo, niger, elytris ſanguineis: macula nigra. Ent. ſyſt. 2. 257. 29. * *Koehleri.*

Linn. ſyſt. Nat. 2. 631. 50.

Geoff. Inſ. 1. 204. 6.

Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 1.

tab. 153. fig. 4.

Herbſt. Arch. 9. tab. 24. fig. 6.

β. *Cerambyx badenſis.* Panz. Taſchenb. 2. 48. 6.

Lamia hungarica. Herbſt. Arch. 4. t. 25. f. 6.

Naturf. 19. tab. 4. fig. 1-5.

Habitat in Europa auſtraliori.

36. C. thorace ſpinoſo, ſanguineus, antennis elytrorum apicibus, abdomine pedibusque nigris. Ent. ſyſt. 2. 257. 30. * *Lundii.*

Oliv. Inf. 67. tab. 20. fig. 149.
Habitat Tranquebariae. Muf. D. Lund.

Desfontainii. 37. C. thorace ſpinoſo, ſanguineo, nigro, maculato, ater, elytris ſanguineis, baſi apiceque atris, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 257. 31. *
Habitat in Barbaria. Muſ. Dom. Desfontaines.

humeralis. 38. C. thorace ſpinoſo, niger, elytris macula baſeos ſanguinea. Ent. ſyſt. ſuppl. 143. 36. *
Habitat in America boreali. Dom. Herſchel.

4dens. 39. C. thorace ſpinoſo, ater, thoracis margine elytrisque teſtaceis, apice nigris.
Oliv. Inſ. 67. tab. 19. fig. 144.
Habitat in China. Muſ. D. de Seheſtedt.
Statura praecedentium. Antennae corpore longiores, atrae. Caput atrum, vertice teſtaceo, dentibusque quatuor inter antennas: lateralibus teſtaceis. Thorax lineis tribus, dorſalibus eleuatis, niger, lateribus teſtaceis. Elytra lineis tribus eleuatis, teſtacea, apice atra. Corpus atrum.

ſuccinctus. 40. C. thorace biſpinoſo, rugoſo, elytris faſcia flaua, antennis longioribus, compreſſis. Ent. ſyſt. 2. 258. 27.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 627. 32. Muſ. Lud. Vlr. 72.
Degeer Inſ. 5. 113. 14. tab. 14. fig. 5.
Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 43.
Drury Inſ. 1. tab. 39. fig. 2.
Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 17.
Habitat in America meridionali.
Faſcia elytrorum nunc minor, nunc obſoleta, nunc omnino nulla.

bicornis. 41. C. thorace biſpinoſo, tuberculatoque, flauus, elytris nigro-lineatis.
Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 31.

Voet.

Voet. Col. 2. tab. 6. fig. 11.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.
Statura omnino et magnitudo C. ſtriati. Antennae corpore duplo longiores, baſi flauae, articulis apice nigris. Caput flauum, dentibus duobus, eleuatis, acutis inter antennas. Thorax biſpinoſus, ſpina poſteriore minore, flauus, tuberculisque vtrinque duobus, eleuatis, acutis, nigris. Elytra coſtata, flaua, linea marginali mediaque nigris. Corpus holoſericeo-aureum, abdomine nigro: lateribus aureis. Pedes teſtacei, poſtici nigri.

42. C. thorace ſubſpinoſo, rugoſo, ferrugineus, elytris flauo-ſtriatis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 259. 28. * *ſtriatus.*

Oliv. Inſ 67. tab. 10. fig. 71.
Voet. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 68.
Habitat in Cayenna. Muſ. Dr. Hunter.

43. C. thorace inaequali, ſubſpinoſo, ater, elytris rufis, margine ſuturaque abbreuiatis, nigris, antennis mediocribus. *abbreuiatus.*

Habitat in noua Cambria. Dom. Billardiere.
Praecedentibus minor. Antennae villoſae, atrae. Caput et thorax inaequalia, atra, immaculata. Elytra rufa, lineis tribus, eleuatis, flaueſcentibus, margine ſuturaque nigris, qui tamen color abbreuiatus, vix vltra medium extenditur. Corpus atrum.

44. C. thorace biſpinoſo, rufo, elytris laeuibus, nigris, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 259. 29. * *ruſipes.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 3.
tab. 13. fig. 89.
Habitat in America meridionali. Muſ. Dr. Hunter.

dimidiatus 45. C. thorace biſpinoſo, rugoſo, flauus, nigro-punctatus, elytris nigris, baſi flauis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 259. 30. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 96.
Habitat in Cayenna. Muſ. Dr. Hunter.

bicolor. 46. C. thorace biſpinoſo tuberculatoque, ferrugineus, elytris vltra dimidium abdomineque atris. Ent. ſyſt. 2. 260. 31. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 61.
Voet. Coleopt. 2. tab. 8. fig. 24.
Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

depreſſus. 47. C. thorace multiſpinoſus, depreſſus, niger, cinereo-variegatus, elytris acuminatis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 260. 32. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 30.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 5.
Voet. Coleopt. tab. 13. fig. 55. 56.
Habitat in Americae Inſulis. Muſ. Dom. Banks.

faſciatus. 48. C. thorace ſpinoſo, cyaneus, elytris faſcia flaua, antennis mediocribus, ante apicem flauis. Ent. ſyſt. 2. 260. 33. *.
Oliv. Inſ. 67. tab. fig. 4.
Pall. Icon. Inſ. tab. F. fig. 4.
Voet. Coleopt. 2. tab. 11. fig. 49.
Herbſt. Arch. 5. tab. 25 fig. 3.
Habitat Tranquebariae. Dr. Avering.

barbicornis. 49. C. thorace ſpinoſo, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore teſtaceo, nigro, variegato. Ent. ſyſt. 2. 260. 34. *
Linn. ſyſt. Nat. 2. 625. 18.
Oliv. Inſ. 67. tab. 7. fig. 48.
Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 37.
Habitat in India orientali.

50. C. thorace mutico, griſeo-fuſcus, elytris acuminatis: faſciis duabus, punctisque niueis, *albofaſciatus.*

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Muſ. D. Lund.

Corpus paruum. Antennae vix longitudine corporis. Thorax rotundatus, inermis, ſtriis tribus macularibus punctisque aliquot paruis, niueis. Elytra apice acuminata: faſciis duabus, latis, abbreuiatis, punctisque aliquot paruis, niueis.

51. C. thorace ſpinoſo, elytris punctis faſciisque nigris, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 261. 35. *nebuloſus.*

Linn. ſyſt. Nat. 2. 627. 29. Fn. Sv. 650.
Oliv. Inſ. 66. tab. 7. fig. 47.
Panz. Fn. Germ. 14. tab. 13.
Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 9.
Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 4.
Geoff. Inſ. 1. 204. 7.
Degeer Inſ. 5. 71. 8.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. c.
Habitat in Abietum truncis.

52. C. thorace ſpinoſo, fuluo, villoſo, elytris nigris: maculata, poſtica villoſa, fulua, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 261. 36. * *obſcurus.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. D. Lund.

53. C. thorace ſpinoſo, fuſco, elytris laeuibus: faſciis griſeis, nigro-punctatis, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 261. 37. * *griſeus.*

Panz. Fn. Germ. 14. tab. 14.
Habitat in Germania. Dom. de Loewenſkiold.

54. C. thorace ſpinoſo, griſeus, elytris lineis, eleuatis, nigropunctatis, apice fuſcis, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 261. 38. * *coſtatus.*

Habitat in Germania Dom. de Loewenſkiold.

55. C. thorace ſpinoſo, elytris integris: punctis tribus hiſpidis, antennis mediocribus, hirtis. Ent. ſyſt. 2. 262. 39. * *faſciculatus.*

Panz.

Panz. Fn. Germ. 14. tab. 15.
Naturf. 24. 26. 34. tab. 1. fig. 44.
Payk. Fn. Sv. 3. 58. 7.
Degeer Inf. 5. tab. 3. fig. 17.
Habitat in Germania. Dom. Hybner.

biſpidus. 56. thorace ſpinoſo, elytris baſi albidis, apice bidentatis, antennis mediocribus, hirtis. Ent. ſyſt. 2. 262. 40.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 627. 30. Fn. Sv. 651.
Geoff. Inſ. 1. 206. 9.
Panz. Fn. Germ. 14. tab. 16.
Oliv. Inſ. 67. tab. 11. fig. 77.
Schaeff. Icon. tab. 176. fig. 5.
Friſh. Inſ. 13. tab. 16.
Degeer Inſ. 5. 71. 9. tab. 3. fig. 17.
Habitat in Europa boreali.

piloſus. 57. C. thorace biſpinoſo, elytris griſeis, apice vnidentatis, antennis mediocribus, hirtis. Ent. ſyſt. 2. 262. 41.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 60.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

4punctatus. 58. C. thorace ſpinoſo, piloſus, fuſcus, capite thoraceque punctis duobus albis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.
Statura parua praecedentium. Antennae longae, ferrugineae: articulis apice fuſcis. Caput fuſcum, punctis duobus verticalibus, niueis. Thorax ſpinoſus, fuſcus, punctis duobus albis. Elytra piloſa, fuſca, cinereo-varia. Femora clauata.

balteatus. 59. C. thorace ſubſpinoſo, brunneus, elytris, faſcia fuſca. Ent. ſyſt. 2. 262. 42. *
Cerambyx balteatus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 627. 31.
Oliv.

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 124.
Habitat in Luſitania.

60. C. thorace inermi, rugoſiſſimo, niger, antennis mediocribus, pedibusque piceis. Ent. ſyſt. 2. 263. 43. * — *rugicollis.*
Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.
Forte potius Gnoma.

61. C. thorace mutico, rufus, elytris teſtaceis: macula nigra, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 263. 44. * — *2 maculatus.*
Habitat in India orientali. Muſ. Dom. Lund.

62. C. thorace ſubſpinoſo, rufus, elytris teſtaceis, baſi atro-cyaneis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 263. 45. * — *ſplendidus.*
Habitat Tranquebariae. Muſ. D. Lund.

63. C. thorace ſubſpinoſo, niger, antennis albidis, elytris teſtaceis, baſi apiceque cyaneis, nitidiſſimis. — *Daldorfii.*
Lamia Daldorfii. Illig.
Habitat in Sumatra. Daldorff. Muſ. D. de Seheſtedt.
Statura et ſumma affinitas C. nitentis. Antennae villoſae, albidae: articulo primo ferrugineo, apice obſcurae, longitudine corporis. Caput nigrum, immaculatum. Thorax rotundatus, ſtriga media eleuata, niger. Elytra ſubſtriata, nitida, teſtacea, baſi parum, apice latius, cyanea, nitida. Corpus nigrum. Pedes teſtacei, femoribus nigris.

64. C. thorace ſubſpinoſo, niger, antennis pedibusque flaueſcentibus. Elytris teſtaceis, apice nigris. — *nitens.*
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Varietatem praecedentis credit Dom. Illiger ac forte rite. Antennae piloſae, flaueſcentes, longitu-

gitudine fere corporis. Caput nigrum, labro flauescente: fascia media nigra. Thorax subspinosus, niger, ruga media elevata. Elytra testacea, nitida, apice nigra. Corpus nigrum, pectore flauescente. Pedes obscuri.

fulgidus. 65. C. thorace subspinoso, ferrugineus, elytris cyaneis, nitidissimis.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Antennae pilosae, flauae: articulo primo ferrugineo, apice acutae, longitudine corporis. Caput et thorax ferruginea, ruga thoracis media eleuata. Elytra cyanea, nitidissima. Corpus ferrugineum.

longicornis 66. C. thorace inermi: dorso plano, corpore fusco grisеoque vario, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 263. 46. *

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

marginalis 67. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine omni nigro. Ent. syst. 2. 264 47. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

breuicornis. 68. C. thorace inermi, viridi, elytris obscuris, antennis breuibus, nigris. Ent. syst. 2. 264. 48. *

Oliv. Ins. 70. tab. 2. fig. 22.

Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Banks.

scriptus. 69. C. thorace inermi, nigro; lineis duabus albis, elytris obscure-cyaneis: lineolis fasciaque media abbreuiata, compressis, cinereis. Ent. syst. suppl. 143. 49. *

Habitat in Isle de France. Mus. Dom. Bosc.

iuuencus. 70. C. thorace inermi, rugoso, elytris acuminatis, nigris lanuginoso-canescentibus, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 264. 49. *

Linn. syst. Nat. 2. 631. 53.

Habitat in America.

71.

71. C. thorace inermi, rugoſo, griſeus, elytris vni- *holoſeri-*
dentatis, holoſericeis, fuſco cinereoque micān- *ceus.*
tibus, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 264.
50. *

Oliv. Inſ. 62. tab. 17. fig. 127.
Habitat in India orientali. Muſ. D. Lund.

72. C. thorace inermi, ſubrugoſo, cinereus, imma- *cinereus.*
culatus, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 265.
31. *

Habitat Tranquebariae. Muſ. D. Lund.

136. LAMIA. *Palpi* filiformes.
Maxilla cornea, bifida.
Ligula cornea, bifida.
Antennae ſetaceae.

1. L. thorace acute ſpinoſo, rugoſo, elytris cinereis, *gigas.*
macula marginali nigra, baſi bituberculatis, ſca-
bris, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 265. 1. *

Oliv. Inſ. 67. tab. 23. fig. 91.
Habitat in Guinea. Muſ. Dom. Banks.

2. L. thorace quadriſpinoſo, ſcutello elytrisque ſpi- *tribulus.*
noſis, antennis longioribus. Ent. ſyſt. 2. 266.
2. *

Oliv. Inſ 67. tab. 14. fig. 100.
Habitat ad fluvium Gaboon Africae. Muſ. D. Banks. *fronticor-*

3. L. thorace ſpinoſo, frontis cornu porrecto, apice *nis.*
emarginato incuruo, antennis longis. Ent. ſyſt.
2. 266. 3. *

Lamia corpus cylindricum, rotundatum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* magno, obtuſo, declini, inter antennas canaliculato; *oculis* magnis, rotundatis, marginalibus, prominulis; *antennis* elongatis, approximatis, inter oculos inſertis; *thorace* cylindrico, ſpinoſo, inaequali; *ſcutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* validis, curſoriis; *tarſis* quadriarticulatis; *colore* vario.

Cerambyx 2punctatus. Drury Inſ. 2. tab. 31. fig. 2.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. D. Banks.

pedicornis. 4. L. thorace elytrisque ſpinoſis, femoribus anticis cornutis. Ent. ſyſt. 2. 267. 4. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 119.
Habitat in noua Hollandia. Muſ. D. Banks.

hyſtrix. 5. L. thorace quinqueſpinoſo, elytris faſciculato-piloſis, antennis mediocribus, ſerratis. Ent. ſyſt. 2. 267. 5. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 15. fig. 110.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. Dom. Banks.

criſta. 6. L. thorace acute ſpinoſo, griſea, elytris baſi tuberculo compreſſo, tridentato. Ent. ſyſt. 2. 268. 6. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 101.
Habitat in noua Zelandia. Muſ. D. Banks.

marmorata. 7. L. thorace acute ſpinoſo, cinereo fuſcoque, varia, elytris baſi tuberculatis, antennis longis. Ent. ſyſt. ſuppl. 143. 7. *
Habitat in Africa. Muſ. Dom. Boſc.

ambulator 8. L. thorace antice vtrinque biſpinoſo, corpore nebuloſo. Ent. ſyſt. 2. 268. 7. *
Petiv. Gazoph. tab. 37. fig. 6.
Habitat in Inſulis Luzonum. Muſ. Britann.

ſpinipes. 9. L. thorace vtrinque biſpinoſo, elytris punctatis, variegatis, femoribus anticis baſi vniſpinoſis.
Habitat in Isle de France. Muſ. D. de Seheſtedt.
Affinis videtur L. ambulatori. Antennae longitudine corporis nigrae, albo variae. Caput villoſum, pallide cinereum. Thorax antice biſpinoſus: ſpina vna, ſupra alteram, inferiore maiore, acutiore, cinereo caſtaneoque varius. Elytra punctata, cinereo caſtaneoque varia, faſcia, baſeos

basseos mediaque albis, testaceo-variegatis. Pedes cinerei, anticis spina basseos erecta, acuta.

10. L. thorace spinoso, bimaculato, elytris basi scabris, apiceque mucronatis. Ent. syst. 2. 290. 89. * *Rubus.*

Cerambyx Rubus. Linn. syst. Nat. 2. 625. 21.
Oliv. Ins. 67. tab. 7. fig. 57.
Degeer Ins. 5. 106. 7. tab. 13. fig. 16.
Habitat in India.

11. L. thorace spinoso, bimaculato, elytris albo-maculatis, basi scabris, mucronatis, apice bidentatis. Ent. syst. 2. 290. 90. * *8maculata*

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

12. L. thorace spinoso, rugoso, elytris truncatis, griseis, antennis compressis: articulis apice spinosis. Ent. syst. 2. 290. 91. * *spinicornis*

Oliv. Ins. 67. tab. 5. fig. 33.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

13. L. thorace spinoso, capiteque albo-lineatis, elytris albo-variis, antennis longis. *linnator.*

Oliv. Ins. 67. tab. 19. fig. 143.
Habitat in India.
Magnitudo L. spinicornis. Caput nigrum, vertice lineis tribus albis inter antennas, in maculam coeuntibus. Thorax scaber, acute spinosus, lineis tribus albis. Elytra basi parum scabra, apice truncata, nigra, albo-nebulosa.

14. L. thorace spinoso, ferruginea, elytris maculis tribus niueis. *lactator.*

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. de Schestedt.
Statura et magnitudo L. Schestedii. Antennae ferrugineae. Mandibulae apice atrae. Caput ferrugineum, macula frontali niuea. Thorax spi-

spinosus, maculis duabus basseos, niueis. Elytra lacuia, ferruginea, maculis tribus magnis, nitidis. Corpus ferrugineum, linea laterali lata, niuea, quae ab oculis vsque ad anum extenditur.

globifera. 15. L. thorace inermi, rugoso, obscura, elytris punctis eleuatis, globosis, atris.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura L. scabratoris. Antennae corpore longiores, nigrae. Thorax rotundatus, muticus, rugosus, tuberculis dorsalibus, plurimis, eleuatis, subspinosis. Elytra obscura, punctis plurimis, eleuatis globosis, atris. Corpus obscurum.

scabrator. 16. L. thorace spinoso, subtestacea, elytris punctis basseos atris, scabris. Ent. syst. 2. 291. 92. *
Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 14.
Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

gladiator. 17. L. thorace spinoso, elytris testaceo cinereoque reticulatis, basi punctis eleuatis, scabris.
Lamia spinator. Ent. syst. suppl. 145. 92. *
Habitat in India orientali. D. Daldorff.

Sebestedii. 18. L. thorace spinoso, elytrisque fuscis: maculis holosericeis, niueis. Ent. syst. suppl. 146. 94.*
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

fuscator. 19. L. thorace bispinoso, tuberculatoque, elytris apice tridentatis, griseis: fascia cinerea. Ent. syst. 2. 291. 94. *
Habitat Tranquebariae. Mus. Dom. Lund.

barbicornis. 20. L. thorace spinoso elytrisque fusco nigroque variis albomaculatis: articulo tertio fasciculo pilorum. Ent. syst. suppl. 145. 94. *
Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

tridentata 21. L. thorace spinoso cristaque duplici grisea, elytris apice tridentatis.

Ha-

Habitat in Guinea. Dom. Heſſe. Muſ. D. Lund.

Statura L. barbicornis. Antennae longitudine corporis piloſae, cinereae. Caput canaliculatum, cinereum. Thorax acute ſpinoſus, griſeus criſta duplici eleuata, inaequali, obtuſa, fuſca. Elytra punctata, griſea, fuſco-maculata, apice tridentata. Corpus griſeum.

22. L. thorace ſpinoſo, elytris conuexis, atris, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 268. 8. * *textor.*

Cerambyx textor. Linn. ſyſt. Nat. 2. 629. 41.
Fn. Sv. 656.
Geoff. Inſ. 1. 201. 3.
Oliv. Inſ. 67. tab. 6. fig. 39.
Degeer Inſ. 5. 64. 3.
Panz. Fn. Germ. 19. tab. 1.
Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 61. 1.
Habitat in truncis arborum Europae.

23. L. thorace ſpinoſo, rugoſo, nigra, elytris emarginatis, ferrugineis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 268. 9. *vaginator.*

Habitat in India orientali. Muſ. Dom. Lund.

24. L. thorace ſpinoſo, nigra, elytris vitta ſemicirculari punctoque marginali cinereis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 269. 10. * *crucifera.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 10. fig. 68.
Habitat - - Muſ. Dom. Olivier.

25. L. thorace ſpinoſo, nigra, antice faſciis, poſtice punctis viridibus, elytris baſi mucronatis. Ent. ſyſt. 2. 269. 11. * *pulchra.*

Cerambyx pulchra. Drury Inſ. 1. tab. 32. fig. 6.
Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 6.
Habitat in Africa. Dom. Drury.

regalis. 26. L. thorace ſpinoſo, viridi-faſciato, elytris viridi-irroratis, maculisque tribus fuluis. Ent. ſyſt. 2. 269. 12. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 24. a.
Brown. Illuſtr. tab. 50. fig. 1.
Habitat in Africa aequinoctiali. Muſ. D. Banks.

imperialis. 27. L. thorace ſpinoſo, ferrugineo, villoſa, viridi-faſciata, antennis longis, atris.
Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 24. c.
Habitat in Guinea. Dom. Meier. Muſ. D. de Seheſtedt.
Nimis affinis L. regali, cuius forte ſpecimen nuper declaratum. Antennae longae, nigrae. Caput villoſo-ferrugineum, obſcure lineatum orbitaque oculorum viridi. Thorax ſpinoſus, ſtriga media impreſſa faſciaque poſtica viridi. Elytra villoſo-ferruginea, faſciis duabus, anteriore recta, media e maculis tribus quadratis, concatenatis punctoque poſtico viridibus. Pedes ferruginei.

vndata. 28. L. thorace mutico, cinerea, thorace faſcia, elytris duabus vndatis, atris. Ent. ſyſt. 2. 270. 13. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 26.
Habitat - - -

irrorata. 29. L. thorace ſpinoſo, fuſco, ferrugineoque, varia, elytris nigris, ferrugineo-irroratis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 270. 14. *
Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 18.
Habitat in India orientali. Muſ. Dom. Lund.

nigricornis. 30. L. thorace mutico, griſea, elytris dorſo planis, antennis breuibus nigris. Ent. ſyſt. 2. 270. 15. *
Habitat in Coromandel. Muſ. D. Banks.

bifidator. 31. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque cinereo: margine lineolisque atris, elytris cinereis: maculis oblongis, atris.
Habitat in America boreali. Muſ. Dom. Boſc.

Sta-

Statura et magnitudo omnino L. aedilis. Antennae corpore duplo longiores, cinereae, articulis apice fuſcis. Caput nigrum. Thorax vtrinque ſpina valida tuberculisque dorſalibus; cinereus, margine ſub ſpina, lineolis quinque abbreuiatis: intermedia ſolitaria, atris. Elytra baſi punctata, cinerea: macula lineari baſeos, magna marginali, magnaque oblonga pone medium, antice biſida, poſtice puncto paruo albido. Corpus griſeum, femoribus clauatis.

32. L. thorace ſpinoſo: punctis quatuor luteis, elytris obtuſis, nebuloſis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 270. 16. * *aedilis.*

Cerambyx aedilis. Linn. ſyſt. Nat. 2. 628. 37.
Fn. Sv. 653.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 59.
Degeer Inſ. 5. 66. 5. tab. 4. fig. 1. 2.
Friſh. Inſ. 13. tab. 12.
Sulz. Inſ. tab. 4. fig. 27.
Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 7.
Payk. Fn. Sv. 3. 62. 3.
Habitat in Europae borealis truncis.

33. L. thorace ſubſpinoſo: vtrinque macula ocellari atra, elytris variegatis, antennis longis. *ocellator.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.

Statura L. aedilis, at duplo minor. Antennae longae, ferrugineae, articulis baſi pallidis. Thorax ſpina parua poſtica; obſcurus, antice lineolis duabus paruis, atris et ad latera macula magna atra, annulo albo cincta. Elytra punctata, variegata, pone medium angulo vno alteroue atro punctoque paruo niueo. Femora clauata.

34. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque, cinerea, elytris fuſco-variis, punctis eleuatis, nigris, *atomaria.*

ſca-

fcabris, antennis longis. Ent. fyſt. 2. 271. 17. *

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

varia. 35. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque, corpore nigro cinereoque vario, femoribus clauatis, antennis mediocribus. Ent. fyſt. 2. 271. 18. *

Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 16.

Roſſi Fn. Etr. 1. 142. 360.

Habitat in Europa auſtraliori. Dom. Zſchuck.

antennator 36. L. thorace quadriſpinoſo, antennis longiſſimis, tenuibus, ferrugineis, albo-ſubannulatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.

Statura praecedentium, at parua. Antennae longiſſimae, tenues, ferrugineae, annulo vno alteroue albido. Caput fuſcum. Thorax tuberculis quatuor, in ſtrigam diſpoſitis; fuſcus, linea dorſali albida. Elytra variegata, lituris variis albis. Pedes variegati, femoribus clauatis.

araneiformis. 37. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris poroſis: macula marginali fuſca, antennis longis. Ent. fyſt. 2. 271. 19. *

Cerambyx araneiformis. Linn. fyſt. Nat. 2. 625. 22.

Oliv. Inſ. 67. tab. 5. fig. 34.

Drury Inſ. 2. tab. 35. fig. 4.

Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 24.

Voet. Col. 2. tab. 9. fig. 33. 34.

Habitat in America meridionali.

punctata. 38. L. thorace ſpinoſo, fuſca, albo-punctata. Ent. fyſt. 2. 272. 20. *

Oliv. Inſ. 67. tab. 6. fig. 42.

Habitat in Cayenna. Muſ. Dom. Olivier.

39. L. thorace ſpinoſo, elytris cinereis, nigro-maculatis, antennis longiſſimis: articulo tertio apice nodoſo. Ent. ſyſt. 2. 272. 21. * — *nodoſa.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 14. fig. 103.
Habitat in Marylandia. Muſ. Britt.

40. L. thorace multidentato: dorſo plano, elytris tibiisque anticis vnidentatis. Ent. ſyſt. 2. 272. 22. * — *cancriformis.*

Cerambyx puſtulatus. Drury Inſ. 2. t. 35. f. 1.
Habitat in Jamaica.

41. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris punctatis ſpinoſisque, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 273. 23. * — *tuberculata.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 114.
Habitat in Jamaica. Muſ. Dr. Hunter.

42. L. thorace acute ſpinoſo, cinerea, elytris ſpinoſis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 273. 25. * — *horrida.*

Cerambyx horridus. Oliv. Inſ. 67. t. 4. f. 29.
Habitat in Cayenna, Muſ. D. Olivier.

43. L. thorace quadriſpinoſo, elytris tuberculato-granulatis, tibiis anticis apice dilatatis. Ent. ſyſt. 2. 273. 26. — *Scorpio.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 19.
Habitat in America meridionali. Muſ. Dr. Hunter.

44. L. thorace ſubſpinoſo, flauo, lineato, elytris baſi ſcabris, brunneis, flauo-punctatis, apice fuſcis, rufo-maculatis. — *decoratus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.
Statura praecedentium, at minor. Antennae vix longitudine corporis, atrae, articulis tribus prioribus longioribus, clauatis. Caput obſcurum, lineis vtrinque duabus, obliquis, ſub oculis. Thorax ſubſpinoſus, obſcurus: lineis tribus flauis, late-

lateralibus abbreuiatis. Elytra basi scabra, obscura: punctis sparsis, flauis, pone medium nigra: maculis sparsis rufis. Thorax niger, rufo-maculatus. Abdomen nigrum, lineis duabus punctorum alborum. Femora clauata. Tibiae ante apicem vnidentatae.

mixta. 45. L. thorace spinoso, cinereo fuscoque variegata, antennis longis. Ent. syst. suppl. 144. 26. *

Habitat in America boreali. Dom. v. Rohr.

obscura. 46. L. thorace spinoso, fusca, elytris striatis, apice pallidis, antennis longis. Ent. syst. suppl. 144. 26. *

Habitat in America boreali. Dom. v. Rohr.

glauca. 47. L. thorace quinquespinoso, glauca, elytris muricatis, latere fasciaque nigris, antennis longis. Ent. syst. 2. 274. 27. *

Lamia Spengleri. Ent. syst. 2. 291. 93. *

Cerambyx glaucus. Linn. syst. Nat. 2. 626. 28. Degeer Ins. 5. 7. 13. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America.

bidentata. 48. L. thorace subspinoso, elytris bidentatis, scabris. cinereo-fuscis. Ent. syst. 2. 274. 28. *.

Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 62.

Habitat in America. Dom. v. Rohr.

scabra. 49. L. thorace spinoso tuberculatoque, elytris basi scabris, apice bidentatis, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 274. 29. *

Oliv. Ins. 67. tab. 17. fig. 128.

Habitat - - Mus Britt.

compressa. 50. L. thorace spinoso, grisea, femoribus compressis, clauatis, antennis longis.

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund.

Parua in hoc genere. Antennae corpore longiores, nigrae: articulis basi cinereis; primo clauato.

uato. Caput cinereo-villoſum, canaliculatum. Thorax acute ſpinoſus, cinereus, lineis duabus fuſcis. Elytra cinereo fuſcoque varia. Pedes breues, femoribus inermibus, clauatis: clava compreſſa.

51. L. thorace ſubſpinoſo, nigro, elytris variegatis, antennis mediocribus. *clauator.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.

Parua. Antennae corpore vix longiores, nigrae, articulis baſi albis. Caput et thorax nigra, punctata, nigro alboque varia. Pedes pallidi, femoribus clauatis.

52. L. thorace tuberculato, elytris punctatis, cinereis; apice bidentatis, fuſcis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 275. 30. * *praemorſa.*

Habitat in Americae Inſulis. Dom. Badier.

53. L. thorace bituberculato, elytris baſi tuberculo compreſſo, antennis breuibus baſi vnidentatis. *inaequalis.*

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff. Muſ. D. de Seheſtedt.

Minuta in hoc genere. Antennae breues, nigrae, baſi dente eleuato, acuto. Thorax inermis, rotundatus, niger: dorſo albido; tuberculis duobus dorſalibus, compreſſis. Elytra punctata, baſi tuberculo compreſſo, quod in lineam eleuatam excurrit. Abdomen nigrum, ſegmentorum marginibus albis.

54. L. thorace biſpinoſo tuberculatoque griſea, elytris tuberculis duobus eleuatis, acutis. *obſcurator*

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Muſ. D. Lund.

Minor L. griſatore. Antennae vix longitudine corporis. Thorax biſpinoſus, punctato-tuberculatus. Elytra griſea, baſi tuberculis duobus eleuatis, acutis, nigris, vno pone alterum.

spinifera. 55. L. thorace ſpinoſo, cinereo, villoſa, elytris bidentatis, teſtaceis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 275. 31.*

Habitat in America meridionali. Dr. Pflug.

griſator. 56. L. thorace mutico, ſubſtriato, griſea, elytris ſubſpinoſis, baſi tuberculis duobus, antennis breuibus. villoſis. Ent. ſyſt. 2. 275. 32. *

Habitat Tranquebariae. Dom. de Schlanbuſch.

Elytra griſea, lineis ſpinarum breuiſſimarum, baſi tuberculis duobus compreſſis, apice litura atra.

cylindrator. 57. L. thorace mutico, villoſo, griſea, elytris ſubſpinoſis, baſi tuberculis duobus, apice obſcuris.

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Muſ. D. de Seheſtedt.

Statura et ſumma affinitas L. griſatoris. Antennae breues, villoſae, nigrae, albo-punctatae. Caput griſeum. Thorax inermis, rotundatus, villoſus, cinereus, immaculatus. Elytra griſea, lineis e ſpinis eleuatis, acutis, baſique tuberculis duobus paruis, eleuatis, apice obſcura: litura alba.

ſſimator. 58. L. thorace ſpinoſo, griſea, elytris obſcuris, baſi ſcabris, apice bidentatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.

Statura L. griſator. Antennae corpore vix longiores, glabrae, baſi denticulo paruo, acuto. Caput griſeum, macula magna, verticali, ferruginea. Thorax ſpinoſus, griſeus: linea dorſali obſcuriore. Elytra ſcabra, obſcura, apice cinereo atroque varia, terminantur dentibus duobus validis, obtuſis.

aedificator 59. L. thorace ſpinoſo tuberculatoque, griſea, elytris baſi bituberculatis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 275. 33. *

Habirat in India orientali. Muſ. D. Lund.

60.

60. L. thorace ſpinoſo, elytris cinereis, nigro-irro- *amputator*
ratis maculisque numeroſis teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 276. 34. *

Habitat in Americae meridionalis Inſulis; ramos etiam craſſiores abſcindere dicitur. Muſ. Dom. Banks.

61. L. thorace ſpinoſo, elytris baſi poroſis, anten- *ſternutator*
nis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 276. 35. *

Habitat in Inſula Barbados. Dom. Drury.

62. L. thorace ſpinoſo, elytrisque baſi daedaleis api- *ſpinator*.
ce griſeis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 276. 36. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. Dom. Banks.

Variat ex Guinea elytris magis griſeis: maculis nigris nunc rarioribus, nunc crebrioribus.

63. L. thorace ſpinoſo, elytris teſtaceis, albo-irrora- *gutturator*
tis: baſi punctis eleuatis, glabris. Ent. ſyſt. 2. 276. 37. *

Oliv. Inſ. 67. tab. 13. fig. 92.

Habitat in Africa. Muſ. Britt.

64. L. thorace inermi, ferrugineo, nigro, lineato, *nebuloſa*.
elytris fuſco ferrugineoque variis: macula marginali cinerea, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 277. 38. *

Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 15.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 4.

Habitat in Germania. Muſ. D. Banks.

65. L. thorace inermi, cinerea, elytris macula apicis *inermis*.
fuſca, antennis longis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. Dom. de Seheſtedt.

L. nebuloſa minor. Antennae corpore longiores, cinereae, articulis apice fuſcis. Thorax rotundatus, inermis, cinereus. Elytra cinerea, punctis

ctis aliquot eleuatis indiſtinctis, macula magna, poſtica, fuſca. Corpus cinereum, femoribus clauatis.

repandator 66. L. thorace ſpinoſo, obſcura, elytris faſcia poſtica repanda, albida: baſi punctis eleuatis, atris. Ent. ſyſt. 2. 277. 39. *

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

variolator. 67. L. thorace ſpinoſo, lineato, elytris fuſcis: linea ſemicirculari, albâ. Ent. ſyſt. 2. 277. 40. *

Habitat in Indiis.

ſutor. 68. L. thorace ſpinoſo, elytris atris, ferrugineo-maculatis, ſcutello luteo, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 277. 41.

Cerambyx ſutor. Linn. ſyſt. Nat. 2. 628. 38.
Fn. Sv. 655.
Oliv. Inſ. 67. tab. 3. fig. 20.
Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 1.
Degeer Inſ. 5. 65. 4.
Panz. Fn. Germ. 19. tab. 2.
Sulz. Inſ. tab. 5. fig. 4.
Payk. Fn. Sv. 3. 62. 2.
Habitat in Europae ſyluis.

ſartor. 69. L. thorace ſpinoſo, niger, ſcutello flauo, elytris immaculatis, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 278. 42. *

Panz. Fn. Germ. 19. tab. 3.
Habitat Dresdae in Aeſculo Hippocaſtano. Dom. Zſchuck.

dentator. 70. L. thorace ſpinoſo, fuſco cinereoque varia. Ent. ſyſt. 2. 278. 43. *

Habitat in Carolina.

ruſticator. 71. L. thorace acute ſpinoſo, cinereo, ſcutello albo, elytris punctatis, antennis longis.

Habi-

Habitat in Sumatra. D. Daldorfi. Muf. D. Lund.

Minor L. futore. Antennae corpore parum longiores, cinereae, immaculatae. Caput, thorax, elytra fubholofericea, cinerea. Scutellum album. Elytra punctata. Corpus cinereum.

72. L. thorace fpinofo, nigra, thorace elytrisque fului, thorace nigro-lineato, elytris reticulatis. Ent. fyft. 2. 278. 44. * *reticulator*

Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 83.

Habitat in India orientali. Muf. D. Banks.

73. L. thorace acute fpinofo, atra, elytris ftrigis numerofis interruptis albis, antennis mediocribus. Ent. fyft. 2. 278. 45. * *fcalator.*

Habitat in Lufitania. Muf. D. Bofc.

74 L thorace fubfpinofo, obfcure cinerea, fufco-maculata, elytris apice rufis. Ent. fyft. 2. 279. 46. * *molator.*

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 99.

Habitat in Cayenna. Muf. Dom. Hunter.

75. L. thorace fpinofo, elytris cinereo, fufco glaucoque nebulofis, antennis longiffimis rufis. Ent. fyft. 2. 279. 47. * *titillator.*

Oliv. Inf. 61. tab. 15. fig. 109.

Habitat in Carolina. Muf. Britt.

76. L. thorace fpinofo, elytris cinereo-puluerulentis: vittis duabus flauis, nigro-marginatis. Ent. fyft. 2. 279. 48. * *vittator.*

Cerambyx incanus. Forft. nou. fp. Cent. 1. 38.

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 104.

Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 6.

Habitat ad littora finus Campechiani. Muf. Britt.

77. L. thorace fpinofo, nigra, elytris maculis quatuor flauis, fubocellaribus, antennis longis. Ent. fyft. 2. 280. 49. * *oculator.*

Ce-

Cerambyx oculatus. Degeer Inſ. 7. 654. t. 49. f. 1.
Oliv. Inſ. 67. tab. 2. fig. 2.
Voet. Col. 2. tab. 7. fig. 21.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.

Capenſis. 78. L. thorace biſpinoſo, nigra, elytris faſciis quatuor rufis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 280. 50.
Cerambyx Capenſis. Linn. ſyſt. Nat. 2. 628. 32.
Oliv. Inſ. 67. tab. 8. fig. 51.
Drury Inſ. 1. tab. 39. fig. 3.
Petiv. Gazoph. tab. 3. fig. 8.
Voet. ſcarab. 2. tab. 8. fig. 25.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.

bottentotta. 79. L. thorace ſpinoſo rufo, elytris nigris: faſcia maculisque duabus marginalibus ſanguineis. Ent. ſyſt. 2. 280. 51. *
Cerambyx bottentotta. Brown Illuſtr. 118. tab. 49. fig. 1.
Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 27.
Voet. ſcarab. 2. tab. 8. fig. 26.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Yeats.

2 cincta. 80. L. thorace ſpinoſo, nigra, elytris faſciis duabus continuis rufis. Ent. ſyſt. ſuppl. 146. 51.
Habitat in India orientali. D. Daldorff.

ferrugator 81. L. thorace ſpinoſo, obſcure ferruginea, elytris obſcure vireſcentibus: ſtriga interrupta ſanguinea, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 280. 52. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Spengler.

humeralis. 82. L. thorace ſpinoſo, elytris flauis nigro-faſciatis antice mucronatis. Ent. ſyſt. 2. 281. 53. *
Habitat - - D. Drury.

83. L. thorace bifpinofo, nigra, elytris faſciis quinque rubris, antennis mediocribus. Ent. fyſt. 2. 281. 54. * *5faſciata.*

Habitat in Guinea. D. Iſert.

84. L. thorace ſubſpinoſo, atra, elytris faſciis tribus flauis, antennis mediocribus. Ent. fyſt. 2. 281. 55. * *3faſciata.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 121.
Herbſt. Arch. tab. 45. fig. 10.
Habitat in Sierra Leon Africae. Dr. Solander.

85. L. thorace ſpinoſo, poſtice ſinuato, elytris flauis: faſciis duabus maculaque rhombea cyaneis. Ent. fyſt. 2. 281. 55. * *2faſciata.*

Habitat in Iamaica. Muſ. Brittann.

86. L. thorace ſpinoſo atro: margine flauo, elytris atris: faſciis tribus flauis, punctisque duobus albis. Ent. fyſt. 2. 282. 57. * *nobilis.*

Habitat in Cayenna. Muſ. Dr. Hunter.

87. L. thorace ſpinoſo, atra, elytris faſciis duabus punctoque apicis luteis. antennis mediocribus. Ent. fyſt. 2. 282. 58. * *Aethiops.*

Oliv. Inſ. 67. tab. 1. fig. 2.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. Brittann.

88. L. thorace ſpinoſo, cinerea, thorace elytrisque fuſco variis, antennis longis. Ent. fyſt. 2. 282. 59. * *variegator*

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 112.
Habitat in Africa aequinoctiali. Muſ. D. Banks.

89. L. thorace mutico, fuſca, thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris. Ent. fyſt. 2. 282. 60. * *curculionoides.*

Cerambyx cureulionoides. Linn. fyſt. Nat. 2. 634. 48.
Oliv. Inſ. 67. tab. 10. fig. 69.

Geoff.

Geoff. Inf. 1. 210. 5.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 63. 4.
Habitat in Europa auſtraliori.

luſca. 90. L. thorace ſpinoſo, rugoſo, nigra, ferrugineo irrorata, elytris baſi macula ocellari atra, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 283. 61. *
Habitat in Siam. Muſ. D. Banks.

notata. 91. L. thorace ſpinoſo, obſcura, elytris punctis duobus approximatis atris. Ent. ſyſt. 2. 283. 62. *
Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

lugubris. 92. L thorace acute ſpinoſo, nigra, elytris ſcabris, ferrugineo obſolete punctatis, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 283. 63. *
Habitat in Italia. D. de Slanbuſch.

triſtis. 93. L. thorace ſpinoſo, fuſca, elytris ſcabris: maculis duabus atris, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 283. 64. *
Cerambyx triſtis. Linn. ſyſt. Nat. 2. 629. 42.
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 62.
Herbſt. Arch. tab. 25. fig. 7.
Habitat in ligno Cupreſſi Galliae auſtralioris.
Variat pro ſexu, antennis longitudine corporis et duplo longioribus.

funeſta. 94. L. thorace ſpinoſo, fuſca, elytris laeuibus: maculis duabus atris, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 285. 65. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 9. fig. 63.
Panz. Naturf. 24. 26. 36. tab. 1. fig. 36.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 145. 366.
Habitat in Galliae Sambuco. D. Brouſſonet.

punctator. 95. L. thorace ſpinoſo, atra, elytris albo-punctatis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 285. 66. *

Ce-

Cerambyx punctatus. Oliv. Inf. 67. tab. 7. f. 49.
Cerambyx farinosus. Drury Inf. 2. tab. 31. f. 4.
Cerambyx Chinensis. Forst. nou. Inf. spec. Cent. 1. 39.
Habitat in China. Dr. Fothergill.

96. L. thorace spinoso, elytris lineis tribus elevatis ferrulatis, corpore cinereo, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 284. 67. * *crispa.*
Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 18.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.

97. L. thorace spinoso hirtoque, elytris punctis pilosо-cristatis. Ent. syst. 2. 284. 68. * *fasciculata*
Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 131.
Habitat in Cayenna. Mus. D. Olivier.
Elytra punctata, nigro ferrugineoque varia, pilis rarioribus, longioribus, albis.

98. L. thorace spinoso, cinerea, elytris subfasciatis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 285. 69. * *rotator.*
Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 126.
Habitat in India. Mus. D. Banks.

99. L. thorace spinoso, nigra, elytris bicarinatis albo-lineatis, pedibus ferrugineis, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 285. 70. * *glycyrrhizae.*
Cerambyx ouatus. Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 9.
Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 115.
Pallas Iter 2. 723. 60.
Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

100. L. thorace spinoso, nigra, coleoptris cruce media alba. Ent. syst. 2. 285. 71. * *cruciata.*
Pall. Icon. tab. F. fig. 5.
Habitat in Russia australiori. D. Boeber.

101. L. thorace subspinoso, nigra, elytris cinerascentibus, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 286. *fulginator*

Linn. syst. Nat. 2. 539. 43.
Geoff. Inf. 1. 205. 8.
Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 21.
Frisch. Inf. 13. tab. 19.
Degeer Inf. 5. 70. 7.
Voet. scarab. tab. 8. fig. 30.
Habitat in Europa australiori.
Variat aetate tota nigra.

cinraria. 102. L. thorace spinoso, cinerascens, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 286. 73. *
Pall. Icon. tab. F. fig. 11.
Habitat in Russia meridionali. Dom. Hybner.

carinata. 103. L. thorace spinoso, nigra, elytris piceis: carina laterali eleuata albida, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 286. 74. *
Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

annulata. 104. L. thorace spinoso ferrugineo, fusca, antennis albo-annulatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Schestedt.
Minuta in hoc genere. Antennae longitudine corporis, fuscae: articulo secundo toto, tertio, quarto, quinto sextoque basi albis. Corpus totum ferrugineo fuscoque varium.

coquus. 105. L. thorace subspinoso, hirsuta, elytris obtusis sulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 286. 75. *
Cerambyx coquus. Linn. syst. Nat. 2. 630. 44.
Habitat in America boreali.

ruspator. 106. L. thorace spinoso fusco: maculis duabus ferrugineis, elytris fuscis cinereo-variegatis. Ent. syst. 2. 286. 76. *
Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 129.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

107.

107. L. thorace ſpinoſo quadripunctato, elytris ru- *tornator.*
fis: maculis quatuor nigris, antennis breuibus.
Ent. ſyſt. 2. 287. 77. *
Ceramlyx tetrophthalmus. Forſt. Cent. 1. 41.
Oliv. Inſ. 67. tab. 8. fig. 52.
Herbſt. Arch. tab. 32. fig. 4.
Habitat in America boreali.

108. L. thorace ſpinoſo, griſea, elytris ferrugineis *Bankii.*
irroratis faſciisque duabus cinereis. Ent. ſyſt.
2. 287. 78. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 15. fig. 111.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. D. Banks.

109. L. thorace inermi, griſea, elytris faſciis duabus *ſaltator.*
macularibus abbreuiatis ſtrigaque poſtica punctata niueis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2.
287. 79. *
Habitat - - -

110. L. thorace inermi, griſea, elytris maculis dua- *ſtigma.*
bus niueis, antennis breuibus.
Habitat in Inſulis maris pacifici. D. Billardiere.
Parua. Antennae corpore breuiores, cum capite griſeae. Thorax omnino inermis, griſeus, litura dorſali niueus. Elytra ſtriato-punctata, griſea, maculis duabus magnis niueis. Corpus griſeum.

111. L. thorace inermi, griſea: ſtrigis tribus macu- *varia.*
laque punctata marginali, albis, antennis breuibus.
Habitat in Auſtralaſiae Inſulis. D. Billardiere.
Statura praecedentis. Antennae griſeae, corpore breuiores. Caput canaliculatum, griſeum. Thorax rotundatus, inermis, griſeus, ſtrigis aliquot obſcurioribus, lineolaque vtrinque obliqua, alba. Elytra punctato-ſtriata, griſea, ante medium ſtri-

ſtrigis duabus, margine fere coëuntibus, pone medium macula magna, marginali, e punctis plurimis conflata, ſtrigaque poſtica albis. Corpus griſeum.

hiſtrio. 112. L. thorace inermi, flaueſcens: punctis numeroſis niueis ſparſis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 288. 80. *

Habitat Tranquebariae. Muſ. D. Lund.

villoſa. 113. L. thorace ſubſpinoſo, villoſa, teſtacea, nitida, elytris baſi cyaneis, antennis mediocribus.

Habitat in Auſtralaſiae Inſulis. D. Billardiere.

Magnitudo L. pedeſtris. Antennae villoſae, teſtaceae, longitudine corporis. Thorax villoſus, ſubſpinoſus, teſtaceus, immaculatus. Elytra villoſa, teſtacea, nitida, baſi cyanea, ſutura tamen teſtacea. Corpus teſtaceum.

teſtator. 114. L. thorace ſpinoſo cornuque breui recumbente, corpore teſtaceo, antennis breuibus apice nigris. Ent. ſyſt. 2. 288. 81.

Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 122.

Habitat in Africa aequinoctiali. Muſ. D. Banks.

pedeſtris. 115. L. thorace ſpinoſo, atra: vitta integra alba, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 288. 82. *

Linn. ſyſt. Nat. 2. 631. 51.

Oliv. Inſ. 67. tab. 4. fig. 23.

Panz. Fn. Germ. 66. tab. 9.

Roſſ. Fn. Etr. 1. 146. 368.

Habitat in Europa auſtraliori.

ruſipes. 116. L. thorace ſpinoſo, nigra, elytrorum ſutura alba, antennarum baſi pedibusque rufis. Ent. ſyſt. 2. 288. 83. *

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

morio. 117. L. thorace ſpinoſo, nigra, elytris vnicoloribus, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 288. 84.

Oliv.

Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 67.
Herbſt. Arch. tab. 25. fig. 10.
Scopoli Ent. carn. 169.
Habitat in Europa auſtraliori. Dom. Zſchuck.

118. L. thorace ſpinoſo, atra, elytris marginibus li- *lineata.*
neisque duabus vtrinque coëuntibus albis. Ent. ſyſt. 2. 289. 85. *

Cerambyx Scopoli. Herbſt. Arch. t. 25. f. 11.
Habitat in Germania. Dom. Schneider.

119. L. thorace ſpinoſo, atra, elytris fuſcis: margi- *vittigera.*
ne vittaque abbreuiata, albis.

Lamia vittigera. Panz. Fn. Germ. . tab. .
Habitat in Germania auſtraliori.
Nimis L. lineatae affinis. Caput, antennae, thorax, corpus, pedes atra, immaculata. Elytra minus atra, ſiue fuſca margine vel potius vitta ante marginem aliaque media abbreuiata albis. Sutura albicat.

120. L. rhorace ſpinoſo, fuſca: vittis tribus integris *molitor.*
albis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 289. 86. *

Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 84.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 147. 369.
Habitat in India. Muſ. Britt.

121. L. thorace mutico, griſea, coleoptris baſi bitu- *tuberculator.*
berculatis maculisque duabus communibus, albis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 289. 87. *

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 120.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. Dom. Banks.

122. L. thorace ſubſpinoſo, nigra, elytris ſtriga ob- *obliquator.*
liqua, alba.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.

Sta-

Statura et magnitudo L. tuberculatoris. Antennae longitudine corporis, nigrae, articulis basi pallidis. Caput et thorax fusca. Elytra punctata, humero prominulo, nigra, striga media, obliqua, albida. Femora subclauata.

nutator. 123. L. thorace mutico, lineato, cinereo, villosa, antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 290. 88. *
Oliv. Ins. 67. tab. 14. fig. 102.
Habitat in Otaheite. Mus. D. Banks.

bidens. 124. L. thorace acute spinoso, grisea, elytris apice bidentatis. Ent. syst. 2. 291. 95. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

Cantator. 125. L. thorace mutico, cinereo, nigro-punctato, elytris pallide testaceis, apice bidentatis, cinereis nigro-maculatis. Ent. syst. 2. 291. 96. *
Habitat in China. D. de Slanbusch.

Solandri. 126. L. thorace subspinoso, nigra, elytris bidentatis, fuscis cinereo-irroratis. Ent. syst. 2. 292. 97. *
Oliv. Ins. 67. tab. 16. fig. 118.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

cornutor. 127. L. thorace obtuse spinoso, mandibulis basi cornutis, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 292. 98. *
Oliv. Ins. 67. tab. 17. fig. 132.
Habitat in America. Mus. Brittann.

leprosa. 128. L. thorace spinoso, elytris basi variolosis, cinereis: macula laterali nigra, antennis longis. Ent. syst. 2. 292. 99. *
Habitat in America. D. Drury.

137. STENOCORVS. *Palpi* quatuor: *anteriores* filiformes; *posteriores* clauati. *Antennae* filiformes.

1. St. thorace subspinoso, cyaneus, elytris basi flauis. Ent. syst. 2. 293. 1. ✲ *cyaneus.*

Cerambyx palliatus. Forst. nou. Ins. spec. Cent. 1. 40.

Habitat in India.

2. St. thorace spinoso, elytris bidentatis griseis: macula flaua, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 293. 3. ✲ *gargani-cus.*

Oliv. Ins. 67. tab. 13. fig. 105.

Drury Ins. 1. tab. 37. fig. 6.

Degeer Ins. 5. tab. 14. fig. 3.

Habitat in Marylandia. Mus. Brittan.

3. St. thorace vtrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus: linea laterali lutea. Ent. syst. 2. 293. 4. ✲ *festiuus.*

Cerambyx festiuus. Linn. syst. Nat. 2. 623. 11.

Oliv. Ins. 67. tab. 16. fig. 113.

Drury Ins. 1. tab. 37. fig. 5.

Voet. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 66.

Herbst. Arch. tab. 25. fig. 12.

Sulz. Hist. Ins. tab. 5. fig. 6.

Degeer Ins. 5. 100. 4. tab. 13. fig. 14.

Habitat in America.

4.

Stenocori corpus subcylindricum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* rotundato; *oculis* magnis reniformibus, marginalibus; *antennis* elongatis: articulis apice saepe spinosis in serie oculorum insertis; *thorace* rotundato; *scutello* orbiculato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, apice saepius bidentatis; *pedibus* cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario.

marylandius. 4. St. thorace depresso, tuberculato, mutico, elytris bidentatis, fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus Ent. syst. 2. 294. 5.
Callidium marylandicum. Oliv. Ins. 70. tab. 1. fig. 5.
Habitat in Marylandia. Mus. Britt.

spinicornis 5. St. thorace inermi, tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis, corpore variegato. Ent. syst. 2. 294. 6. *
Cerambyx spinicornis. Oliv. Ins. 67. tab. 17. fig. 130.
Drury Ins. 1. tab. 41. fig. 4.
Voet. Coleopt. 2. tab. 24. fig 131.
Habitat in America.

pictus. 6. St. thorace mutico, atro, niueo, lineato, elytris bidentatis, atris, cyaneo-variegatis, niueoque maculatis.
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Magnus in hoc genere. Antennae breues, fuscae. Caput atrum, niueo-lineatum. Thorax rotundatus, muticus, ater: lineis tribus niueis, lateribusque cyaneis. Scutellum niueum. Elytra atra, cyaneo-lineata, maculisque variis, niueis; apice bidentata. Corpus niueum, cyaneo-nitidum. Pedes cyanei.

bidens. 7. St. thorace inermi, subtuberculato, antennarum articulis bispinosis, corpore testaceo. Ent. syst. 2. 294. 7. *
Cerambyx bidens. Oliv. Ins. 67. tab. 7. fig. 125.
Habitat in America meridionali. Dom. de Paykull.

semipunctatus. 8. St. thorace spinoso, inaequali, elytris bidentatis, basi punctatis, apice glabris. Ent. syst. 2. 294. 8. *

Oliv.

Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 19.
Habitat in noua Hollandia. Muf. D. Banks.

9. St. thorace mutico, inaequali, elytris apice bidentatis, albo-irroratis, antennis longis, aculeatis. *irroratus.*
Ent. fyft. 2. 295. 9. *
Cerambyx irroratus. Linn. fyft. Nat. 2. 633. 62.
Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 145.
Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 3.
Habitat in America.

10. St. thorace fpinofo, obfcurus, elytris villofis, punctato-ftriatis, apice vnifpinofis. *obfcurus.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. Lund.
Paullo minor St. irrorato. Antennae longitudine corporis, cinereae, articulis apice nigris. Caput obfcurum, cinereo-villofum. Thorax punctatus, niger, lineis villofo-cinereis. Elytra villofa, punctato-ftriata, nigra, apice fpina vnica, valida. Pedes ferruginei.

11. St. thorace mutico, cinereo: linea glabra, fufca, elytris bidentatis. Ent. fyft. 2. 295. 10. * *glabratus.*
Habitat in Americae meridionalis Infulis. Dom. v. Rohr.

12. St. thorace fpinofo, piceus, elytris punctis fparfis farinofis, antennis longis. Ent. fyft. 2. 295. 11. * *farinofus.*
Cerambyx farinofus. Linn. fyft. Nat. 2. 626. 24.
Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 46.
Degeer Inf. 5. 108. 9. tab. 13. fig. 17.
Habitat in radice Argemones mexicanae.

13. St. thorace fpinofo, ferrugineo, elytris acuminatis: maculis tribus flauis. Ent. fyft. 2. 295. 11. * *6 maculatus.*

Cerambyx 6maculatus. Oliv. Inſ 67. tab. 15. fig. 108.
Habitat in Cayenna. Muſ. Dom. Olivier.

4dens. 14. St. thorace quadriſpinoſo, elytris baſi punctatis atris: macnlis tribus ferrugineis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.
Statura omnino et magnitudo St. 6maculati. Antennae corpore longiores, ferrugineae, pube aurea micantes. Thorax ater, ſpina laterali duabusque dorſalibus eleuatis, validis, acutis, armatus. Scutellum pube aurea tectum. Elytra atra, baſi punctata: macula glabra, ferruginea, apice glabra, maculis duabus approximatis, ferrugineis; exteriore longiore, terminata ſpinâ elongata, valida, acuta.

5maculatus. 15. St. thorace ſubſpinoſo, rufo: maculis quatuor flauis, elytris bidentatis, rufis: punctatis duobus lineaque apicis albis, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 296. 13. *
Habitat in Inſula Guadeloupa. Dom. Iſert.

4maculatus. 16. St. thorace ſpinoſo, ſcabro, elytris bidentatis: maculis binis glabris. Ent. ſyſt. 2. 296. 14. *
Cerambyx 4maculatus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 627. 27.
Sloan Jamaic. 2. tab. 237. fig. 3.
Drury Inſ. 1. tab. 37. fig. 3.
Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 65.
Habitat in America meridionali.

maculoſus. 17. St. thorace ſpinoſo, fuſcus, elytris bidentatis: maculis binis glabris, antennis mediocribus, nigris. Ent. ſyſt. 2. 296. 15. *
Cerambyx maculoſus. Oliv. Inſ. 67. t. . f. .

Habi-

Habitat in America meridionali. Muſ. Dom. Olivier.

18. St. thorace mutico, nigro: macula vtrinque rufa, elytris nigris: maculis binis glabris, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 297. 16. * *geminatus.*

Habitat in Sierra Leon Africae. Dr. Pflug.

19. St. thorace mutico, cylindrico, cinereo, elytris ferrugineis: maculis duabus flaueſcentibus, obſoletis. Ent. ſyſt. ſuppl. 146. 16. * *cylindricollis.*

Habitat in Americae Inſulis. Dom. v. Rohr.

20. St. thorace mutico, pallidus, elytris vniſpinoſis: punctis tribus nigris, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 297. 17. * *pallens.*

Habitat in Americae meridionalis Inſulis. Dom. Iſert.

21. St. thorace mutico, antice attenuato, ferrugineus, elytris pallidis. Ent. ſyſt. 2. 297. 18. * *ſtrepens.*

Cerambyx ſtrepens Oliv. Inſ. 67. tab. . fig .

Habitat in Gallo prouincia noctu volitans cum ſtrepitu. Muſ. Dom. Olivier.

22. St. thorace mutico, ſubrotundo, rufus, elytris teſtaceis: margine vittaque abbreuiata, cyaneis. *vittatus.*

Habitat in Braſilia. Dom. Weber.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae corpore longiores, ferrugineae. Caput ferrugineum. Thorax rotundatus, muticus, ſcaber, ferrugineus, annulo magno, cyaneo. Elytra teſtacea: margine exteriori vittaque media abbreuiata, cyaneis. Corpus et pedes ferruginea.

23. St. thorace mutico, atro, elytris bidentatis, baſi teſtaceis, apice atris: faſcia pallida. Ent. ſyſt. 2. 297. 19. * *faſciatus.*

Oliv.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 98.
Habitat in Africa aequinoctiali. Muf. D. Banks.

circumfle-xus. 24. St. thorace mutico, ferrugineus, elytris vnidentatis, teftaceis: punctis duobus ftrigaque vndata, fufcis. Ent. fyft. 2 300. 20. *
Habita in Cayenna. Dom. v. Rohr.

flavus. 25. St. thorace rotundato, mutico, griſeus, antennis pedibusque teſtaceis. Ent. fyſt. 2. 300. 21. *
Habitat - - Muſ. Dom. Lund.
Forte potius Callidium. Elytra apice emarginata.

annulatus. 26. St. thorace lineato, elytris vnidentatis, antennis longis: annulis tribus albis. Ent. fyſt. 2. 300. 22. *
Cerambyx annulatus. Oliv. Inſ. 67. tab. 16. fig. 117.
Cerambyx hirtipes. Degeer Inſ. 5. 116. 19. tab. 14. fig. 10.
Habitat in America meridionali. Muſ. D. Banks.

quadrimaculatus. 27. St. thorace ſubſpinoſo, quadrimaculato, elytris bidentatis, ferrugineis, flauo cinereoque maculatis. Ent. fyſt. 2. 300. 23. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 12. fig. 86.
Habitat in America. Muſ. D. Banks.

lineola 28. St. thorace ſpinoſo, ferrugineo, elytris acuminatis, teſtaceis: lineolis tribus glabris, flauis. Ent. fyſt. 2. 301. 24. *
Oliv. Inſ. 67. tab. 2. fig. 19.
Habitat in Braſilia. Muſ. D. Banks.

hemipterus 29. St. thorace ſpinoſo, ater, elytris abbreuiatis.
Habitat in Jaua. Muſ. Dom. Boſc.
Magnus. Antennae atrae, altero latere ſpinoſae, longitudine corporis. Caput atrum, mandibulis exſertis, acutis. Thorax villoſus, ater vtrinque

que ſpina obtuſa. Elytra valde abbreuiata, vix ſtriata, atra, apice acutiuſcula. Pedes atri, tibiis poſticis compreſſis.

30. St. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis, cinereo fuſco flauoque variis: angulo baſeos compreſſo. Ent. ſyſt. 2. 301. 25. *varius.*

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

31. St. thorace ſpinoſo, ater, elytris apice vniſpinoſis, baſi teſtaceis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 301. 26. * *pubeſcens.*

Cerambyx pubeſcens. Oliv. Inſ. 67. tab. 18. fig. 135.

Habitat in Cayenna.

32. St. thorace mutico, obſcurus, cinereo-villoſus, elytris bidentatis. Ent. ſyſt. 2. 302. 27. * *villoſus.*

Habitat in Carolina.

33. St. thorace ſubſpinoſo. elytris truncatis, bidentatis, ferrugineis, cinereo-faſciatis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 302 28. * *Druryi.*

Habitat in America. Dom. Drury.

34. St. thorace ſpinoſo, cinereus, elytris bidentatis: faſciis duabus vndatis, nigris. Ent. ſyſt. 2. 302. 29. * *vndatus.*

Habitat in America. Dom. Drury.

35. St. thorace ſpinoſo fuſco cinereoque, griſeus, elytris punctato-ſtriatis. Ent. ſyſt. ſuppl. 147. 29. * *plebejus.*

Habitat in America. Dom. Hybner.

36. St. thorace ſpinoſo, ferrugineo, fuſcus, elytris bidentatis, pallidioribus, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 302. 30. * *ruſticus.*

Oliv. Inſ. 69. tab. 2. fig. 16.

Habitat in India orientali. Muſ. Dom. Banks.

angulatus. 37. St. thorace mutico, cinereus, elytris macula marginali fasciaque angulata, nigris.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Seheſtedt.
Paruus in hoc genere. Antennae corpore duplo longiores: articulo primo longiori, incuruo. Caput et thorax cinerea. Elytra laeuia, cinerea: macula magna marginali, fasciaque postica angulata, fuscis, apice parum acuminata. Femora clauata.

138. CALOPVS.

Palpi quatuor;
anteriores clauati,
posteriores filiformes.
Maxilla bifida.
Ligula membranacea, bifida
Antennae filiformes.

serraticornis. 1. CALOPVS.
Cerambyx serraticornis. Linn. syst. Nat. 2. 634. 65. Fn. Sv. 665.
Degeer Inf. 5. 79. 16.
Payk. Fn. Sv. 3. 65. 1.
Habitat in Europa boreali.
Animalculum elongatum, cylindricum, obscurum.

139. RHAGIVM.

Palpi quatuor, capitati.
Maxilla vnidentata.
Ligula membranacea, bifida.
Antennae ſetaceae.

1. R. thorace ſpinoſo, griſeum, elytris nebuloſis, teſtaceo-ſubfaſciatis. Ent. ſyſt. 2. 303. 1. * — *mordax.*
Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 2.
Habitat in Germania. Dom. Schneider.

2. R. thorace ſpinoſo, nigrum, elytris nebuloſis, teſtaceo-ſubfaſciatis. Ent. ſyſt. 2. 304. 2. — *inquiſitor.*
Cerambyx inquiſitor. Linn. ſyſt. Nat. 2. 630. 49. Fn. Sv. 659.
Geoff. Inſ. 1. 223. 2.
Friſh. Inſ. 13. tab. 14.
Oliv. Inſ. 69. tab. 2. fig. 12.
Degeer Inſ. 5. 126. 2. tab. 4. fig. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 66. 1.
Habitat in Europae truncis arborum.
Larua hexapoda, nuda, alba, capite collarique corneis, fuſcis, dorſo canaliculato. Stroem. Act. Hafn. 1.

3. R. thorace ſpinoſo, cinereum, elytris lineis tribus, eleuatis: antennis faſciisque duabus nigris. Ent. ſyſt. 2. 304. 3. — *indagator.*
Degeer Inſ. 5. tab. 4. fig. 7.
Payk. Fn. Sv. 3. 66. 2.
Habitat in Germania. Dr. Schulz.

4.

Rhagii corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* magno, ouato, prominulo; *oculis* rotundatis, prominulis; *antennis* elongatis, approximatis, inter oculos inſertis; *thorace* anguſto, cylindrico, vtrinque ſpinoſo; *ſcutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, thorace multo latioribus, longitudine abdominis; *pedibus* curſoriis; *tarſis* quadriarticulatis; *colore* vario.

cursor. 4. R. thorace spinoso, elytris rufis: sutura lineaque nigris. Ent. syst. 2. 304. 4.
Cerambyx cursor. Linn. syst. Nat. 2. 630. 45.
Fn. Sv. 658.
Degeer Inf. 5. 127. 3.
Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 7.
Payk. Fn. Sv. 3. 67. 3.
Habitat in Europa boreali.

cinctum. 5. R. thorace spinoso, nigrum, elytris subferrugineis: fascia flaua, femoribus posticis vnidentatis. Ent. syst. 2. 305. 5. *
Habitat in Austria. Dom. Saldoner.

Salicis. 6. R. thorace tuberculato, spinosoque, rufum, pectore elytrisque nigris.
Callidium Salicis. Ent. syst. 2. 329. 51. *
Rhagium etruscum. Rossi. Fn. Etr. 1. 149. 373. tab. 1. fig. 13.
Stenocorus ruficollis. Herbst. Arch. t. 25. f. 13.
Habitat in Europae Salicibus.

Noctis. 7. R. thorace spinoso, nigrum, antennarum basi ferruginea. Ent. syst. 2. 305. 6.
Cerambyx Noctis. Linn. syst. Nat. 2. 630. 48.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 2.
Panz. Fn. Germ. 17. tab. 3.
Habitat in Europa boreali.

bifasciatum. 8. R. thorace spinoso, elytris fasciis duabus obliquis flauis. Ent. syst. 2. 305. 7. *
Degeer Inf. 5. 124. 1. tab. 4. fig. 6.
Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 8.
Oliv. Inf. 69. tab. 1. fig. 6.
Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 1.
Icon. tab. 8. fig. 1-3.
Herbst. Arch. 170. tab. 45. fig. 12.
Geoff. Inf. 1. 222. 1.
Habitat in Europa boreali.

9. R. thorace ſubſpinoſum, nigrum, elytris flauo ſubreticulatis, pedibus rufis. Ent ſyſt. 2. 306. 8. * *clathratum.*

Habitat in Auſtria. Dom. Saldoner.

10. R. thorace ſpinoſo, nigrum, elytris faſcia lata, flaua. Ent. ſyſt. 2. 306. 9. * *ornatum.*

Habitat in Penſylvania. Muſ. Dom. Banks.

11. R. thorace ſpinoſo, elytris eleuato-ſtriatis, cinereis, nigro-vndatis. Ent. ſyſt. 2. 306. 10. * *minutum.*

Oliv. Inſ. 69. tab. 1. fig. 3.

Habitat Kiliae.

140. GNOMA. *Palpi* quatuor: articulo vltimo ſetaceo.
Maxilla bifida: lacinia exteriore apice craſſiore.
Ligula cornea, apice rotundata, ſubemarginata.
Antennae ſetaceae.

1. G. nigra, ferrugineo-irrorata, antennis longiſſimis. *longicollis.*

Cerambyx longicollis. Ent. ſyſt. 2. 265. 52. *

Oliv. Inſ. 67. tab. 11. fig. 73.

Habitat in India orientali. Muſ. Dom. Lund.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor, inaequales, filiformes: *anteriores* paullo longiores, quadri-

---

Gnomae corpus ſubcylindricum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* magno, cylindrico, inſerto; *oculis* magnis, reniformibus, lateralibus; *antennis* longis, approximatis, in ſinu oculorum inſertis; *thorace* elongato, cylindrico, rugoſo, elytris multo anguſtiore; *ſcutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, abdomine longioribus; *pedibus* longiuſculis, compreſſis; *tarſis* quadriarticulatis; *colore* vario.

driarticulati, articulo primo breuiſſimo, ſecundo longiori, incuruo, tertio breuiori, quarto longiori, ſetaceo, adhaerentes maxillae dorſo, *poſteriores* paullo breuiores, triarticulati, articulo vltimo ſetaceo, adnati ligulae medio. *Mandibula* cornea, incurua, compreſſa, acuta, edentula. *Maxilla* cornea, bifida: lacinia interiore breuiore, compreſſa, ciliata, exteriore ſubcylindrica, in medio craſſa, ore incurua, parum piloſa. *Ligula* porrecta, cornea, baſi anguſtata, compreſſa, apice rotundata, dilutata, ſubintegra. *Labium* breue, corneum, transuerſum, integrum. *Antennae* longiſſimae. Genus Saperdis affine.

cylindricollis. 2. G. oliuacea, albolineata, antennis longiſſimis, atris.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Muſ. D. de Seheſtedt.

Minor G. longicolli. Antennae corpore duplo longiores, atrae, articulo tertio breui, quarto quintoque baſi parum albidis. Caput oliuaceum, orbita oculorum lineisque frontalibus albis. Thorax cylindricus, elongatus, oliuaceus, lineis tribus integris, albis. Elytra punctato-ſtriata, oliuacea, humeris albis: puncto magno atro in medio, lineola parua, poneque medium ſtriga albidis. Corpus albidum, pedibus oliuaceis.

clauipes. 3. G. cinerea, femoribus clauatis.

Habitat in Americae meridionalis Inſulis. Muſ. D. de Seheſtedt.

Praecedentibus multo minor. Antennae villoſae, corpore longiores: articulis baſi ferrugineis, apice fuſcis. Thorax cylindricus, elongatus, inermis, dorſo tuberculis aliquot obſoletis. Ely-

Elytra punctis eleuatis, minutis, ſcabra, apice rotundata, integra. Corpus cinereum, femoribus valde clauatis.

4. G. thorace rugoſo, nigra, elytris ſanguineis. *rugicollis*
Habitat in Carolina. Muſ. Dom. Boſc.
Media, antennae nigrae in altero ſexu corpore longiores. Thorax cylindricus, rugoſus, ater, immaculatus. Elytra porcata, ſanguinea, immaculata. Corpus nigrum, abdomine ſanguineo. Pedes atri, femoribus valde clauatis.

141. SAPERDA. *Palpi* filiformes.
Maxilla membranacea, bifida.
Ligula cordata, truncata.
Antennae ſetaceae.

1. S. corpore griſeo, nigro, punctato, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 307. 1. *carcharias*
Cerambyx carcharius. Linn. ſyſt. Nat. 2. 631. 52.
Fn. Sv. 660.
Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 22.
Geoff. Inſ. 1. 308. 1.
Drury Inſ. 1. tab. 41. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 152. fig. 4.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 1.
Degeer Inſ. 5. 73. 10. tab. 3. fig. 19.
Payk.

Saperdae corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, agile; *capite* rotundato, transuerſo, inſerto; *oculis* reniformibus, lateralibus; *antennis* elongatis, in oculorum ſinu inſertis; *thorace* breui, rotundato, inermi; *ſcutello* paruo, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* breuibus, curſoriis; *tarſis* quadriarticulatis; *colore* vario.

Payk. Fn. Sv. 3. 71. 1.
Habitat in Europae ſyluis.

ſcalaris. 2. S. coleoptris linea ſuturali dentata punctisque flauis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 307. 2.
Cerambyx ſcalaris. Linn. ſyſt. Nat. 2. 632. 55. Fn. Sv. 697.
Oliv. Inſ. 68. tab. 1. fig. 7.
Panz. Fn Germ. 64. tab. 3.
Voet. Coleopt. 2. tab. 17. fig. 78.
Friſh. Inſ. 12. 29. tab. 3. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.
Degeer Inſ. 5. 77. 14.
Payk. Fn. Sv. 3. 72. 2.
Habitat in Europae Populo.

vittigera. 3. S. fuſco-griſea, elytris vitta lata, alba: punctis impreſſis, nigris.
Habitat in Barbaria. Dom. de Rehbinder.
Statura et magnitudo S. ſcalaris. Antennae corpore breuiores, fuſcae. Caput et thorax punctata, griſea. Elytra plana, punctata, griſea, vitta lata, dorſali, alba et in hac puncta impreſſa, nigra, magis diſtincta. Corpus obſcure-griſeum.

lacta. 4. S. atra, thorace margine elytris maculis flauis punctisque duobus albis.
Oliv. Inſ. 68. tab. 9. fig. 76.
Habitat in Guinea. Meier. Muſ. D. Lund.
Statura et magnitudo S. ſcalaris. Antennae corpore breuiores, atrae. Caput atrum, macula magna frontali orbitaque oculorum laete flauis. Thorax lateribus late flauis. Elytra atra, maculis duabus magnis ad marginem exteriorem coëuntibus flauis. Pone has puncta duo alba et verſus apicem macula minor flaua. Sutura parum albicat.

5.

5. S. alba, thorace coleoptrisque fuscis: vittis duabus albis. Ent. syst. 2. 307. 3. * — *candida.*

Habitat - - Mus. Dr. Hunter.

6. S. nigra, cinereo-villosa, thorace linea dorsali, elytris vitta albis, antennis brevibus. Ent. syst. 2. 308. 4. * — *detrita.*

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

7. S. livida, antennis elytrorumque punctis atris. Ent. syst. suppl. 147. 4. * — *morbillosa.*

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

8. S. atra, elytris, albo-punctatis, antennis longis. Ent. syst. 2. 308. 5. * — *irrorata.*

Habitat in Africae plantis. Dom. Vahl.

Variat elytris immaculatis, forte aetate.

9. S. nigra, capite thorace anoque ferrugineis. Ent. syst. 2. 308. 6. * — *modesta.*

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

10. S. ferruginea, antennis abdominisque apice supra nigris, elytris emarginatis. Ent. syst. 2. 308. 7. * — *atricornis.*

Habitat in China. Mus. D. de Schestedt.

11. S. thorace luteo: punctis duobus atris, elytris nigris. Ent. syst. 2. 308. 8. — *oculata.*

Cerambyx oculatus. Linn. syst. Nat. 2. 633. 60. Fn. Sv. 664.

Oliv. Ins. 68. tab. 1. fig. 4.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 18.

Degeer Ins. 5. 74. 11. tab. 3. fig. 20.

Schaeff. Icon. tab. 128. fig. 4.

Hoefnag. Ins. tab. 13.

Payk. Fn. Sv. 3. 72. 2.

Habitat in Europa sylvis.

tricolor. 12. S. ferruginea, elytris bidentatis, punctato-ſtriatis, vireſcentibus, antennis mediocribus nigris. Ent. ſyſt. 2. 309. 9. *

Habitat in India orientali. Muſ. D. de Seheſtedt.

villoſa. 13. S. ferrugineo-griſeo-villoſa, ſcutello orbitaque oculorum fuluis.

Saperda birta. Ent. ſyſt. 2. 309. 10. *

Habitat in noua Zelandia. Muſ. D. Banks.

unicolor. 14. S. teſtacea, antennis pedibusque concoloribus, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 309. 11. *

Habitat in Inſula Amſterdam. Muſ. D. Banks.

linearis. 15. S. cylindrica, nigra, pedibus luteis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 309. 12.

Cerambyx linearis. Linn. ſyſt. Nat. 2. 632. 58. Fn. Sv. 663.

Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 6.

Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 3. 73. 3.

Habitat in Europae Corylo.

nigripes. 16. S. cylindrica, nigra, thoracis lineis duabus ſcutelloque cinereis, pedibus nigris. Ent. ſyſt. 2. 310. 13. *

Habitat in Hungaria. Dom. Smidt.

cylindrica. 17. S. cylindrica, nigra, pedibus anticis luteis. Ent. ſyſt. 2. 310. 14.

Cerambyx cylindricus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 633. 59. Fn. Sv. 662.

Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 11.

Roeſ. Inſ. 2. ſcarab. 2. tab. 3.

Geoff. Inſ. 1. 208. 2.

Degeer Inſ. 5. 75. 12.

Panz Fn. Germ. 69. tab. 4.

Payk.

Payk. Fn. Sv. 3. 73. 4.
Habitat in Pyri et Pruni ramis.

18. S. cylindrica, atra, thorace ſupra ferrugineo: punctis tribus nigris. Ent. ſyſt. 2. 310. 15. * *tripunctata.*
Habitat in Virginia.

19. S. cylindrica, thorace ferrugineo: punctis tribus atris, elytris atris: vitta abbreuiata teſtacea. *mandarina.*
Habitat in Carolina. Muſ. D. Boſc.
Affinis certe S. tripunctatae, vix diſtincta. Caput ferrugineum, antennis nigris. Thorax ferrugineus, punctis tribus atris, duobus in medio tertioque in medio baſeos. Elytra punctato-ſtriata, atra: vitta lata media pallida, quae tamen apicem haud attingit.

20. S. thorace rufo, corpore nigro, pedibus rufis. Ent. ſyſt. 2. 310. 16. * *melanocephala.*
Habitat in Africa. D. Prof. Vahl.

21. S. violacea, antennarum articulo primo ſecundoque clauato-piloſis. Ent. ſyſt. 2. 310. 17. * *bicornis.*
Pall. Icon. tab. F. fig. 12.
Habitat in America meridionali. Dom. Hybner.

22. S. atra, elytris emarginatis baſi flauis, antennis barbatis. *humeralis.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.
Statura praecedentium. Antennae corpore paullo longiores, nigrae, pilis longioribus barbatae. Caput et thorax nigra. Elytra ſtriata, emarginata, nigra, baſi flaua. Corpus nigrum, cinereo-pubeſcens.

23. S. capite thoraceque rufis, elytris caeruleis, antennis mediocribus ante apicem barbatis. Ent. ſyſt. 2. 311. 18. * *barbicornis.*
Habitat - - -

erythrocephala. 24. S. thorace villoso, rufa, antennis, pectore elytrisque nigris. Ent. syst. 2. 311. 19. *
Cerambyx erythrocephalus. Schrank. Austr. 270.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 5.
Habitat in Germania. Dom. Hybner.

discoidea. 25. S. thorace villoso, virescens, coleoptrorum disco fusco: punctis duobus fasciaque communi lunata virescentibus. Ent. syst. suppl. 147. 19. *
Habitat in America boreali. D. v. Rohr.

ruficollis. 26. S. thorace villoso, rufo, antennis elytrisque fuscis. Ent. syst. 2. 311. 20. *
Habitat in Virginia.

fasciata. 27. S. thorace subspinoso, cyanea, elytris fasciis duabus flauis. Ent. syst. 2. 311. 21. *
Oliv. Inf. 68. tab. 3. fig. 24.
Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

clauicornis. 28. S. viridis, elytris maculis tribus flauis. Ent. syst. 2. 311. 22. *
Oliv. Inf. 68. tab. 3. fig. 30.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

latipes. 29. S. nigra, femoribus clauatis apice violaceis, tibiis posticis compressis, antennis longis. Ent. syst. 2. 312. 23. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Prof. Leske.

vittata. 30. S. grisea, vittis tribus dentatis albis, antennis longis. Ent. syst. 2. 312. 24. *
Cerambyx trilineatus. Linn. Mant. 352.
Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 1.
Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 142.
Habitat in America. D. Drury.

6punctata. 31. S. nigra, elytris punctis tribus flauis. Ent. syst. 2. 312. 25. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. de Paykull.

32. S.

32. S. griſea, antennis breuibus atris, apice griſeis, elytris apice acuminatis nigris. *acuminata*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.

Statura parua S. lateralis. Antennae breues, craſſiores, articulis tribus vltimis griſeis. Thorax griſeus, linea dorſali lata lateralibusque nigris. Elytra laeuia, griſea, ſutura late apiceque acuminato nigris. Corpus cinereum.

33. S. nigra, capite thoracisque ſpinoſi lateribus rufis, antennis breuibus, apice griſeis. *clauicornis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae breues, craſſae, nigrae, apice cineraſcentes. Caput rufum. Thorax ſpinoſus, niger, lateribus late rufis. Elytra laeuia, nigra, apice emarginata. Corpus nigrum.

34. S. nigra, thoracis lateribus elytrorumque vitta laterali ferrugineis. Ent. ſyſt. 2. 312. 26. * *lateralis.*

Habitat in America boreali. Muſ. D. Banks.

35. S. thorace atro, puncto vtrinque ferrugineo, elytris acuminatis griſeis. Ent. ſyſt. 2. 313. 27. * *lyncea.*

Habitat in noua Zelandia. Muſ. D. Banks.

36. S. cinerea, thorace elytrisque nigro-punctatis, antennis longis. *Boſcii.*

Habitat in Iaua. Muſ. D. Boſc.

Corpus medium. Antennae corpore duplo longiores, nigrae. Caput cinereum, macula verticali nigra. Thorax rotundatus, muticus, laete cinereus, punctis nigris dorſalibus tribus 2. 1. baſeos maiori, transuerſo lateralibusque vtrinque tribus. Elytra laeuia, laete cinerea,

punctis plurimis nigris: tribus communibus. Pedes elongati, nigri.

grisea. 37. S. grisea, scutello margine, elytris lineolis flauescentibus. Ent. syst. 2. 213. 28. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

gracilis. 38. S. ferruginea, elytris testaceis: vitta marginali antennisque nigris.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura omnino S. analis. Caput ferrugineum, antennis totis nigris. Thorax cylindricus, rufus, immaculatus. Elytra plana, punctato-striata, testacea, vitta marginali nigra. Corpus rufum.

biloba. 39. S. thorace rotundato rugoso, cinerea, coleoptris maculis quinque niueis: communi biloba, antennis longis.

Habitat in Insulis Oceani australis. D. Billardiere.

Statura et magnitudo S. griseae. Antennae longissimae, testaceae: articulo primo griseo. Caput griseum, sub antennis niueum. Thorax cylindricus, rugosus, griseus, punctis duobus baseos niueis. Scutellum niueum. Elytra laeuia, lineola marginali baseos puncto pone medium macula maiori, communi biloba, baseos niueis. Corpus niueum.

virginea. 40. S. cinerea, thorace subspinoso: maculis duabus nigris, elytris apice bidentatis flauis: fascia grisea.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Schestedt.

Parua. Caput flauum, antennis longitudine corporis nigris. Thorax subspinosus, cinereus, maculis duabus marginis antici fuscis. Elytra cinerea margine laterali nigro, apice emarginata, flaua: fascia fusca. Corpus cinereum.

41. S.

41. S. teſtacea, elytris apice anoque nigris. Ent. ſyſt. *analis.*
2. 313. 29. *

Habitat in Africa aequinoctiali. Muſ. D. Banks.

42. S. thorace rotundata, flaua, antennis elytrisque *bidentata.*
apice bidentatis, nigris. Ent. ſyſt. 2. 313. 30. *

Habitat in Aquapim Guineae. Dr. Iſert.

Variat capite nigro et flauo, thorace punctis quatuor duobus, aut nullis.

43. S. griſea, elytris apice rotundatis, atris: litura *litvata.*
flaua.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.

Parua. Antennae corpore longiores, nigrae. Caput griſeum, ſtriga verticali flaua. Thorax griſeus, linea dorſali flaueſcente. Elytra punctata, griſea, apice rotundata, atra: litura flaueſcente. Corpus griſeum, femoribus clauatis.

44. S. obſcura. elytris bidentatis, fuſcis: vitta griſea, antennis elongatis, atris, ante apicem albis. *varicornis*

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff. Muſ. D. de Sebeſtedt.

Statura parua S. cylindricae. Antennae corpore longiores, atrae: articulo vltimo baſi late albo. Caput obſcurum. Thorax cylindricus, inermis, niger: linea laterali pallida. Scutellum pallidum. Elytra punctata, fuſca: vitta lata media palleſcente, apice bidentata. Corpus fuſcum: lateribus palleſcentibus.

45. S. fuſca, thorace lineato, ſcutello flauo, antennis longis. *Cardui.*

Saperda nigricornis. Ent. ſyſt. 2. 314. 31. *
Cerambyx Cardui. Linn. ſyſt. Nat. 2. 632. 56.
Oliv. Inſ. 68. tab. 1. fig. 5.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 6.

Herbſt.

Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 2.
Habitat in Europae auſtralioris Carduis.

hirſutula. 46. S. villoſa, cinerea, thorace lineato, elytris nigro-irroratis.
Habitat in Auſtria. Dom de Meyerle.
Nimis affinis S. nigricorni, at magis villoſa et elytra magis nigro-irrorata. Forte mera varietas.

nigricornis. 47. S. cinerea, thorace lineato, elytris fuſcis vnicoloribus, antennis mediocribus.
Saperda futuralis. Ent. ſyſt. 2. 314. 32. *
Habitat Lipſiae. Prof. Leske.

futuralis. 48. S. thorace lineato, vireſcens, elytris acuminatis: ſutura alba.
Saperda annulata. Ent. ſyſt. 2. 314. 33. *
Oliv. Inſ. 68. tab 2. fig. 16.
Panz Fn. Germ. 23. tab. 16.
Roſſ. Fn. Etr. 1. 152. 379.
Habitat in Africae plantis. Dom. Prof. Vahl.

annulata. 49. S. thorace rotundato, ſubſpinoſo, antennarum articulis baſi albis.
Saperda lineata Ent. ſyſt. 2. 314. 34. *
Habitat in America meridionali. Muſ. D. Lund.

lineata. 50. S. thorace rotundato, nigro, albo-lineato, elytris bidentatis, teſtaceis, albo-lineatis.
Saperda triſtis. Ent. ſyſt. 2. 314. 35. *
Habitat Tranquebariae. Muſ. D. Lund.

triſtis. 51. S. thorace quadriſpinoſo, corpore fuſco. Mant. Inſ. 1. 220. 23. *
Habitat in Germania.

ferrea. 52. S. thorace rotundato, hirta, fuſca, elytris punctatis.
Saperda ferrea. Schrank. Auſtr.
Habitat in Auſtria. Dom. de Meierle.

Cor-

Corpus totum fuſcum, griſeo-hirtum. Thorax rotundatus, muticus. Elytra punctis impreſſis.

53. S. thorace fuſco, albolineato, elytris acuminatis, fuſcis: ſtriga abbreuiata lineolaque apicis albis. *acuta.*

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Media. Antennae breues, fuſcae: articulo tertio elongato, apice albo. Caput fuſcum, lineis quatuor albis. Thorax rotundatus, inermis, fuſcus: lineis tribus albis. Elytra plana, punctata, fuſca, ſtriga media abbreuiata, externe angulum paruum formante, alba, apice acuminata, lineola parua, albida. Corpus fuſcum, vittis niueis.

54. S. thorace mutico, atro: lateribus niueis, elytris cinereis, apice bidentatis, fuſcis: macula fulua. *dimidiata.*

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Parua. Antennae obſcure-ferrugineae longitudine corporis. Caput nigrum, orbita oculorum cinerea. Thorax rotundatus, muticus, ater, lateribus niueis. Elytra plana, baſi punctata, cinerea, apice bidentata, fuſca, macula laete fulua. Corpus niueum, ano nigro. Pedes teſtacei.

55. S. thorace flauo, lineato, elytris punctis quatuor flauis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 315. 37. *populnea.*

Cerambyx populneus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 632.
Fn. Sv. 661.
Oliv. Inſ. 68. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 208. 3.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 7.
Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 5.
Habitat in Europae Americae Populetis.

56. S. viridis, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris. Ent. ſyſt. 2. 315. 38. *tremula.*

Panz.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 7.
Schaeff. Icon. tab. 101. fig. 1.
Habitat Halae Saxonum. Dr. Schreber.

punctata. 57. S. viridis, punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 315. 39.
Cerambyx punctatus. Linn. syst. Nat. 2. 1067. 7.
Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 9.
Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 10.
Habitat in Europa australi.

Seidlii. 58. S. cinerea, thorace punctis octo, elytris quinque nigris.
Saperda Seidlii. Panz. Nat. 24. 28. 36. tab. 1. fig. 36.
Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.
Statura omnino et magnitudo S. tremulae. Antennae mediocres, cinereae, articulis apice nigris. Caput cinereum, fronte nigra. Thorax cinereus, vtrinque punctis quatuor nigris. Elytra planiuscula, cinerea, punctis quinque nigris, praeterea linea lateralis a basi vltra medium ducta et sub hac punctum solitarium. Corpus cinereum.

virescens. 59. S. thorace villoso, cinereo, elytris subattenuatis, viridibus. Ent. syst. 2. 315. 40. *
Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 11.
Panz. Naturf. 24. 28. 37. tab. 1. fig. 37.
Habitat in Italia, Dr. Allioni; in Galliae Sambuco, Dr. Brousonet.

tenuicornis. 60. S. nigra, thoracis lateribus, elytrorum macula baseos fasciaque media ferrugineis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Media. Antennae corpore duplo longiores, tenuissimae, nigrae: articulo primo crassiori, longissimo.

simo. Caput nigrum, ore lineaque inter antennas ferrugineis. Thorax holofericeus, niger, lateribus rufis. Elytra nigra, macula magna baseos cum thoracis margine coëunte fasciaque mediaque ferrugineis. Corpus nigrum, pedibus flauescentibus.

61. S. capite thoraceque rufis, nigro-punctatis, elytris griseis, immaculatis. *Argus.*

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 2.

Habitat in Hungaria. Dom. de Meyerle.

Paullo minor S. tremula. Antennae corpore breuiores, nigrae. Caput rufum, puncto medio frontali tribusque baseos nigris. Thorax rotundatus, rufus: punctis septem 4. 3. eleuatis, glabris, atris. Elytra pubescentia, grisea. Corpus griseum, ano late rufo. Pedes rufi femoribus, puncto apicis nigro.

62. S. fusca, pedibus testaceis, antennis longissimis, nigris: annulo albo. Ent. syst. 2. 315. 41. * *longicornis*

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

63. S. fusca, antennis obscuris, pedibus testaceis. *flauipes.*

Habitat in Tanger. Dr. Schousboe. Mus. D. de Scheestedt.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae obscurae: articulo primo longiori, nigro. Caput, thorax, elytra subtruncata, nigra, immaculata. Pedes testacei.

64. S. fusca, cinereo-trilineata, antennis longissimis. *antennata.*

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund.

Corpus tenue, elongatum. Antennae corpore duplo longiores, fuscae. Caput et thorax fusca, lineis tribus cinereis. Elytra piceo-fusca, lineis obsoletis, cinereis, apice rotundata.

65. S. niuea, dorso atomisque numerosissimis atris. *irrorata.*

Habitat in Java. Mus. Dom. Bosc. Paul-

Paullo maior S. voluulo. Antennae corpore breuiores, nigrae: articulis basi albis. Caput villosum, album, punctis numerosis, atris. Thorax elytraque villosa, nitea: dorso atomisque numerosis, atris.

femorata. 66. S. thorace antice fusco, postice testaceo, elytris fasciis tribus nigris testaceisque, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 316. 42. *

Habitat - - Mus. Britt.

haemorrhoidalis. 67. S. atra, thorace punctis tribus sanguineis, ano pedibusque testaceis. Ent. syst. 4. Append. 451.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

voluulus. 68. S. supra nigra, thoracis elytrorumque margine cinereo. Ent. syst. 2. 316. 43. *

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

lemniscata 69. S. fusca, cinereo-sexlineata, antennis longissimis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Media. Antennae corpore multo longiores, barbatae, fuscae: articulo primo longiori. Caput fuscum, lineis quatuor cinereis. Thorax cylindricus, punctatus, fuscus, lineis sex et elytra punctata, lineis tribus, quarum interiores apice coëunt. Corpus fuscum.

Affinis videtur S. antennatae.

ferruginea 70. S. thorace subspinoso, ferruginea, antennis pedibusque nigris. Ent. syst. 2. 316. 44. *

Cerambyx cantharinus. Linn. syst. Nat. 2. 637. 82.

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 14.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

spissicornis. 71. S. nigra. thoracis linea dorsali, elytrorum sutura maculisque albis, antennis hirtis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Seheſtedt. Par-

Parua. Antennae longitudine corporis, hirtae, nigrae: articulo 1. 2. tertioque baſi incraſſatis. Thorax rotundatus, niger: linea dorſali lateraliqúe albis. Elytra nigra futura, lineolis baſeos maculisque apicis albis. Apex rotundatus. Abdomen nigrum, margine albo.

72. S. thorace ſubſpinoſo, ferruginea, antennis pedibusque concoloribus. Ent. ſyſt. 2. 316. 45. * *brunnea.*
Panz. Fn. Germ. 34. tab. 15.
Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.

73. S. teſtacea, thorace ferrugineo, antennis fuſcis. *tuberculata.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.
Corpus paruum, teſtaceum. Antennae nigrae: articulo primo teſtaceo. Thorax ſubtuberculatus, rufeſcens. Elytra punctata, rotundata, teſtacea.

74. S. nigra, elytris teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 316. 46. * *teſtacea.*
Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

75. S. corpore violaceo, immaculato. Ent. ſyſt. 2. 316. 47. * *violacea.*
Saperda micans. Panz. Fn. Germ.
Oliv. Inſ. 68. tab. 2. fig. 12.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.

76. S. glabra, atra, thoracis margine flauo. Ent. ſyſt. ſuppl. 148. 47. * *marginata.*
Habitat in Carolina. Dom. Boſc.

77. S. nigra, elytris flauis, apice nigris. Ent. ſyſt. 2. 317. 48. *praeuſta.*
Leptura praeuſta. Linn. ſyſt. Nat. 2. 641. 24.
Geoff. Inſ. 1. 209. 4.
Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.
Payk. Fn. Sv. 3. 79. 12.
Habitat in Europa auſtraliori.

78.

ephippium 78. S. nigra, thoracis linea dorſali ſcutelloque cinereis, femoribus ferrugineis. Ent. ſyſt. 2. 317. 49. *
Panz. Fn. Germ. 23. tab. 17.
Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

picea. 79. S. picea, antennis pedibusque ferrugineis. Ent. ſyſt. 2. 317. 50. *
Habitat in America ſeptentrionali. D. Lund.

birticornis 80. S. griſea, antennis longis, hirtis. Ent. ſyſt. ſuppl. 148. 50. *
Habitat in India orientali. Muſ. D. Lund.

marginella 81. S. griſea, thoracis linea dorſali, ſcutello elytrorumque futura albis, antennis longis.
Habitat in Auſtria. Dom. de Meyerle.
Statura parua, filiformis praecedentium. Antennae corpore longiores, nudae, nigrae. Caput et thorax cineraſcentia, linea dorſali albidiore. Scutellum albidum, puncto nigro. Elytra cineraſcentia, futura margineque albidis. Pedes nigri.

hirta. 82. S. nigra, hirta, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 317. 51. *
Saperda filum. Roſſ. Fn. Etr. 1. 152. 380. tab. 5. fig. 10.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.

ſcutellata. 83. S. thorace ſubſpinoſo, nigra, antennis, elytris pedibusque cineraſcentibus, ſcutello albo. Ent. ſyſt. 2. 317. 52. *
Habitat in Germania. Muſ. Dom. de Sebeſtedt.

necydalina 84. S. obſcura, elytris abbreviatis, pallidis, antennis longis, ferrugineis. Ent. ſyſt. ſuppl. 148. 52. *
Habitat in Americae meridionalis Inſulis. Muſ. D. Lund.

rufimana. 85. S. cyanea, antennis nigris, femoribus anticis rufis.

Sa-

Saperda rufimana. Panz. Fn. Germ.
Habitat in Auſtria. Dom. de Meyerle.
Parua. Antennae longitudine corporis, nigrae.
Corpus totum pubeſcens, cyaneum, immaculatum, femoribus anticis ſolis rufis. Elytra punctata.

86. S. nigra, thoracis linea dorſali femoribusque apice rufis. Ent. ſyſt. 2. 318. 53. * *lineola.*
Panz. Fn. Germ. 23. tab. 18.
Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 4.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.

142. CALLIDIVM. *Palpi* quatuor, clauati.
Maxilla membranacea, bifida.
Ligula bifida: laciniis tenuiſſimis.
Antennae ſetaceae.

1. C. thorace ſubuilloſo, fuſco, elytris teſtaceo cinereoque variis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 348. 1. * *obſcurum.*
Habitat in Terra Diemenii. Muſ. Dom. Banks.

2. C. thorace villoſo: tuberculis duobus, corpore fuſco. Ent. ſyſt. 2. 318. 2. *bajulus.*
Cerambyx bajulus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 636. 76. Fn. Sv. 672.
Oliv.

Callidii corpus planiuſculum, ſaepius pubeſcens, depreſſiuſculum, immarginatum, tardum; *capite* ouato, obtuſo, inſerto; *oculis* reniformibus, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, in ſinu oculorum inſertis; *thorace* plano: margine rotundato, prominulo; *ſcutello* paruo, triangulo; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* elongatis, curſoriis, femoribus ſaepius clauatis; *tarſis* quadriarticulatis; *colore* varjo.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 30.
Frifh. Inf. 13. tab. 10.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 1.
Sulz. Inf. tab. 4. fig. 29.
Voet. Col. 2. tab. 22. fig. 111. 112.
Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 1.
Elem. tab. 76. fig. 4.
Payk. Fn. Sv. 3. 85. 6.
Degeer Inf. 5. 86. 22.
Habitat in Europae truncis.
Elytra in altero fexu pallida.

fennicum. 3. C. thorace tuberculato, rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus. Ent. fyft. 2. 319. 3.
Cerambyx fennicus. Linn. fyft. Nat. 2. 636. 77. Fn. Sv. 664.
Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 9.
Geoff. Inf. 1. 219. 19.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 2.
Voet. Col. 2. tab. 20. fig. 97.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.
Herbft. Arch. tab. 26. fig. 8.
Payk. Fn. Sv. 3. 87. 9.
Habitat in Europae truncis.

ruficolle. 4. C. thorace fubcylindrico, fpinofo, rufo, nigra, elytris violaceis, antennis mediocribus, piceis. Ent. fyft. 2. 319. 4. *
Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 27.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.

ebulinum. 5. C. thorace tuberculato, nigrum, elytris violaceis. Ent. fyft. 2. 319. 5. *
Cerambyx ebulinus. Linn. fyft. Nat. 2. 627. 83. *
Habitat in Africae plantis. Dom. Prof. Vahl.

6.

6. C. thorace laeui, fuſca, elytris pallidis: lineis duabus, poſtice coëuntibus fuſcis *tenellum.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. Dom. Lund.

Statura parua C. ruficollis. Antennae mediocres, ferrugineae. Caput et thorax rotundatus obſcura. Elytra punctata, integra, pallida: lineis duabus, ante apicem coëuntibus, fuſcis. Corpus flaueſcens, pedum geniculis nigris.

7. C. fuſcum, thorace elytrisque viridi-aeneis, femoribus ferrugineis. Ent. ſyſt. 2. 319. 6. * *aeneum.*

Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 46.

Habitat in India. Muſ. Dr. Hunter.

8. C. nigrum, opacum, femoribus omnibus clauatis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 320. 7. * *clauipes.*

Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 33.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 3.

Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 9.

Payk. Fn. Sv. 3. 81. 2.

Degeer Inſ. 5. 88. 23.

Habitat in Europae truncis. Dom. de Hattorff.

9. C. thorace ſpinoſo, nudo, atrum, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 320. 8. * *ſpinoſum.*

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

10. C. thorace ſubpubeſcente, corpore violaceo, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 320. 9. *violaceum.*

Cerambyx violaceus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 635. 70.

Fn. Sv. 667.

Friſh. Inſ. 12. tab. 3.

Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 2.

Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 10.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 4.

Voet. Col. 2. tab. 23. fig. 123.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 13.

tab. 234. fig. 1.

Habitat in Europae ſyluis.

punctatum 11. C. thorace pubescente, nigrum, punctatum, femoribus rubris, antennis mediocribus. Ent. syst. suppl. 149. 10. *
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

femoratum 12. C. thorace nudo, corpore atro, opaco, femoribus rubris, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 320. 10.
Cerambyx femoratus. Linn. syst. Nat. 2. 634. 69.
Oliv. Inf. 70. tab. 7. fig. 77.
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.
Degeer Inf. 5. 93. 81.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 5.
Habitat in Germaniae nemoribus.

falcratum. 13. C. thorace nudo, nitido, corpore atro, femoribus rufis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 320. 11. *
Callidium aulicum. Payk. Fn. Sv. 3 83. 3. β.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

amethystinum. 14. C. pubescens, cyaneum, pedibus rufis: femoribus clava atra. Ent syst. 2. 321. 12. *
Habitat in America. Prof. Helwig.

2fasciatum 15. C. thorace pubescente, atrum, elytris fasciis duabus rufis. Ent. syst. 2. 321. 13. *
Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 42.
Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.

acuminatum. 16. C. thorace verrucoso, nigricante, elytris acuminatis viridibus: futura cyanea. Ent. syst. 2. 321. 14. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lee.

rusticum. 17. C. thorace verrucoso, nigrum, elytris testaceis: macula media apiceque nigris. Ent. syst. 2. 321. 15. *
Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 49.
Habitat in Russia. Dom. Lee.

18. C. thorace glabro, ſubſpinoſo, nigrum, elytris obſcuro-aeneis. Ent. ſyſt. ſuppl. 149. 15. * *bungaricum.*

Callidium bungaricum. Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 12.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 7.
Habitat in Germania. Dom. Hybner.

19. C. thorace glabro, corpore fuſco, aeneo, antennis pedibusque fuſcis. Ent. ſyſt. 2. 321. 16. * *variabile.*

Cerambyx variabilis. Linn. ſyſt. Nat. 2. 635. 75. Fn. Sv 669.
Callidium dilatatum. Payk. Fn. Sv. 3. 91. 12.
Degeer Inſ. 5. 89. 25.
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 65.
Friſh. Inſ. 12. tab. 6. fig. 3. 4.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 6.
Habitat in Europae nemoribus.

20. C. thorace holoſericeo, cinereo, elytris teſtaceis: punctis eleuatis, rubris, ſcutello niueo. Ent. ſyſt. 2. 322. 17. * *ſericeum.*

Callidium holoſericeum. Roſſ. Fn. Etr. 1. 153. 382. tab. 1. fig. 6.
Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.

21. C. thorace elytrisque cinereo-villoſis, antennarum articulis baſi ſcutelloque niueis. Ent. ſyſt. ſuppl. 149. 17. * *concolor.*

Habitat - - -

22. C. thorace tuberculato, obſcure, rufo: linea dorſali nigra, elytris depreſſis, cineraſcentibus: lineis duabus eleuatis, atris. Ent. ſyſt. 2. 322. 18. * *tenebroſum*

Oliv. Inſ. 67. tab. 18. fig. 139.
Habitat in Cayenna. Muſ. Dom. Olivier.

variolosum 23. C. thorace subtuberculato, nigrum, elytris variolosis: futura acuminata. Ent. syst. suppl. 149. 18. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

rusticum. 24. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 322. 19.

Linn. syst. Nat. 2. 634. 67. Fn. Sv. 666.

Oliv. Ins. 70. tab. 3. fig. 39.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 6.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 8.

Sulz. Ins. tab. 4. fig. 29.

Hist. Ins. tab. 13. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 3. 80. 1.

Degeer Ins. 5. 83. 20.

Habitat in Europae syluis.

vittatum. 25. C. thorace rotundato, nudo, elytris ferrugineis: vitta media nigra, antennis corpore longioribus. Ent. syst. 2. 323. 20. *

Habitat in Guinea. Dom. Isert.

scutellare. 26. C. thorace tuberculato, nigrum, elytris punctatis, scutello albo, antennis mediocribus, ferrugineis.

Habitat in Amboina. Dom. Billardiere.

Duplo minus C. rustico. Caput nigrum, antennis ferrugineis, longitudine corporis. Thorax punctatus, subtuberculatus. Scutellum villosum, album. Elytra punctata, nigra. Pedes subferruginei, femoribus clauatis.

agreste. 27. C. thorace nudo, nigrum, elytris striatis, fuscis, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 323. 21. *

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

stigma. 28. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laeuibus: stigmate albo. Ent. syst. 2. 323. 22.

Cerambyx stigma. Linn. syst. Nat. 2. 625. 72.

Oliv.

Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 21.
Voet. Coleopt. 2. tab. 25. fig. 134. 135.
Degeer Inſ. 5. 109. 22. tab. 14. fig. 13.
Habitat in America.

29. C. thorace hirto, fuſcum, antennarum articulis baſi rufis. Ent. ſyſt. 2. 323. 23. * *fugax.*
Oliv. Inſ. 70. tab. . . fig. .
Habitat in Gallo prouincia. Muſ. Dom. Olivier.

30. C. thorace nudo, corpore fuſco, antennis longis flaueſcentibus. Ent. ſyſt. 2. 323. 24. * *pygmaeum*
Habitat in Anglia, Italia.

31. C. thorace mutico, nudo, atrum, nitidum, coleoptris faſcia interrupta, rubra. Ent. ſyſt. 2. 324. 25. * *equeſtre.*
Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

32. C. thorace mutico, fuluo, nigrum, antennis longiſſimis. Ent. ſyſt. 2. 324. 26. * *fuluicolle.*
Habitat in Surinam. Muſ. Dom. Boſc.

33. C. thorace rotundato, hirto, elytris acuminatis, pallide-teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 324. 27. * *hirtum.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 62.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. D. Banks.

34. C. thorace rotundato, pubeſcente, teſtaceo, elytris vireſcentibus, baſi teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 324. 28. * *pubeſcens.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 75.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. Dom. Olivier.

35. C. thorace rotundato, ſubtus, vtrinque macula tomentoſa, ferruginea, antennis longis, barbatis. Ent. ſyſt. 2. 324. 29. * *barbatum.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 41.
Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.

mixtum. 36. C. thorace rotundato ferrugineo, cinereo-lineato, elytris teſtaceis: macula griſeo-fuſca. Ent. ſyſt. ſuppl. 149. 29. *
Callidium griſeum. Oliv. Inſ. 70. tab. fig.
Habitat in Gallia. Muſ. D. Boſc.

griſeum 37. C. thorace rotundato pubeſcente, corpore obſcure cinereo, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 325. 20. *
Habitat in Barbaria. Muſ. D. Desfontaines.

compreſſum. 38. C. thorace laeui, obſcure, nigrum, antennis longis pedibusque teſtaceis, femoribus compreſſis. Ent. ſyſt. 2. 325. 31. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 44.
Habitat in Siam. Muſ. Dom. Banks.

variegatum. 39. thoracis dorſo glabro, atro: lineis quatuor albis, elytris flauo-irroratis. Ent. ſyſt. 2. 325. 32. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 58.
Habitat in noua Zelandia. Muſ. D. Banks.

lineatum. 40. C. thorace lineis duabus, elytris quatuor albis: mediis coëuntibus abbreuiatis. Ent. ſyſt. 2. 325. 33. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 50.
Habitat in noua Hollandia. Muſ. D. Banks.

ſulcatum. 41. C. thorace tomentoſo, cinereo, elytris albo nigroque ſtriatis. Ent. ſyſt. 2. 326. 34. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 48.
Habitat in noua Zelandia. Muſ. D. Banks.

ſanguineum. 42. C. thorace ſubtuberculato elytrisque ſanguineis, antennis mediocribus. Ent. ſyſt. 2. 326. 35. *
Cerambyx ſanguineus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 636. 80.
Oliv. Inſ. 70. tab. tab. 1. fig. 1.
Geoff. Inſ. 1. 220. 21.
Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 1.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 9.

Voet. Coleopt. 2. tab. 23. fig. 122.
Payk. Fn. Germ. 3. 39. 10.
Degeer Inf. 5. 92. 29.
Habitat in Europae fyluis.

43. C. thorace fubtuberculato, corpore teftaceo, antennis mediocribus, fufcis. Ent. fyft. 2. 326. 36. * *teftaceum.*
Cerambyx teftaceus. Linn. fyft. Nat. 2. 635. 75.
Fn. Sv. 670.
Geoff. Inf. 1. 218. 18.
Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 11.
Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 6.
Habitat in Europae fyluis.

44. C. thorace fubtuberculato, ferrugineo, elytris teftaceis, antennis mediocribus, villofis, femoribus clauatis. Ent. fyft. 2. 327. 37. * *pilicorne.*
Habitat in Americae Inſulis. Dr. Iſert.

45. C. thorace fubtuberculato, teftaceum, elytris apice violaceis. Ent. fyft. 2. 327. 38. * *praeuſtum*
Habitat in Italia. Dr. Allioni.
Feminam C. fennici credit Dom. de Paykull, at vix rite.

46. C. thorace tuberculato, villofo, nigrum, elytris rubris: macula apiceque violaceis. Ent. fyft. 2. 327. 89. * *ligneum.*
Habitat in Marylandia. Dr. Schulz.

47. C. thorace rotundato, ferrugineum, elytris pubefcentibus, aeneo-micantibus. *micans.*
Habitat in Guinea. Dom. Heffe. Muf. D. de Seheſtedt.
Statura parua praecedentium. Antennae corpore longiores, ferrugineae. Caput et thorax ferruginea, nitida, immaculata. Elytra fubſtriata, villoſa, aeneo valde micantia. Corpus ferrugineum, pedum geniculis nigris.

flauipes. 48. C. thorace rotundato, pubescente, ferrugineum, pedibus testaceis. Ent. syst. 2. 327. 41. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

luridum. 49. C. thorace subtuberculato, nudo, nigrum, elytris laeuibus, testaceis.
Cerambyx luridus. Linn. syst. Nat. 2. 634. 68.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 10.
Oliv. Ins. 70. tab. 7. fig. 78.
Payk. Fn Sv. 3. 87. 3.
Habitat in Europae syluis.

fuscum. 50. thorace subtuberculato, canaliculato, nudo, nigrum, elytris striatis, obscure-testaceis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 328. 42. *
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

4maculatum. 51. C. thorace villoso, fuscum, elytris maculis duabus ferrugineis, antennis longioribus. Ent. syst. 2. 328. 43. *
Habitat in Insula Guadeloupe. Mus. D. Lund.

melancholicum. 52. C. thorace plano, nudo: macula dorsali, fulua, fuscum, pedibus testaceis, antennis breuibus. Ent. syst. suppl. 149. 43. *
Habitat in Germaniae Quercu. Dom. Hybner.

triste. 53. C. thorace subtuberculato, nudo, elytris substriatis, corpore lurido, immaculato. Ent. syst. 2. 328. 44. *
Callidium aruense Panz. Naturf. 24. 30. 21. tab. 1. fig. 41.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 11.
Habitat in Saxoniae Quercu. Dom. Hybner.

vaccum. 54. C. thorace laeui, obscure, ferrugineo, elytris testaceis. Ent. syst. 2. 328. 45. *
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

55.

55. C. thorace ſubuilloſo, nigro: lineis quatuor al- *hafnienſe.*
bis, intermediis abbreuiatis, antennis breuibus.
Ent. ſyſt. 2. 328. 46. *
Cerambyx licinus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 636. 78.
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 8.
Panz. Naturf. 24. tab. 1. fig. 38.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 12.
Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 18.
Payk. Fn. Sv. 3. 93. 15.
Habitat in Europa boreali.

56. C. thorace laeui, nitido, elytris violaceis, tibiis *rufipes.*
ruſis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 329. 47. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 66.
Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

57. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris ſtriatis, *ſtriatum.*
antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2. 329. 48. *
Cerambyx ſtriatus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 635. 73.
Fn. Sv. 668.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 24.
Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 13.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 13.
Degeer Inſ. 5. 90. 26.
Payk. Fn. Sv. 3. 83. 4.
Habitat in Europae ſyluis.

58. C. nigrum, thorace atro, nitido, antennis breui- *aulicum.*
bus. Ent. ſyſt. ſuppl. 151. 48. *
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 14.
Payk. Fn. Sv. 3. 82. 3.
Habitat in Daniae nemoribus.

59. C. thorace rotundato, pubeſcente, ferrugineo, *ſtrepens.*
elytrorum ſutura acuminata, corpore teſtaceo,
antennis longis. Ent. ſyſt. ſuppl. 150. 19. *
Habitat in Tanger. Dom. Schousboe.

60.

bicolor. 60. C. thorace glabro, flauescente, capite elytrisque virescentibus, antennis mediocribus, nigris. Ent. syst. 2. 329. 49. *
Oliv. Inf 70. tab. 1. fig. 4.
Habitat in America meridionali.

lynceum. 61. C. thorace rotundato, subspinoso, villoso, nigrum, elytris macula subdidyma, fulua. Ent. syst. 2. 329. 50. *
Cerambyx lynceus. Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 97.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Yeats.

cyaneum. 62. C. thorace plano, tuberculato, villosum, violaceum, abdominis penultimo segmento ferrugineo, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 330. 52. *
Habitat in Italia.

pusillum. 63. C. thorace rotundato, nigrum, antennis tibiisque testaceis. Ent. syst. 2. 330. 53. *
Habitat in Germania. Dom. Schneider.
Nimis affine videtur C. pygmaeo.

2maculatum. 64. C. thorace rotundato, villoso, fuscum, elytris maculis duabus ferrugineis. Ent. syst. 2. 330. 54. *
Oliv. Inf 70. tab. 5. fig. 61.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

flauum. 65. C. thorace subrotundo, corpore flauo, femoribus clauatis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 330. 55. *
Habitat in America. Mus. Tottianum.

vndatum. 66. C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis duabus vndatis albis, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 331. 56. *
Cerambyx vndatus. Linn. syst. Nat. 2. 636. 79.
Fn. Sv. 675.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 15.

Oliv.

Oliv. Inf. 78. tab. 3. fig. 36.
Voet. Col. 2. tab. 19. fig. 87.
Degeer Inf. 5. 91. 28.
Pank. Fn. Sv. 3. 92. 14.
Habitat in Europae truncis.

67. C. thorace rotundato, nigrum, elytris faſciis tri- *terminans*
bus cinereis. Ent. ſyſt. ſuppl. 52. 56. *
Habitat in America boreali. D. Herſchel.

68. C. thorace rotundato, elytris liuidis: faſciis tri- *coloreum.*
bus fuſcis, antennis breuibus. Ent. ſyſt. 2.
331. 57. *
Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 67.
Habitat in Carolina.

69. C. thorace rotundato rufo, elytris nigris baſi *varium.*
rufis: faſciis duabus albis. Ent. ſyſt. 2. 331.
58. *
Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 55.
Habitat in America boreali. D. Yeats.

143. CLYTVS. *Palpi* quatuor breues, extrorſum craſſiores.

Maxilla bifida.

Ligula breuis, truncata, integra.

Antennae ſetaceae.

1. C. thorace rotundato flauo faſciato, elytris faſciis *flexuoſus.*
ſeptem

Clyti corpus oblongum, cylindricum, ſaepius pubeſcens, immarginatum, tardum; *capite* ouato, decliui, inſerto; *oculis* magnis, reniformibus, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, approximatis, in ſinu oculorum inſertis; *thorace* globoſo, latitudine elytrorum; *ſcutello* rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiuſculis, curſoriis; *femoribus* compreſſis; *tarſis* quadriarticulatis; *colore* vario.

septem flauis: anticis antrorsum posticis, retrorsum arcuatis.
Callidium flexuosum. Ent. syst. 2. 331. 59. *
Leptura Robiniae. Forst. Cent. 1. 43.
Leptura picta. Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 2.
Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 76.
Voet. Col. tab. 91. fig. 91.
Habitat in Americae Robinia.

minutus. 2. C. testaceus, elytris fascia abbreuiata alba. Ent. syst. 2. 332. 60. *
Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 56.
Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

floralis. 3. C. thorace globoso albo-fasciato, elytris nigris: fasciis quinque albis; secunda tertiaque lunatis. Ent. syst. 2. 332. 61.
Callidium fasciatum. Herbst. Arch. tab. 26 f. 17.
Cerambyx floralis. Pall. Iter. 2. 724. 63.
Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 53.
Voet. Col. tab. 19. fig. 93.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 16.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.

fulminans. 4. C. thorace globoso maculato, elytris nigris: fasciis undato-angulatis albis. Ent. syst. 2. 332. 62. *
Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 63.
Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.

semipunctatus. 5. C. thorace globoso nigro: punctis tribus albis, elytris nigris: punctis duobus lunulisque tribus albis. Ent. syst. suppl. 151. 62. *
Habitat in Germania.

atomarius 6. C. thorace globoso cinereo maculato, elytris punctis strigaque postica flexuosa albidis. Ent. syst. 2. 332. 63. *
Habitat Halae Saxonum. D. Hybner.

7.

7. C. thorace globoso virescente: maculis duabus ferrugineis, elytris bidentatis nigris: strigis flauis basi rufis. Ent. syst. suppl. 152. 63. ♂ *luscus.*

Habitat in America boreali. D. v. Rohr.

8. C. thorace rotundato, elytris fasciis quatuor flauis: prima interrupta, reliquis retrorsum arcuatis. Ent. syst. 2. 333. 64. *arcuatus.*

Leptura arcuata. Linn. syst. Nat. 2. 640. 21. Fn. Sv. 696.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 16.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 14.

Geoff. Inf. 1. 212. 10.

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 14.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 6.
tab. 107. fig. 2. 3.

Payk. Fn. Sv. 3. 95. 17.

Habitat in Europae hortis.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor, breues, aequales extrorsum crassiores: *anteriores* vix longiores, quadriarticulati, articulis sensim crassioribus, vltimo breui truncato, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* triarticulati: articulo vltimo breui, crassiori, truncato, adnati ligulae basi superiori. *Mandibula* breuis, cornea, crassa, edentula, apice acuta. *Maxilla* breuis, cornea, compressa, bifida: lacinia interiore breui, acuta, exteriore longiore, apice crassiore, truncata. *Ligula* breuis, membranacea, truncata, integra. *Labium* transuersum, angustum, corneum, late subemarginatum.

9. C. thorace rotundato, nigro, elytris nigris: fasciis flauis, secunda antrorsum arcuata, pedibus totis ferrugineis. Ent. syst. 2. 333. 65. *arietis.*

Leptura arietis. Linn. syst. Nat. 2. 640. 23. Fn. Sv. 695.

Oliv.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 20.
Geoff. Inf. 1. 214. 11.
Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 16.
Petiv. Gazoph. tab. 36. fig. 6.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 7.
tab. 107. fig. 3.
Panz. Fn. Germ. 4. tab. 15.
Friſh. Inf. 12. tab. 3. fig. 5.
Habitat in Europae hortis.

gazella. 10. C. thorace rotundato, nigro, elytris nigris: faſciis flauis, ſecunda antrorſum arcuata, pedibus ferrugineis: femoribus nigris. Ent. ſyſt. 2. 333. 66. ♀
Habitat Kiliae.

feſtiuus. 11. C. thorace rotundato, niger, elytris maculis tribus flauis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.
Statura et ſumma affinitas C. laeti. Antennae extrorſum fere incraſſatae, nigrae. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra truncata, ſcutello maculisque tribus laete flauis: baſeos duabus approximatis, maioribus ad ſuturam, poſteriore transuerſa. Corpus nigrum, pectore vtrinque macula, abdomine faſciis duabus, baſeos flauis. Pedes ſubelongati, nigri.

laetus. 12. C. thorace rufo, elytris truncatis, atris: maculis tribus flauis, antennis pedibusque ferrugineis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. Dom. Lund.
Minor C. arietis. Antennae breues, ferrugineae. Caput rufum, mandibulis, atris. Thorax rufus, baſi interdum flauus. Elytra laeuia, nigra, ſtriga abbreuiata, per ſcutellum ducta, macula lineari obliqua, altera approximata, triangulari

ad

ad baſin ſtrigaque pone medium flauis. Corpus villoſo-flauum, ſegmentis abdominalibus apice atris. Pedes ferruginei.

13. C. ater, elytris medio coarctatis: maculis duabus albis. *coarctatus*

Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 71.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.

C. plebejo paullo maior. Antennae breues, compreſſae. Caput et thorax piloſa, atra. Elytra nitidiora, piloſa, laeuia, atra: maculis duabus albis, altera lineari obliqua ad baſin, altera maiore in medio. Corpus atrum, abdomine baſi pectoreque argenteo nitidulis.

14. C. thorace rufo-maculato, niger, elytris margaritaceis baſi nigris. *margaritaceus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.

Statura et magnitudo C. plebeii. Caput cum antennis atrum. Thorax globoſus, ater, vtrinque maculis duabus magnis, ruſis. Elytra plana, laeuiſſima, margaritacea, nitida, baſi margineque exteriori atris. Corpus atrum, femoribus clauatis.

15. C. thorace immaculato, elytris nigris: ſtrigis tribus punctoque humerali albis. Ent. ſyſt. 2. 334 67. *plebejus.*

Callidium pallidum. Oliv. Inſ. 70. tab. 6. f. 72.

Leptura ruſtica. Linn. ſyſt. Nat. 2. 639. 17. Fn. Sv. 692.

Geoff. Inſ. 1. 215. 12.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. 3. 99. 21.

Habitat in Europae nemoribus.

16.

maſſilienſe. 16. C. thorace immaculato, elytris nigris: ſtrigis tribus albis; anteriore incurua. Ent. ſyſt. 2. 334. 68. *

Leptura maſſilienſis. Linn. ſyſt. Nat. 2. 640. 19.
Geoff. Inſ. 1. 215. 12.
Oliv. Inſ. 70. tab. 6. fig. 70.
Habitat in Germania.

mucronatus. 17. C. thorace maculato, elytris mucronatis nigris: ſtrigis tribus arcuatis flauis baſi ferrugineis. Ent. ſyſt. 2. 334. 69. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 3. fig. 34.
Habitat in America. D. Solander.

angulatus. 18. C. thorace muricato, elytris mucronatis: maculis tribus dorſalibus punctoque medio flauis. Ent. ſyſt. 2. 335. 70. *
Habitat - - Muſ Britt.

erythrocephalus 19. C. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis fuſcis: ſtrigis quatuor flauis, femoribus clauatis compreſſis. Ent. ſyſt. 2. 335. 71. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 5. fig. 60.
Habitat in America. Dr. Solander.

ſenilis. 20. C. thorace nigro: tuberculis transuerſis, elytris teſtaceis: baſi margineque omni cinereis. Ent. ſyſt. ſuppl. 152. 7. *
Habitat in Cayenna. D. Cuvier.

detritus. 21. C. thorace flauo faſciato, elytris nigris: faſciis quinque flauis, pedibus ferrugineis. Ent. ſy 2. 335. 72. *
Leptura detrita. Linn. ſyſt. Nat. 2. 646. 20.
Fn. Sv. 694.
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 17.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 9.
tab. 64. fig. 3.

Geoff. Inf. 1. 216. 13.
Habitat in Europae hortis.

22. C. niger, elytris glaucis basi nigro-maculatis. *glaucus.*
• Ent. syst. 2. 336. 73. *
Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 68.
Habitat in India orientali. Musf. D. Banks.

23. C. ater, thorace fasciis duabus, elytris quatuor flauis. Ent. syst. 2. 336. 74. * *6fasciatus.*
Habitat - - Musf. Britt.

24. C. thorace ferrugineo, elytris nigris: fasciis tribus albis; prima annulari. Ent. syst. 2. 336. 75. * *trifasciatus.*
Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 59.
Habitat in Lusitania. Dr. Grey.

25. C. thorace nigro trimaculato, elytris rotundatis subuirescentibus: fasciis tribus abbreuiatis nigris, prima lunari. Ent. syst. 2. 336. 76. * *Verbasci.*
Leptura Verbasci. Linn. syst. Nat. 2. 640. 22.
Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 5.
tab. 6. fig. 15.
Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 12.
Panz. Fn. Germ. 75. tab. 17.
Herbst. Arch. tab. 26. fig. 19.
Habitat in Europae australioris Verbasco.

26. C. thorace rotundato: fascia nigra, elytris virescentibus: fasciis tribus integris nigris, prima annulari. Ent. syst. 2. 336. 77. * *ornatus.*
Callidium ornatum. Herbst. Arch. tab. 26. f. 16.
Stenocorus duplex. Scopol. Fl. Inf. tab. 20. fig. 5.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 18.
Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 12.
Habitat in Germania. D. Smidt.

27. C. thorace nigro-maculato, elytris bidentatis virescentibus: annulo macula strigaque nigris. *bidens.*

Ha-

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Statura omnino et magnitudo C. ornati. Antennae breues, fuſcae, baſi ferrugineae. Caput virefcens. Thorax rotundatus, virefcens: maculis nigris. Elytra apice bidentata, virefcentia, annulo baſeos ſtriga media, cum annulo coëunte maculaque orbiculata apicis atris. Pedes nigri.

annulus. 28. C. virefcens, elytris faſciis tribus nigris: tertia annulari.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muſ. D. Lund.
Statura omnino C. ornati. Caput virefcens, antennis breuibus, ferrugineis. Thorax rotundatus, virefcens, immaculatus. Elytra virefcentia: faſciis tribus nigris; vltima annulari. Pedes pallide teſtacei.

4punctatus. 29. C. virefcens, elytris punctis quatuor. Ent. ſyſt. 2. 337. 78. *
Geoff. Inſ. 1. 213. 8.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 19.
Habitat in Gallia haud infrequens.

annularis. 30. C. thorace nigro-maculato, elytris bidentatis ſubuirefcentibus: faſciis tribus nigris, prima annulari. Ent. ſyſt. 2. 337. 79. *
Callidium annulare Oliv Inſ. 70. tab. 6. f. 74.
Habitat in Siam, Muſ. D. Banks. in India. Muſ. D. Lund.

aegyptiacus. 31. C. thorace ferrugineo, elytris cineraſcentibus: faſciis tribus fuſcis; prima annulari. Ent. ſyſt. 2. 337. 80. *
Habitat in Oriente. D. Prof. Forſkahl.

myſticus. 32. C. niger, elytris fuſcis: faſciis apiceque cineres baſi rufis. Ent. ſyſt. 2. 337. 81.
Leptura myſtica. Linn. ſyſt. Nat. 2. 639. 18.
Fn. Sv. 693.

Oliv.

Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 14.
Geoff. Inſ. 1. 217. 15.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.
Voet. Coleopt. 2. tab. 26. fig. 8.
Payk. Fn. Sv. 3. 98. 20.
Degeer Inſ. 5. 82. 19.
Habitat in Europae hortis.

33. C. virescens, antennis nigris, pedibus testaceis. *virens.*
Ent. syst. 2. 338. 82. *
Habitat in Barbaria. Musc. Dom. Desfontaines.

34. C. niger, elytris cinereo-fasciatis, basi bituber- *gibbosus.*
culatis, apice acuminata. Ent. syst. 2. 338. 83. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 2. fig. 18.
Habitat in Italia. D. Daldorff.

35. C. thorace brunneo, elytris nigris: fascia media *vnifascia-*
niuea, basi brunneis. Ent. syst. 2. 338. 84. * *tus.*
Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 12.
Habitat in Gallo prouincia. Dom. Olivier.

36. C. ater, elytris striga obliqua alba. Ent. syst. 2. *picipes.*
338. 85. *
Oliv. Inſ. 70. tab. 4. fig. 43.
Habitat in America. Musc. Dr. Hunter.

37. C. ferrugineus, elytris aureis: strigis duabus *pinideus.*
albis.
Habitat in Carolina. Musc. Dom. Bosc.
Statura et magnitudo C. Alni. Antennae corpore paullo longiores, ferrugineae. Caput et thorax globosus ferruginea, immaculata. Elytra aurea, nitida, basi linea impressa strigisque duabus albis, quae tamen vix futuram attingunt. Corpus ferrugineum, femoribus clauatis.

Alni. 38. C. niger, elytris fasciis duabis albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugineis. Ent. syst. 2. 338. 86. *

Leptura Alni. Linn. syst. Nat. 2. 689. 19.
Oliv. Ins. 70. tab. 3 fig. 7.
Herbst. Arch. tab. 26. fig. 21.
Scopol. Flor. Ins. tab. 20. fig 3.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 20.
Payk. Fn. Sv. 3. 100. 22.
Habitat in Anglia, Germania.

144. LEPTVRA.

Palpi filiformes.
Maxilla vnidentata, apice setosa.
Ligula membranacea, bifida.
Antennae setaceae.

vnipuncta. 1. L. nigra, elytris rufis: puncto medio nigro. Ent. syst. 2. 339. 1.
Oliv. Ins. 73. tab. 1. fig. 9.
Habitat Dresdae. Dom. Romanus.

hastata. 2. L. atra, elytris rubris: apice futuraque media nigris. Ent. syst. 2 339. 2. *
Oliv. Ins. 73. tab. 1. fig. 5.
Geoff. Ins. 1. 226. 6.
Sulz. Ins. tab. 5. fig. 11.
Habitat in Europa australiori.

2punctata. 3. L. nigra, villosa, elytris liuidis: futura puncto media apiceque nigris. Ent. syst. 2. 340. 3. *
Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks. 4.

Leptuae corpus oblongum, antice posticeque attenuatum, saepius tomentosum, immarginatum, tardum; *capite* exserto, ouato; *oculis* globosis, prominulis, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis; *thorace* rotundato, angusto, antice angustiore, inermi; *scutello* paruo, triangulo; *elytris* rigidis, fornicatis, saepe emarginatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario.

4. L. thorace villoſo aureo, elytris teſtaceis apice ni- *tomentoſa.*
gris. Ent. ſyſt. 2. 340. 4. *
Geoff. Inſ. 1. 227. 8.
Payk. Fn. Sv. 3. 108. 9.
Degeer Inſ 5. 136. 13.
Habitat in Gallia. Muſ. D. de Seheſtedt.

5. L. thorace laeui, nigra, elytris teſtaceis, apice ni- *maculicor-*
gris, antennarum articulis, baſi flauis. Ent. ſyſt. *nis.*
ſuppl. 152. 5. *
Payk. Fn. Sv. 3. 111. 12.
Degeer Inſ. 5. 139. 16.
Habitat in Germania.

6. L. nigra, elytris rubeſcentibus liuidisue: ſutura *melanura.*
apiceque nigris. Ent. ſyſt. 2. 340. 5.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 637. 2.
Geoff. Inſ. 1. 226. 7. tab. 4. fig. 1.
Petiv. Gazoph. tab. 30. fig. 5.
Degeer Inſ. 5. 137. 14.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 4.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 19.
Payk. Fn. Sv. 3. 110. 11.
Habitat in Europae floribus frequens.

7. L. nigra, elytris pedibusque liuidis, elytris ſutura *laeuis.*
apiceque nigris. Ent. ſyſt. 2. 340. 6. *
Panz. Fn. Germ. 34. tab. 16.
Payk. Fn. Sv. 3. 128. 31.
Degeer Inſ. 5. 139. 17.
Habitat Kiliae.

8. L. nigra, elytris teſtaceis, immaculatis, pedibus *liuida.*
nigris. Ent. ſyſt. 2. 340. 7. *
Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 23.
Habitat in floribus Kilonienſibus. Muſ. D. Lund.

9. L. nigra, elytris teſtaceis: vitta nigricante. Ent. *ſtrigilata.*
ſyſt. 2. 341. 8. *

Payk. Fn. Sv. 3. 112. 13.
Habitat in Suecia. Dom. Com. de Souza.

emargina-ta. 10. L. atra, elytris purpureis, apice emarginatis, nigris. Ent. ſyſt. 2 341. 9. *
Habitat in Cayenna. Dr. Hunter.

ſanguino-lenta. 11. L. nigra, elytris ſanguineis. Ent. ſyſt. 2. 341. 10.
Leptura ſanguinolenta. Linn. ſyſt. Nat. 2. 638. 4. Fn. Sv. 679.
Leptura variabilis. Payk. Fn. Sv. 3. 109. 10.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 8.
Oliv. Inſ. 73. tab. 2. fig. 13.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9.
Degeer Inſ. 5. 137. 14.
Habitat in Europae floribus.

cincta. 12. L. atra, elytris punctatis, teſtaceis: margine toto atro.
Habitat in Auſtria. Dom. de Meyerle.
Statura omnino L. ſanguinolentae, at minor, cuius marem olim credidi. Caput, thorax, corpus atra, immaculata. Elytra punctata, teſtacea margine exteriori, late atro. Abdomen ſubtus pilis aureis, nitens.

meridiana 13. L. thorace ſubſpinoſo, elytris faſtigiatis, pectore nitente. Ent. ſyſt. 2. 341. 11. *
Stenocorus diſpar. Panz. Fn. Germ. 17. tab. 1. 2.
Cerambyx meridianus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 630. 47. Fn. Sv. 648.
Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 4.
tab. 279. fig. 3.
Payk. Fn. Sv. 3. 104. 4.
Degeer Inſ. 5. 130. 5.
Habitat in Europae floribus.
Mas nigricans, femina teſtacea.

thoracica. 14. L. atra, thorace ruſo.

Leptura thoracica. Creutz. Inſ. 1. 125. 16. tab. 3. fig. 28.
Payk. Fn. Sv. 3. 105. 5.
Habitat in Carolina. Dom. de Meyerle.
Statura L. meridianae, at paullo craſſior. Caput, elytra, corpus nigra, immaculata. Thorax ſolus rufus.

15. L. atra, elytris, punctatis, baſi rubris. *canadenſis.*
Leptura canadenſis. Oliv. Inſ. 73. tab. fig.
Habitat in Canada. Muſ. Dom. Boſc.
Statura magna L. thoracicae. Caput atrum, articulis intermediis teſtaceis. Thorax rotundatus, punctatus, ater, immaculatus. Elytra punctata, atra, baſi late rufa. Abdomen atrum, abdomine villis argenteis micante.

16. L. ferruginea, antennis elytris pectoreque fuſcis. *villica.*
Ent. ſyſt. 2. 341. 12.*
Leptura rueſtita. Linn. ſyſt. Nat. 2. 638. 6.
Payk. Fn. Sv. 3. 113. 14.
Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 1.
Habitat in Anglia. Muſ. Britt.

17. L. nigra, thorace elytris tibiisque purpureis. *rubra.*
Ent. ſyſt. 2. 342. 13.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 638. 3. Fn. Sv. 500.
Friſh. Inſ. 12. tab. 6. fig. 6.
Payk. Fn. Sv. 3. 107. 8.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 11.
Degeer Inſ. 5. 132. 7.
Sulz. Inſ. tab. 5. fig. 30.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 2.
Habitat in Europa.

18. L. nigra, elytris teſtaceis, tibiis rufis, thorace poſtice rotundato. Ent. ſyſt. 2. 342. 14. *teſtacea.*
Leptura teſtacea. Linn. ſyſt. Nat. 2. 638. 5. Fn. Sv. 680.

Leptu-

Leptura dispar. Payk. Fn. Sv. 3. 107. 8.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 12.
Degeer Inf. 5. 135. 11.
Schaeff. Icon tab. 39. fig. 3.
Habitat in Europae floribus.
Mas praecedentis videtur. Saepius in copula inueniuntur.

pubescens. 19. L. nigra, cinereo-villosa: costa alarum basi testacea Ent. syst. 2. 342. 15. *
Payk. Fn. Sv. 3. 106. 7.
Habitat in Suecia. D. de Paykull.

virens. 20. L. sericeo-virescens, antennis fusco viridique variis. Ent. syst. 2. 342. 16.
Linn. syst. Nat. 2. 638. 7. Fn. Sv. 682.
Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 111.
Panz. Naturf. 24. 31. 42. tab. 1. fig. 42.
Payk. Fn. Sv. 3. 117. 19.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 13.
Degeer Inf. 5. 131. 6.
Habitat in Europae arboribus.

smaragdula. 21. L. sericeo-virescens, antennis pedibusque nigris. Ent. syst. 2. 342. 17. *
Payk. Fn. Sv. 3. 118. 20.
Habitat in Snecia. Dom. de Paykull.

holosericea. 22. L. nigra, cinereo-pubescens, elytris emarginatis, tibiis testaceis.
Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.
Maior L. atra et omnino distincta. Corpus totum nigrum, cinereo-holosericeum, capite tamen elytrisque emarginatis, magis nigris. Tibiae omnes basi testaceae.

rufipes. 23. L. villosa, nigra, elytris rotundatis, pedibus rufis.
Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.
Affinis certe L. atrae. Differt tantum, elytris haud emarginatis et pedibus omnibus rufis. 24.

24. L. corpore toto nigro. Ent. syst. 2. 342. 28. *
Geoff. Inf. 1. 228. 10.
Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 4.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 14.
Voet. Col. 2. tab. 29. fig. 9.
Payk. Fn. Sv. 3. 125. 26.
Habitat in Europae floribus.

25. L. nigra, abdomine humerisque ferrugineis. Ent. *humeralis.*
syst. 2. 343. 29.
Habitat in Germania. Dom. Schneider.

26. L. aureo-pubescens, elytris ferrugineis: macu- *fugax.*
la apicis flaua. Ent. syst. suppl. 153. 19. *
Habitat in America. Dom. Hybner.

27. L. nigra, elytris puncto baseos lineaque media *exclamationis.*
flauis. Ent. syst. 2. 343. 20. *
Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.
Varietas L. 6 guttatae teste Dom. de Paykull.

28. L. cinerea, elytris testaceis: futura nigra. Ent. *futuralis.*
syst. 2. 343. 21. *
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

29. L. punctata, nigra, scutello albo. Ent. syst. 2. *scutellata.*
343. 22. *
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 15.
Payk. Fn. Sv. 3. 109. 6.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.
Thorax et elytra valde punctata.

30. L. laeuis, nigra, elytris subacuminatis, subtus *Chamomillae.*
cinereo-holosericea.
Habitat in Austriae Chamomilla. Dom. Scheidler.
Magnitudo et statura L. scutellatae, at puncta impressa omnino desunt. Elytra apice in angulum excurrunt. Corpus subtus cinereo-holosericeum.

31. L. ferruginea, elytris testaceis. Ent. syst. 2. *luridа.*
343. 23. * Panz.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 16.
Habitat in ſyluis Herciniae. Dom. Helwig.

femorata. 32. L. nigra, femoribus baſi rufis. Ent. ſyſt. 2. 343. 24.
Payk. Fn. Sv. 3. 127. 29.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

ruficornis. 33. L. nigra, antennis pedibusque rufis. Ent. ſyſt. 2. 344. 25. *
Payk. Fn. Sv. 3. 127. 30.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.

marginata 34. L. nigra, elytrorum margine tibiisque poſticis rufis. Ent. ſyſt. 2. 344. 26. *
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 17.
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 8.
Habitat in Norwegia. Muſ. D. Lund.

lunata. 35. L. atra, elytris macula lunata flaua.
Habitat in Carolina. Muſ. Dom. Boſc.
Media. Caput cum antennis atrum. Thorax pubeſcens, punctatus, ater, poſtice pilis aliquot aureis. Elytra punctata, atra, macula magna baſeos lunata, flaua, apice emarginata. Corpus atrum.

nigra. 36. L. elytris attenuatis, corpore nigro, nitido, abdomine rubro. Ent. ſyſt. 2. 344. 27. *
Leptura nigra. Linn. ſyſt. Nat. 2. 639. 14. Fn. Sv. 687.
Geoff. Inſ. 1. 227. 9.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 7.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 18.
Payk. Inſ. Sv. 3. 120. 22.
Degeer Inſ. 5. 144. 24.
Habitat in Europae floribus.

praeuſta. 37. L. aureo-pubeſcens, capite elytrorumque apicibus nigris. Ent. ſyſt. 2. 344. 28. *

Panz.

Panz. Fn. Germ. 34. tab 17.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

38. L. fuſca, elytris nigris: punctis duobus baſeos ferrugineis. Ent. ſyſt. 2. 344. 29. * *4guttata.*
Habitat Halae Saxonum.

39. L. obſcure-aenea, pedibus flauis. Ent. ſyſt. 2. 344. 30. * *roſtrata.*
Habitat in Ammi maius Africae. Dom. Prof. Vahl.

40. L. lutea, thorace lineis duabus, elytris faſciis quatuor nigris. Ent. ſyſt. 2. 345. 31. * *luteicornis*
Habitat in Carolina. Muſ. Britt.

41. L. nigra, elytris teſtaceis: maculis duabus nigris. Ent. ſyſt. 2. 345. 32. * *4maculata*
Oliv. Inſ. 73. tab. 1. fig. 7.
Payk. Fn. Sv. 3. 102. 2.
Habitat in Germania. D. Smidt.

42. L. thoracè ſpinoſo, pubeſcente, elytris faſtigiatis, liuidis: taenia obſcura longitudinali ſinuata. *lamed.*
Stenocorus lamed. Ent. ſyſt. 2. 293. 2.
Cerambyx lamed. Linn. ſyſt. Nat. 2. 630. 46.
Fn. Sv. 649.
Geoff. Inſ. 1. 226. 6.
Payk. Fn. Sv. 3. 101. 1.
Habitat in Europae floribus.

43. L. nigra, elytris maculis duabus remotis, ferrugineis. Ent. ſyſt. 2. 345. 33. * *4puſtulata.*
Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

44. L. nigra, elytris liuidis: maculis quatuor nigris. Ent. ſyſt. 2. 345. 34. * *8maculata*
Leptura 8maculata. Linn. ſyſt. Nat. 2. 638. 10.
Fn. Sv. 684.
Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 2.
Icon. tab. 1. fig. 7.
Habitat in Europae floribus.

45.

interroga-tionis. 45. L. nigra, elytris flauis: linea longitudinali arcuata maculisque quatuor marginalibus nigris. Ent. syst. 2. 345. 35. *

Linn. Fn. Sv. 685.

Payk. Fn. Sv. 3. 121. 24.

Habitat in Suecia. Dom. de Souze.

marginella 46. L. nigricans, elytris futura maculis duabus marginalibus apiceque flauis. Ent. syst. 2. 346. 36. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

Varietas praecedentis teste Dom. de Paykull.

6maculata 47. L. nigra, elytris testaceis: fasciis tribus dentatis, nigris; anteriore subinterrupta. Ent. syst. 2. 346. 37. *

Leptura 6maculata. Linn. syst. Nat. 2. 638. 11.

Fn. Sv. 686.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 9.

Voet. Col. 2. tab. 26. fig. 12.

tab. 21. fig. 108.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 21.

Herbst. Arch. 5. tab. 26. fig. 26.

Payk. Fn. Sv. 3. 123. 25.

Degeer Ins. 5. 133. 9.

Habitat in Europae hortis.

7punctata. 48. L. nigra, thorace testaceo: puncto nigro, coleoptris testaceis: punctis septem. Ent. syst. 2. 346. 38. *

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

12maculata 49. L. nigra, elytris flauis: maculis sex nigris. Ent. syst. 2. 346. 39. *

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

attenuata. 50. L. elytris attenuatis, fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis. Ent. syst. 2. 346. 40.

Leptura attenuata. Linn. syst. Nat. 2. 639. 13.

Fn. Sv. 688. Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 6.
Payk. Fn. Sv. 3. 116. 18.
Habitat in Europae floribus.

51. L. nigra, elytris faſciis quatuor flauis: anterio- *annularis.*
re annulari.
Habitat in Sibiria. Muſ. D. Lund.
Statura omnino L. attenuatae. Caput et thorax nigra, pube-aurea parum nitidula. Elytra laeuia, attenuata, nigra, annulo baſeos faſciisque tribus flauis. Corpus nigrum, pube aurulenta, nitidulum.

52. L. nigra, elytris punctis albis: exterioribus duo- *12guttata.*
bus minoribus.
Habitat in Sibiria. Muſ. D. Lund.
Statura praecedentis. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra laeuia, truncata, atra, punctis ſex albis: quatuor ad futuram maioribus, duobus exterioribus minoribus.

53. L. nigra, coleoptris attenuatis, flauis: faſciis *calcarata.*
quatuor nigris; anteriore punctata, ſecunda interrupta, tibiis poſticis bidentatis. Ent. ſyſt. 2. 347. 41.
Geoff. Inſ. 1. 226. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 114. 16.
Habitat in Germania. D. Smidt.

54. L. nigra, coleoptris teſtaceis: faſciis quatuor ni- *ſubſpinoſa.*
gris, anteriore punctata, antennis pedibusque flauis. Ent. ſyſt. 2. 347. 42. *
Leptura armata. Herbſt. Arch. tab. 26. fig. 24.
Payk. Fn. Sv. 3. 115. 17.
Habitat Kiliae.

55. L. nigra, elytris maculis duabus punctisque duo- *ſinuata.*
bus flauis. Ent. ſyſt. 2. 347. 43. *
Habitat Kiliae.

56.

4fasciata. 56. L. nigra, elytris testaceis: fasciis quatuor dentatis, nigris. Ent. syst. 2. 348. 44.
Leptura 4fasciata. Linn. syst. Nat. 2. 639. 12.
Fn. Sv. 687.
Oliv. Ins. 73. tab. 2. fig. 17.
Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 6.
Degeer Ins. 5. 132. 8. tab. 4. fig. 11.
Payk. Fn. Sv. 3. 114. 15.
Habitat in Europae floribus.

aurulenta. 57. L. atra, thoracis margine antico posticoque aureis, elytris testaceis: fasciis quatuor simplicibus nigris. Ent. syst. 2. 348. 45. *
Habitat Kiliae.

zebrata. 58. L. nigra, thorace aureo, tomentoso, elytris fastigiatis, subspinosis: fasciis quatuor flauis, baseos lunata.
Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.
Praecedentibus minor. Antennae nigrae. Caput et thorax tomento aureo tecta. Elytra attenuata, apice spinosa, nigra, fasciis quatuor flauis, baseos lunata reliquis linearibus. Corpus nigrum, abdominis segmentis margine albo-ciliatis. Pedes rufi.

dubia. 59. L. subuilloſa, nigra, elytris testaceis, nigro-punctatis, pedibus nigris. Ent. syst. 2. 348. 46. *
Habitat in Siberia. Mus. D. Banks.

connexa. 60. L. fusca, elytris fasciis duabus cinereis, futura connexis. Ent. syst. suppl. 153. 47. *
Habitat in Tanger. Dom. Schousboe.

6guttata. 61. L. nigra, elytris maculis tribus flauis. Ent. syst. 2. 349. 47. *
Herbst. Arch. tab. 26. fig. 23.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 22.
Payk. Fn. Sv. 3. 119. 21.
Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

62.

62. L. atra, elytris fasciis tribus flauis: anteriore interrupta. Ent. syst. 2. 349. 48. * — *3fasciata.*

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 10.
Habitat in Suecia. Mus. D. Lund.
Varietatem L. 6maculatae credit D. de Paykull.

63. L. nigra, elytris basi testaceis, apice nigris, flauo-reticulatis. Ent. syst. suppl. 153. 48. * — *reticulata.*

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

64. L. viridi-coerulea, elytris subfastigiatis. Ent. syst. 2. 349. 49. * — *fericea.*

Leptura fericea. Linn. syst. Nat. 2. 638. 8. Fn. Sv. 683.
Schaeff. Icon. tab. 84. fig. 1.
Habitat in Europae floribus.

65. L. thorace orbiculato, corpore toto atro, nitido. Ent. syst. 2. 349. 50. * — *morio.*

Habitat in Suecia. Mus. D. de Sehestedt.

66. L. thorace globoso abdomineque rubris, elytris nigris. Ent. syst. 2. 349. 51. — *collaris.*

Leptura collaris. Linn. syst. Nat. 2. 639. 16. Fn. Sv. 691.
Geoff. Inf. 1. 228. 11.
Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 9.
Degeer Inf. 5. 143. 22.
Payk. Fn. Sv. 3. 126. 28.
Habitat in Europae floribus.

67. L. thorace globoso, nigro, elytris violaceis, abdomine rufo. Ent. syst. 2. 349. 52. * — *virginea.*

Leptura virginea. Linn. syst. Nat. 2. 639. 15. Fn. Sv. 690.
Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 24.
Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 8.
Degeer Inf. 5. 144. 23.
Payk. Fn. Sv. 3. 125. 27.
Habitat in Europae floribus.

holoſericea 68. L. nigra, obſcura, ano rufo.
Habitat in Germania. D. Smidt.
Magnitudo L. virgineae, tota nigra minime nitida, ano ſolo late rufo.

tenuicollis. 69. L. teſtacea, antennis elytrorumque apicibus nigris.
Habitat in Guinea. Dom. Meier. Muſ. Dom. de Seheſtedt.
Statura ab hoc genere parum differt. Antennae nigrae: articulo primo teſtaceo. Caput exſertum, ouatum, teſtaceum. Thorax rotundatus, laeuis, teſtaceus, antice attenuatus. Elytra laeuia, teſtacea, apice late nigra. Corpus teſtaceum, pectore plantisque fuſcis.

cylindricollis. 70. L. teſtacea, elytris nigris, apice teſtaceis.
Habitat in Guinea. Dom. Meier. Muſ. D. Lund.
Statura omnino praecedentis, at elytra nigra, apice teſtacea. Antennae nigrae: articulo primo teſtaceo.

attelaboides. 71. L. teſtacea, elytris nigris immaculatis.
Habitat in Guinea. Dom. Meier. Muſ. D. Lund.
Statura et ſumma affinitas praecedentis et forte mera eius varietas, at elytra tota nigra. Antennae nigrae: articulo primo teſtaceo.
Vltimae tres ſpecies forte proprii generis mihi haud rite examinatur.

145. MEGALOPVS. *Palpi* filiformes: articulo vltimo acuto.
Maxilla compreſſa, cornea, intus ſerrata, apice fiſſa.
Antennae extrorſum craſſiores, ſubſerratae.

1. M. teſtaceus, capitis vertice thoracisque dorſo nigris. *ruficornis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.

Genus omnino diſtinctum. *Os* maxillis palpisque. *Palpi* quatuor aequales, filiformes: *anteriores* vix longiores, quadriarticulati; articulis inaequalibus: ſecundo longiori, vltimo acuto, adhaerentes maxillae dorſo; *poſteriores* triarticulati; articulis ſubaequalibus: vltimo obtuſiori adnati ligulae medio. *Mandibula* cornea, arcuata, edentula, acuta. *Maxilla* compreſſa, cornea, intus ſerrata, apice fiſſa. *Ligula* porrecta, longitudine maxillae, cornea, bifida: laciniis approximatis, cylindricis, obtuſis. *Labium* transuerſum, corneum. *Antennae* extrorſum craſſiores: articulo primo longiori, ſecundo orbiculato, reliquis ſubſerratis.

Cor-

Megalopi corpus medium, oblongum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* ouato, exſerto; *oculis* magnis, globoſis, prominentibus, lateralibus; *antennis* diſtantibus, thorace breuioribus, in cantho oculorum antico inſertis; *thorace* breui, cylindrico, elytris anguſtiore; *ſcutello* breui triangulo; *elytris* longitudine abdominis, rigidis, incumbentibus; *pedibus* longiuſculis, curſoriis; *femoribus* poſticis, incraſſatis, *tibiis*que incuruis; *tarſis* omnibus quadriarticulatis; *colore* vario.

Corpus medium, ſtatura et magnitudine fere N. rufae. Caput cum antennis teſtaceum, vertice fuſco. Oculi magni, globoſi, prominuli. Thorax rotundatus, teſtaceus, dorſo fuſco. Elytra laeuia, teſtacea, ſubattenuata, immaculata. Pectus fuſcum, abdomine teſtaceo. Pedes teſtacei, femoribus poſticis incraſſatis.

nigricornis 2. M. teſtaceus, antennis elytrorum margine tibiisque poſticis nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Scheſtedt.

Statura et ſumma affinitas praecedentis. Differt tamen capite cum antennis, nigro ore, flauescente. Thorax teſtaceus, dorſo nigro. Elytra punctata, teſtacea, margine nigro et in hoc margine macula magna, baſeos ouata, teſtacea. Corpus teſtaceum, femoribus incraſſatis, tibiis nigris.

146. NECYDALIS. *Palpi* filiformes.

Maxilla vnidentata.

Ligula membranacea, late emarginata.

Antennae filiformes.

thalaſſina. 1. N. thorace canaliculato, corpore viridi, pedibus nigris. Ent. ſyſt. 2. 350. 1. *

Panz.

Necydalis corpus oblongum, anguſtum, tomentoſum, immarnatum, agile; *capite* ouato, inferto; *oculis* globoſis, prominulis, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, approximatis, inter oculos infertis; *thorace* rotnndato; *dorſo* inaequali; *ſcutello* breui, rotundato; *elytris* rigidis, attenuatis, incumbentibus longitudine abdominis; *pedibus* longioribus, tenuibus; *femoribus* poſticis ſbepius clauatis; *tarſis* anticis quinque, poſticis quadriarticulatis; *colore* vario.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 15.
Habitat Kiliae.

2. N. thorace teretiuſculo, corpore viridi, pedibus muticis, teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 350. 2. *viridiſſima*
Cantharis viridiſſima. Linn. ſyſt. Nat. 2. 650. 23. Fn. Sv. 717.
Oedemera viridiſſima. Oliv. Inſ. 50. t. 2. f. 15.
Geoff. Inſ. 1. 177. 14.
Degeer Inſ. 5. 15. 4. tab. 1. fig. 13.
Payk. Fn. Sv. 3. 134. 1.
Habitat in Europae hortis frequens.

3. N. thorace teretiuſculo, corpore coeruleo, ſub-opaco. Ent. ſyſt. 2. 3. * *coeruleſcens*
Cantharis coerulea. Linn. ſyſt. Nat. 2. 650. 22. Fn. Sv. 716.
Oedemera coerulea. Oliv. Inſ. 50. tab. 2. fig. 14.
Telephorus villoſus. Degeer Inſ. 4. 76. 8.
Payk. Fn. Sv. 3. 135.
Habitat in Europae hortis.

4. N. thorace inaequali, corpore virescente, obſcuro, antennis pedibusque nigris. Ent. ſyſt. 2. 351. 4. * *virescens*
Cantharis virescens. Linn. ſyſt. Nat. 2. 650. 24.
Payk. Fn. Sv. 3. 136. 6.
Habitat in Germania. Dom. Smidt.

5. N. thorace ouato, cyanea, antennis pedibusque nigris. Ent. ſyſt. 2. 351. 5. * *cyanea.*
Habitat in Germania. Dom. Smidt.

6. N. thorace ouato: maculis duabus baſeos nigris, corpore fuſco. *notoxoides*
Habitat in Carolina. Muſ. Dom. Boſc.
Statura et magnitudo praecedentium. Caput cum antennis nigrum. Thorax ouatus, rufus,

maculis duabus baſeos nigris. Elytra laeuia, fuſca.

ſanguinicollis. 7. N. fuſca, thorace teretiuſculo, rufo: punctis duobus compreſſis, elytris lineis tribus eleuatis. Ent. ſyſt. 2. 351. 6. *

Oedemera ſanguinicollis. Oliv. Inſ. 70. tab. 1. fig. 12.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

thoracica. 8. N. thorace teretiuſculo, rufo, elytris laeuiſſimis, fuſcis.

Habitat in Carolina. Muſ. Dom. Boſc.

Statura et ſumma affinitas praecedentis. Corpus fuſcum, at thorax rufus et elytra pubeſcentia, laeuiſſima.

barbara. 9. thorace inaequali, virescens, elytris apice pedibusque flauescentibus. Ent. ſyſt. 2. 351. 7. *

Habitat in Barbaria. Dom. Deſfontaines.

ſeladonia. 10. N. thorace inaequali, corpore viridi, nitidulo, elytris apice incraſſatis, coeruleis. Ent. ſyſt. 2. 351. 8. *

Habitat Kiliae.

ruficollis. 11. N. thorace teretiuſculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi-aeneis. Ent. ſyſt. 2. 352. 9. *

Oedemera ruficollis. Oliv. Inſ. 50. tab. 1. fig. 11.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

melanocephala. 12. N. nigra, thorace abdomineque fuluis, elytris teſtaceis. Ent. ſyſt. ſuppl. 153. 9. *

Panz. Fn. Germ. 36. tab. 9.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

triſtis. 13. N. nigra, thorace teretiuſculo femorumque baſi rufis. Ent. ſyſt. 2. 352. 10. *

Oedemera triſtis. Oliv. Inſ. 50. tab. 2. fig. 13.

Ha-

Habitat in Terra Diemenii. Muſ. D. Banks.

14. N. elytris ſubulatis, atra, femoribus omnibus clauatis. Ent. ſyſt. 2. 352. 11. * *atra.*
Linn. ſyſt. Nat. 2. 646. 5.
Habitat in Europa auſtraliori.

15. N. elytris ſubulatis, nigris, baſi flauis. Ent. ſyſt. 2. 352. 12. * *bumeralis.*
Cantharis bumeralis. Oliv. Inſ. 50. t. 2. f. 20.
Geoff. Inſ. 1. 342. 2.
Forſt. nou. Inſ. ſp. Cent. 1. 48. 48.
Habitat in Anglia.

16. N. nigra, elytris baſi ſuturaque late teſtaceis. Ent. ſyſt. 2. 352. 13. * *vſtulata.*
Oedemera vſtulata. Oliv. Inſ. 50. tab. 2. fig. 19.
Habitat in Germaniae plantis.

17. N. nigra, thorace elytrisque teſtaceis: his apice nigris. Ent. ſyſt. 2. 353. 14. * *melanura.*
Oedemera melanura. Oliv. Inſ. 50. tab. 1. fig. 8.
Habitat in Hiſpaniae plantis. Dom. Prof. Vahl.

18. N. capite thoraceque ferrugineis, elytris teſtaceis apice nigris Ent. ſyſt. 2. 353. 15. * *notata.*
Payk. Fn. Sv. 3. 132. 1.
Habitat in Germania. Dom. Hybner.

19. N. teſtacea, antennis higris, elytrorum margine coeruleo, nitido. *marginella*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.
Statura et magnitudo omnino N. notatae. Caput teſtaceum, clypeo nigro. Antennae nigrae. Thorax rotundatus, teſtaceus, immaculatus. Elytra lineis duabus eleuatis, teſtacea, margine baſeos et laterali coeruleis, nitidis. Corpus teſtaceum.

fuluicollis. 20. N. atra, thorace anoque fuluis, elytris ſubcoeruleſcentibus. Ent. ſyſt. 2. 353. 16. *
Habitat in Germania. Muſ. D. Lund.

longipes. 21. N. niger, elytris aurulentis, dorſo cinereis, pedibus quatuor, poſticis elongatis, compreſſo-elevatis. Ent. ſyſt. ſuppl. 155. 16. *
Habitat in Inſula St. Domingo. Muſ. Dom. Boſc.

rufa. 22. N. elytris ſubulatis, nigra, femoribus omnibus clauatis, elytris antennisque rufis. Ent. ſyſt. 2. 353. 17.
Linn. ſyſt. Nat. 2. 642. 6.
Geoff. Inſ. 1. 220. 22.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 8.
Habitat in Europa auſtraliori.

praeuſta. 23. N. atra, elytris teſtaceis, apice nigris, femoribus omnibus clauatis. Ent. ſyſt. 2. 354. 18. *
Habitat in Barbaria. Muſ. Dom. Deſfontaines.

margaritacea. 24. N. rufa, elytris ſubulatis, abbreuiatis, margaritaceis, baſi rufis, apice atris.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.
Statura omnino N. coeruleae. Caput rufum, antennarum articulis apice atris. Thorax globoſus, rufus, immaculatus. Elytra laeuiſſima, ſubulata, abdomine duplo fere breuiora, baſi rufa, in medio margaritacea, nitidiſſima, apice atra. Abdomen nigrum, ano ruſo. Pedes rufi, femoribus clauatis.

coerulea. 25. N. elytris ſubulatis, coerulea, femoribus poſticis clauatis arcuatis. Ent. ſyſt. 2. 354. 19. *
Necydalis coerulea. Linn. ſyſt. Nat. 2. 642. 4.
Necydalis ceramboides. Forſt. nou. Inſ. ſpec. Cent. 1. 47. 47.
Oedemera coerulea. Oliv. Inſ. 50. tab. 2. f. 16.
Geoff.

Geoff. Inf. 1. 342. 3.
Sulz. Hift. Inf. 48. tab. 6. fig. 2.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.
Habitat in Oriente et Europa auftraliori.
Variat pedibus fimplicibus.

26. N. elytris fubulatis teftaceis, corpore nigro, fe- *Podagra-*
moribus poſticis clauatis baſi teſtaceis. Ent. *riae.*
fyſt. 2. 354. 20. *
Oedemera Podagrariae. Oliv. Inf. 50. tab. 1.
fig. 10.
Linn. fyſt. Nat. 2. 642. 9.
Geoff. Inf. 1. 343. 4.
Payk. Fn. Sv. 3. 134. 4.
Habitat in Europae hortis.

27. N. coeruleſcens, thoracis margine abdomine pe- *bicolor.*
dibusque teſtaceis. Ent. fyſt. 2. 354. 21. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.

28. N. nigra, elytris attenuatis, vireſcentibus, femo- *clauipes.*
ribus poſticis incraſſatis, arcuatis. Ent. fyſt. 2.
355. 22. *
Oedemera aenea. Oliv. Inf. 50. tab. 2. fig. 18.
Payk. Fn. Sv. 3. 137. 7.
Habitat Kiliae.

29. N. nigra, thorace elytrisque teſtaceis, pedibus *teſtacea.*
rufis. Ent. fyſt. 2. 355. 23. *
Habitat in Germania.

30. N. nigra, elytris teſtaceis: margine omni nigro. *marginata*
Ent. fyſt. ſuppl. 155. 23. *
Necydalis femorata. Panz. Fn. Germ. 36. tab. 12.?
Habitat in Gallia. Dom. Boſc.
De Synonymo D. Panzer haereo, cum femora in
meo ſpecimine ſimplicia. Forte varietas ſexus.

31. N. elytris ſubulatis, glaucis, corpore nigro, ab- *glauceſcens*
dominis inciſuris albis. Ent. fyſt. 2. 355. 24. *

Linn.

Linn. syst. Nat. 2. 642. 7.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.
Habitat in Europa australi.

simplex. 32. N. elytris subulatis, testaceis, pedibus simplicibus. Ent. syst. 2. 355. 25. *
Necydalis simplex. Linn. syst. Nat. 2. 643. 10.
Necydalis flauescens. Payk. 3. 135. 5.
Oedemera simplex. Oliv. Ins. 50. tab. 1. fig. 9.
Degeer ins. 5. 155. 4.
Habitat in Europae boreali.

Quercus. 33. N. elytris subulatis, abdomine pedibusque flauescentibus. Ent. syst. 2. 355. 26. *
Habitat in Daniae Quercu. Mus. Dom. Lund.

147. MOLORCHVS. *Palpi* inaequales, filiformes.
Maxilla membranacea, bifida.
Ligula bifida.
Antennae setaceae.

abbreuiatus. 1. M. elytris dimidiatis, ferrugineis, immaculatis, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 356. 1. *
Necydalis maior. Linn. syst. Nat. 2. 641. 1.
Schaeff. Monogr. 1753. fig. 12.
Elem. tab. 13. fig. 2.
Icon. tab. 10. fig. 10. 11.

Degeer

Molorchi corpus oblongum, angustatum, glabrum, immarginatum, agile; *capite* ouato, decliui, inserto; *oculis* reniformibus, vix prominulis, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis; *thorace* rotundato, angusto, dorso canaliculato; *elytris* rigidis, fornicatis, abbreuiatis; *alis* plicatis, abdomini incumbentibus; *abdomine* elongato: margine vtrinque reflexo; *pedibus* longiusculis; *femoribus* clauatis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* testaceo.

Degeer Inf. 5. 148. 1. tab. 5. fig. 1
Panz. Fn. Germ. 41. tab. 20.
Payk. Fn. Sv. 3. 129. 1.
Habitat in Europae floribus.

2. M. elytris abbreuiatis, abdomine atro: faſciis fuluis. Ent. ſyſt. 2. 357. 2. *variegatus*
Habitat in noua Hollandia. Muſ. D. Banks.

3. M. elytris dimidiatis, teſtaceis, apice lineola alba, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 357. 3. *dimidiatus*
Necydalis minor. Linn. ſyſt. Nat. 2. 641. 2.
Fn. Sv. 837.
Schaeff. Monogr. 1753. fig. 6. 7.
Icon. tab. 95. fig. 5.
Sulz. Inſ. tab. 7. fig 51.
Panz. Fn. Germ. 41. tab. 21.
Payk. Fn. Sv. 3. 130. 2.
Degeer. Inſ. 5. 151. 2.
Habitat in Europae hortis.

4. M. elytris dimidiatis, teſtaceis, immaculatis, antennis longis. Ent. ſyſt. 2. 357. 4. *vmbellatarum.*
Necydalis vmbellatarum. Linn. ſyſt. Nat. 2. 641. 3.
Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.
Sulz. Hiſt. Inſ. tab. 6. fig. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 131. 3.
Habitat in Germaniae vmbellatis.

148. SPONDYLIS.

Palpi filiformes.
Maxilla comica, craſſa, integra.
Labium bifidum.
Antennae moniliformes.

bupreſtoides. 1. Spondylis. Ent. ſyſt. 2. 358. 1.
Attelabus bupreſtoides. Linn. ſyſt. Nat. 2. 621. 3.
Friſh. Inſ. 3. 23. tab. 19.
Degeer Inſ. 5. 34. 21. tab. 5. fig. 21.
Paykull Fn. Sv. 3. 155. 1.
Habitat in Europae borealis ſyluis.

149. SINODENDRON.

Palpi inaequales.
Maxilla vnidentata.
Labium filiforme, apice palpigerum.
Antennae lamellatae.

cylindricum. 1. S. thorace antice truncato quinquedentato, capitis cornu erecto. Ent. ſyſt. 2. 358. 94.
Scarabaeus cylindricus. Linn. ſyſt. Nat. 2. 544. 11. Fn. Sv. 380.
Oliv. Inſ. 1. 3. 47. 54. tab. 9. fig. 80.
Degeer Inſ. 4. tab. 10. fig. 2.
Voet. Scarab. tab. 20. fig. 131.

Laichart.

Sinodendri corpus cylindricum, glabrum, immarginatum, antice poſticeque obtuſum, tardum; *capite* paruo, ouato, plano; *oculis* paruis, rotundatis, marginalibus; *antennis* breuibus, reflexis, ſub oculos inſertis; *thorace* gibbo, antice truncato, muricato, aut inaequali; *ſcutello* paruo, triangulari; *elytris* rigidis, fornicatis, abdomen includentibus, apice ſaepius retuſis, dentatis; *pedibus* brenibus, validis; *tibiis* anticis, dentatis; *tarſis* quinquearticulatis; *colore* obſcuro.