

# CONTRIBUTIONS A LA FAUNE INDO-CHINOISE

13<sup>e</sup> Mémoire (1)

## LONGICORNES

Par AUG. LAMEERE, professeur à l'Université de Bruxelles.

Séance du 11 janvier 1893.

1. CYRTOGNATHUS GRANULOSUS Thoms. — Qui-Nhon.

2. ÆGOSOMA MARGINALE Fabr. — Saïgon.

Un ♂ d'une teinte plus obscure que les exemplaires de Java.

3. PLOCEDERUS OBESUS Gahan. — Saïgon.

4. ÆOLESTHES INDUTUS Newm. — Saïgon.

5. PACHYDISSUS (DIORTHUS) SIMPLEX White. — Mytho.

Synonymie de cette espèce d'après M. Gahan (Ann. Nat. Hist., 1891, p. 31) :

*Cerambyx holosericeus* Oliv. (nec Fabr.) = *Hammaticherus simplex*

(1) Voir 1<sup>er</sup> mémoire (*Cicindelidae et Elateridae*, par Ed. Fleutiaux), Annales 1889, p. 137; — 2<sup>e</sup> mémoire (*Hydrocanthares*, par le Dr M. Régimbart), Annales 1889, p. 147; — 3<sup>e</sup> mémoire (*Carabidae*, par H.-W. Bates), Annales 1889, p. 261; — 4<sup>e</sup> mémoire (*Cryptocéphalides, Clytrides et Eumolpides*, par Éd. Lefèvre), Annales 1889, p. 287; — 5<sup>e</sup> mémoire (*Galerucidae et Alticidae*, par E. Allard), Annales 1889, p. 303; — 6<sup>e</sup> mémoire (*Sagridae, Crioceridae, Chrysomelidae, Hispidae*, par le Dr J. Baly), Annales 1889, p. 485; — 7<sup>e</sup> mémoire (*Rhipidoceridae, Dascillidae, Malacodermidae*, par J Bourgeois), Annales 1890, p. 161; — 8<sup>e</sup> mémoire (*Malacodermata, Cleridae, Lyctidae, Erotylidae, Endomychidae, Cassididae, Coccinellidae*, par H. S. Gorham), Annales 1891, p. 397; — 9<sup>e</sup> mémoire (*Buprestidae*, par J. R. H. Nervoort Van de Poll), Annales 1892, p. 17; — 10<sup>e</sup> mémoire (*Cureulionidae, Brenthidae*, par le Dr J. Faust), Annales 1892, p. 505; — 11<sup>e</sup> mémoire (*Coléoptères Hétéromères*, par L. Fairmaire), Annales 1893, p. 19; — 12<sup>e</sup> mémoire (*Clytrides et Eumolpides*, par Ed. Lefèvre), Annales 1893, p. 111.

Ann. Soc. ent. Fr., 1893. — Octobre 1893.

White = *Cerambyx vernicosus* Pascoe = *Pachydissus inclemens* Thoms.  
= *Hammaticerus heterocerus* Dup., Dej. Cat. = *Hammaticerus sericeus* Dej. Cat.

Habite l'Inde, l'Indo-Chine, Java, et se retrouve au Sénégal.

6. STROMATIUM ASPERULUM White. — Qui-Nhon, Hué.

7. CERESIUM GENICULATUM White. — Saïgon.

8. **Ceresium Delauneyi**, n. sp. — *C. geniculatum affine, sed minus, nigro-brunneum, cinereo-pubescentis, antennis et pedibus rufo-castaneis; elytris brunneo-testaceis, prothorace elongato fere cylindrico, antice minus angustato, grosse confluenter punctato, linea dorsali levata, disco maculis utrinque pilosis flavo-griseis tribus vittam irregularem formantibus, ornato; scutello flavo-piloso; elytris grosse et crebre punctatis, punctis setigeris, setis flavis; corpore infra et pedibus fere levibus.* — Long. 9 1/2 mill.

Hué, deux exemplaires ♂.

9. CERESIUM SIMPLEX Gyllh. — Saïgon.

10. APHRODISIUM GRIFFITHI Hope. — Hué.

Décrit sous le nom de *Pachyteria zonopteroides* par M. E. Fleutiaux (Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 66, pl. 4, fig. 6).

11. CHELIDONIUM ARGENTATUM Dalm. — Qui-Nhon.

12. LEONTIUM VENEREUM Thoms. — Saïgon.

13. ANUBIS INERMIS White. — Saïgon, Mytho.

14. CLYTANTHUS ANNULARIS Fabr. — Saïgon, Qui-Nhon, Pnomh-Penh.

15. **Xylotrechus deletus**, n. sp. — *X. australis affinis, brunneo-castaneus, griseo-pubescentis; capite carinis quinque, duabus frontalibus antice conjunctis litteram V formantibus, alia in vertice, duabus lateribus prope oculos; antennis ferrugineis; prothorace flavo-griseo-pubescente, maculis quatuor nigris transversim dispositis, externis minoribus; scutello griseo-piloso; elytris brunneo-testaceis, singulis macula vaga basali ab humero ad scutellum et paulo longe suturam extensa, lineolis praeterea tribus, una prope basin circumflexa, suturam non attingente, alia ante medium retrorsum recurva a margine ad suturam, tertia post medium, oblique transversa, in margine et in sutura dilatata, apice dein macula transversa, signaturis omnibus griseo-flavo-pubescentibus; metathoracis lateribus et abdominis segmentis duobus basalibus flavo-maculatis; pedibus griseo-pubescentibus.* — Long. 13 mill.

Pnomh-Penh, un exemplaire ♀.

16. **Perissus lætus**, n. sp. — *Nigro-brunneus, infra albo-sericeo-pubescentis; antennis fuscis; capite flavo-griseo-piloso, vertice sparsim punctato; prothoracis disco, antice præsertim, fortiter aspero, vittis circumflexis longitudinalibus duabus flavo-pilosatis, antice distantibus, postice approximatis; scutello nigro; elytris apice oblique truncatis, angulo externo producto, singulis macula humerali et vittis tribus flavo-pubescentibus, quarum una circumflexa a scutello retrorsum in medio disci extensa, dein antrorsum ad marginem curvata et ibi angulata, alia post medium oblique transversa, a margine ad suturam extensa et ibi triangulariter dilatata, tertia dein apicali; pedibus castaneis, albo-pilosatis.* — Long. 9 mill.

Pnomh-Penh, un exemplaire ♂.

17. **EURYCEPHALUS LUNDI** Fabr. — Saïgon.

18. **LEPRODERA LECTA** Gahan. — Pnomh-Penh.

19. **ARISTOBIA APPROXIMATOR** Thoms. — Saïgon.

20. **CELOSTerna CARISSIMA** Pascoe (= *tessellata* White = *maculosa* Thoms.). — Saïgon.

Deux exemplaires offrent, en dessus, la vestiture orangée normale; trois autres ont les taches et les bandes des élytres, du prothorax et de la tête d'un blanc jaunâtre sale; chez l'un de ces derniers, les taches élytrales sont réunies en une bande irrégulière longitudinale.

21. **Celosterna Fleutiauxi**, n. sp. — *Fusca, pube brunnea induta; capite impunctato, longe nigro-piloso; antennis fuscis, scapo brunneo-pubescente, articulis a tertio basi flavo-griseo-pubescentibus; prothorace longe nigro-piloso, antice et postice sulcato, disco paulo elevato, irregulari, maculis carneo-griseis tribus, una discoidali, triangulari, antice et postice cum macula minore conjuncta, ceteris supra spinas laterales, ibique grosse punctato; scutello carneo-griseo-pubescente; elytris griseo-pubescentibus, basi aspere punctatis, apice maculis vagis fuscis, singulis præterea maculis duabus nigris, una basali, transversa, a sutura ad humerum extensa, altera post medium laterali, irregulari; pedibus brunneo-pubescentibus, tibiis apice et tarsis infuscatis.* — Long. 15—25 mill.

Hué, Saïgon, quatre exemplaires ♂ ♀.

22. **BATOCERA ALBOFASCIATA** Deg. — Saïgon, Pnomh-Penh, Qui-Nhon, My tho.

23. **BATOCERA TITANA** Thoms. (= *ferruginea* Thoms.). — Saïgon.

24. **ORSIDIS** sp.? — Hué, Pnomh-Penh.

Cet Insecte est probablement une des nombreuses espèces décrites comme *Monohammus*; la forme de la cicatrice du scape ne permet pas de la ranger dans ce genre; ce n'est aussi qu'avec doute que je la rapproche des *Orsidis*. Une révision complète de toutes les formes indiennes des *Monohamminæ* et groupes voisins serait fort à souhaiter.

25. COPTOPS N. SP.? — Saïgon.

26. COPTOPS N. SP.? — Pnomh-Penh, Mytho.

Ces deux dernières espèces me paraissent nouvelles; mais, n'ayant point vu les types de Pascoe, il m'est impossible de me prononcer définitivement à leur égard.

27. XYLORRHIZA ADUSTA Wiedm. — Saïgon.

28. PALIMNA ANNULATA Oliv. — Saïgon.

29. GERANIA Bosci Fabr. — Qui-Nhon, Pnomh-Penh, Mytho.

« Vivant : d'un beau jaune soufre », ainsi que l'indique une étiquette fixée à l'épingle de l'un des individus.

30. OLENECAMPTUS BILOBUS Fabr. — Saïgon, Pnomh-Penh, Mytho.

31. OLENECAMPTUS OCTOPUSTULATUS Motsch. — Mytho.

32. *Ælara minor*, n. sp. — *Linearis, brunneo-castanea, infra albo-griseo-pubescentia, supra obscurior; capite albo-griseo-pubescente; antennis infuscatis, basi castaneis, articulo quinto griseo-pubescente; prothorace paulo latiore quam longiore, lateribus fere rectis, antice vix attenuato, disco quadrisulcato et tricarinato, lateribus punctis grossis dispersis paucis, griseo-pubescente, margine antico fusco-maculato; scutello lato et brevi; elytris griseo-pubescentibus, grosse subseriatim punctatis, singulis apice bidentatis et pilosis, lineolis tribus vagis, una prope scutellum, alia sub humero longitudinali et bifurcata, tertia post medium incurvata, albo-griseo-pubescentibus; pedibus brunneis, femoribus et tibiis plus minusve albo-pubescentibus.* — Long. 10 mill.

Pnomh-Penh, un exemplaire.

33. PRAONETHA SP.? — Pnomh-Penh, Hué, Saïgon.

34. PRAONETHA SP.? — Pnomh-Penh.

35. PRAONETHA SP.? — Hué.

36. PRAONETHA SP.? — Hué.

37. PRAONETHA SP.? — Hué.

N'ayant pas vu les types des nombreuses espèces de *Praonetha* pu-

bliées par Pascoe, il m'est impossible de me prononcer sur la détermination des cinq formes précédentes, qui me paraissent cependant non décrites.

38. *MICRACANTHA ABDOMINALIS* White. — Qui-Nhon, Hué.
39. *STHENIAS FRANCISCANA* Thoms. — Pnomh-Penh.
40. *APOMEZYNA HISTRIO* Fabr. — Saïgon, Hué.
41. *APOMEZYNA PERTIGERA* Thoms. — Saïgon, Hué, Qui-Nhon.
42. Nov. gen. nov. sp. ***Estolinarum***. — Hué.

N'ayant pas à ma disposition de matériaux suffisants pour apprécier exactement la valeur générique de cette forme, je préfère m'abstenir de la décrire.

43. ***Sybra Pascoei***, n. sp. — *Nigra; antennis castaneis; prothorace fere cylindrico, antice minus attenuato, crebre fortiter punctato, lateribus utrinque vitta lata, ligneo-grisea; elytris grosse seriatis punctatis, apice singulatim angulatis, singulis vitta ligneo-grisea lata ab humero ad medium suturæ et ibi usque ad apicem irregulariter extensa; pedibus brunneo-castaneis.* — Long. 5 mill.

Hué, deux exemplaires.

44. ***TETRAGLENES INSIGNIS*** Newm. — Hué.

45. ***Tetraglenes bacillarius***, n. sp. — *Minor et angustissimus, fusco-vel griseo-brunneus; antennis brevibus, dimidium corporis haud superantibus, glabris, rubro-brunneis, nitidis, scapo valde incrassato excepto; capite elongato, prothoracis longitudine, vertice bicarinato; pronoto tricarinato; elytris singulis bicostatis, sutura elevata, subseriatim punctatis, punctis minimis.* — Long. 6—6,5 mill.

Hué, trois exemplaires.

46. ***Exocentrus misellus***, n. sp. — *Brunneo-castaneus; antennis pilosis, fuscis, articulis 1-5 basi castaneis; capite fuso, pilis longis erectis sicut prothorace ornato; hoc transverso, haud multo latiore quam longiore, spina laterali postice oblique directa, brunneo-castaneo, medio disci infuscato; elytris brunneo-castaneis, subseriatim, basi et longe suturam antice crebrius, punctatis, maculis pubescentibus flavo-griseis et confluentibus vittas transversas duas quarum una ante medium, altera post medium, formantibus, ornatis; pedibus brunneo-castaneis, tibiis apice et tarsis infuscatis.* — Long. 4 1/2 mill.

Hué, un exemplaire ♂.

47. GLENEA OBESA Thoms. — Pnomh-Penh.

48. STIBARA TETRASPILOTA Hope. — Saïgon.

49. NUPSERHA FRICATOR Dalm. — Mytho, Pnomh-Penh.

50. NUPSERHA 4-OCULATA Thunb. — Pnomh-Penh, Mytho.

51. **Nupserha ambigua**, n. sp. — *Linearis, postice vix attenuata, fulvo-sericea, antennis et elytrorum epipleuris et apice fuscis; capite et prothorace impunctatis, hoc cylindrico, antice et postice sulcato-constricto; elytris apice truncatis, angulis minus productis, seriatus punctatis, punctis setigeris, carina laterali et costis minus elevatis, sericeo-pubescentibus; pedibus concoloribus, tibiis posticis apice et tarsis infuscatis.* — Long. 12,5 mill.

Saïgon, deux exemplaires ♂ ♀.

52. ASTATHES PUNCTATA Thoms. — Saigon.

