

CAROLI LINNÆI

EQUITIS DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.;

ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER.

LOND. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

SYSTEMA NATURÆ

PER

REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES,

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS.
SYNONYMIS, LOCIS.

TOMUS I.

¹⁰
EDITIO DECIMA, REFORMAT.

Cum Privilegio S:æ R:æ M:tis Sveciæ.

HOLMIÆ,

IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,
1758.

Habitat in Sipylo. Hasselqvist.

Statura & magnitudo A. formicarii.

- apiarius. 7. *A. cærulescens*, elytris rubris, fasciis tribus nigris.
Svamm. bibl. . . t. 26. f. 3. Reaum. inf. 6. t. 8. f. 10.

Habitat in Germania. P. Forskåhl

Facies A. formicarii, sed duplo major. Corpus totum atro-cærulescens, sed Caput & Thorax pilis nigris pubescentia. Petus & Abdomen nitidius cærulescentia, ut & Femora postica, quæ longiora. Elytra rubra, fasciis tribus margine repandis atris; quarum prima vix marginem lateralem attingit; postrema in ipso apice elytri, cærulescens. Antennæ nigrae, clavata.

- mollis. 8. *A. griseus pubescens*, elytris fasciis tribus pallidis.
Uddm. diff. 28. t. 1. f. 9. Curculio oblongus ruber, elytris nigris: fascia triplici albicante.
Habitat in Europa.

- Ceram- 9. *A. ater*, elytris rugosis.
boides. *Uddm. diff. 26. t. 1. f. 1. Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis.*
Habitat in Boleto fomentario.

- Bupre- 10. *A. ater*, elytris nervosis, thorace subglobofo.
toides. *Fn. succ. 5^a 4. Buprestis ater.*
Habitat in Europa.

179. CERAMBYX. *Antennæ attenuatæ.*
Thorax spinosus aut gibbus.
Elytra linearia.

• *Thorace spinis lateralibus mobilibus.*

- longima- 1. *C. thorace spinis mobilibus, elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longioribus.*
nus. *Sloan. jam. 2. p. 209. Scarabæus Capricornus maximus nigricans, fasciis elytrorum coccineis & flavis.*
Grew. mus. 163. t. 13. Merian. surin. t. 28.
Vincent. mus. t. 1. fig. infim. media.
Rœs. inf. 2. scarab. 2. p. 11. t. 1. f. a.
Habitat in America.
In altero sexu tibiæ anticae longissima, ut in Scar. longimana.

- trochlea- 2. C. thorace spinis mobilibus, elytris fusco canoque variis:
ris. punctis elevatis.
Habitat in India. De Geer.

* * *Thorace marginato dentibus lateralibus.*

- cervicor- 3. C. thorace marginato dentato, maxillis porrectis corni-
nis. formibus utrinque spinosis, antennis brevibus.

Sloan. jam. 2. t. 237. f. 6. Merian. jurin. t. 48.

Röf. inf. 2. scarab. 2. p. 12. t. 1. f. 13. L'et. gaz. t. 44. f. 8?

Brown. jam. 429. t. 44. f. 8.

Habitat in America

*Antennæ corpore breviores. Thoracis dentes 3 validi.
Elytra lineata.*

- coriarius. 4. C. thorace marginato-dentato, corpore piceo, elytris mucronatis, antennis corpore brevioribus.

Fa. succ. 480. Cerambyx niger, thorace planiusculo: margine utrinque tridentato, coleoptris piceis.

Röf. inf. 2. scarab. 2. t. 1. f. 1. 2.

Godd sat. 79. Cerambyx cinereo nigricans, antennis & pedibus rufis.

Habitat in Betulis putridis.

Mas utrinque thorace unidentato, Femina tridentato.

- cinnamo- 5. C. thorace marginato denticulato, corpore ferrugineo,
meus. elytris mucronatis.

Merian. jur. t. 24. f. 1. 2.

Habitat in America.

Thoracis denticulus lateralis posticus validior. Elytra colore cort. cinnamomi.

- festivus. 6. C. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus linea lutea.

Habitat in America. Rolander.

Thorax rubro nigroque varius; Antennæ basi rubræ, vix corpore longiores. Elytra apice bidentata, viridia, stria duplici elevata; Linea longitudinalis lutea juxta marginem exteriorem.

- lineatus. 7. C. thorace marginato dentato, elytris nigris lineis albis, antennis compressis brevioribus.

Sloan. jam. 2. p. 209 t. 237. f. 34.

Brown. jam. 430. t. 43. f. 7.

Habitat in Jamaica.

- spinibar- 8. *C. thorace marginato subcrenulato, capite sub maxillis*
bis. spinoso scabro, antennis brevibus.

Habitat in America.

Corpus nigrum. Antennae corpore breviores.

* * * *Thorace rotundato, spinis fixis lateralibus mucronato.*

- Batus. 9. *C. thorace spinoso rugoso, elytris bidentatis, antennis*
longis uncinato-aculeatis. *M. L. U.*

Mus. petrop. 652. n. 154. Capricornus niger cornutus.

Habitat in Indiis.

Antennae articulis 1-5 subtus aculeo recurvo armatis.

- Rubus. 10. *C. thorace spinoso, antennis subtus aculeatis, elytris*
bidentatis punctis quatuor albis.

Habitat in India. De Geer.

Magnus. Thorax utrinque spina fixa, subtus linea alba.

Elytra levia, basi punctis rugosa, apice bidentata.

- ferrugi- 11. *C. thorace spinoso rugoso, elytris fastigiatis subferrugi-*
neus. neis, antennis longis.

Habitat in India.

- Sentis. 12. *C. thorace spinoso laevi, elytris fastigiatis biguttatis,*
antennis subtus aculeatis longioribus.

Habitat in India.

Antennae corpore sesquilingiores. Corpus griseum. Elytra
antice punctis elevatis subscabra. Maculae duae albae
parvae longitudinales. Linea alba ab antennis per late-
ra thoracis & abdominis versus anum ducta.

- farinosus. 13. *C. thorace spinoso niger, elytris punctis albis sparsis*
farinosis.

Merian. surin. t. 24. f. infima.

Habitat in America. De Geer.

- depressus. 14. *C. thorace quadrispinoso, dorso depresso, elytris ne-*
bulosis: antice punctis elevatis sparsis.

Habitat in India. De Geer.

- glaucus. 15. *C. thorace quinquespinoso glaucus, elytris muricatis*
latere fasciaeque nigris, antennis longioribus.

Habitat in America. Rolander.

Insectum supra albido-glaucum, subtus fuscum. Tho-
rax supra spinis 4 & quinto in medio posterius. Elytra
trun-

truncata, unidentata, antice echinato-muricata, lateribus nigra cum lineola, postice quasi fascia elytra secante. Antennæ corpore vix duplo longiores.

- lamed. 16. *C. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis lividis, fascia obscura longitudinali flexuosa, antennis brevioribus.*
Fn. suec. 498. Leptura nigra, elytris nigricante livido-que variis.
Habitat in Europa.
- nebulosus. 17. *C. thorace spinoso, elytris fastigiatis punctis fasciisque nigris, antennis corpore longioribus. Fn. suec. 483. It. gotl. 273.*
Habitat in Abietum truncis.
- hispidus. 18. *C. thorace spinoso, elytris subpræmorsis, punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus.*
Fn. suec. 484. t. 1. Cerambyx cinereus, elytris præmorsis nigris fasciaque alba, antennis sesquialongioribus.
Habitat in Europa.
- desertus. 19. *C. thorace spinoso albo-lineato, elytris bidentatis albo fasciatis, antennis longioribus. M. L. U.*
Habitat in America.
Thorax lineis 5 albis, quarum laterales sub thoracis margine sunt.
- fuliginosus. 20. *C. thorace bispinoso rugoso, elytris fastigiatis fascia flavâ, antennis longioribus compressis. M. L. U.*
Habitat in America.
- viridis. 21. *C. thorace spinoso, elytris obtusis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis. M. L. U.*
Sloan. jam. 2. . . t. 237. f. 39. 40.
Brown. jam. 430. t. 43. f. 8.
Habitat in India.
- moschatellinus. 22. *C. thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.*
Fn. suec. 478. Cerambyx viridi cærulescens, antennis corpus subæquantibus.

Mouff. inf. 133. *f. ultima.* *Frisch. inf.* 13. *t.* II.

Raj. inf. 31. *n.* 17.

Habitat in Europa.

alpinus. 23. *C. thorace spinoso, coleoptris obtusis fascia maculata, que quatuor atris, antennis longis.*

It. scan. 260. *Cerambyx subcæruleicens, fascia lisque 4 nigris.*

Jonst. inf. t. 15. *f.* 3.

Rob. ic. 8.

Scheuch. itin. 1. *t.* I. *f.* 5.

Habitat in Helvetia.

ædilis. 24. *C. thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis.*

Fn. suec. 479. *It. æl.* 8. *Cerambyx nebulosus, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.*

Pet. gaz. t. 8. *f.* 8. *Capricornus ruficus.*

Mouff. inf. 151. *f.* 2. *Frisch. inf.* 13. *t.* 12.

Habitat in truncis arborum Europæ.

futor. 25. *C. thorace spinoso, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello pallido, antennis longissimis.*

Fn. suec. 482. *Cerambyx ater, elytris punctatis maculis pallidis sparsis, antennis corpore longioribus; thorace spinoso.*

Gadd. diff. 27. *Cerambyx nigro nebulosus, scutello pallido, elytris fusco æneis.*

Habitat in Europa.

cerdo. 26. *C. thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.*

Habitat in Italia. M. Kæbler. in Germania. Forskåhl.

Statura præcedentis; corpus ♂ artus nigra. Elytra apice pallidiora s. picea. Antennæ corpore longiores: articulis 4 primis brevioribus clavatis s. apice rotundatis; reliquis compressis.

textor. 27. *C. thorace spinoso, elytris obtusis convexis atris, antennis mediocribus.*

Uddm. diff. n. 29. *Cerambyx sordide niger, punctis elevatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem subæquantibus.*

Habitat in Europa.

- fuliginator.** 28. *C. thorace subspinoso niger, elytris cinerascens, antennis brevioribus.*
Habitat in Germania. P. Forskåhl.
Minor Ape; totus ater. Antennæ vix corporis longitudine. Thorax rotundatus, parce spinosus. Elytra minus acuta, rore cinereo sordido inquinata.
- coquus.** 29. *C. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis fulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus.*
Habitat in Canada. Kalm.
Spina thoracis villosi potius digitis quam oculis observantur.
- cursor.** 30. *C. thorace spinoso, elytris obtusis rufis margine lineaque nigris, antennis mediocribus.*
Fn. svec. 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tribus nigris longitudinalibus.
Habitat in Europa.
- kæhleri.** 31. *C. thorace spinoso niger, thorace elytrisque macula magna nigra.*
Habitat in Italia. M. Kæhler.
Magnitudo media. Corpus ♂ artus nigra. Thorax sanguineus macula in tergo magna, rotundata, nigra. Elytra sanguinea: macula magna, ovali, nigra, utroque elytro communi, a medio ad apices fere extensa. Femora apice emarginata, acuta. Antennæ vix corporis longitudine.
- inquisitor.** 32. *C. thorace spinoso, elytris nebulosis fusco subfasciatis, antennis corpore brevioribus.*
Fn. svec. 485. Cerambyx cinereus nigro nebulosus, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.
Frisch. inf. 13. t. 14.
β. Fn. svec. 486. Cerambyx cinereus coleoptris fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.
Habitat in Europa.
- fur.** 33. *C. thorace spinoso gibboso, coleoptris ovatis: fascia duplici albida, antennis filiformibus mediocribus.*
Fn. svec. 487. Cerambyx testaceus, elytrorum fascia duplici albida, thorace spinoso.

B b 5

Habi-

Antennæ Brevæ, quæ corpore breviores; Mediocræ quæ longitudine corporis; Longæ quæ corpore longiores sunt, nobis dicuntur.

Habitat in herbariis, insectorum collectionibus, avibus exsiccatis, pellibus, utensilibus, culinis, pessimus nobis hospes.

Genere anceps ob Antennas filiformes & quod caput Dermestidis more intra thoracem retrahat incurvatum.

* * * * *Thorace inermi subcylindrico.*

- carcharias. 34. *C. thorace mutico cylindrico, corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. Fn. suec. 493.
Gæd. inf. 2. t. 51. List. gæd. f. 106.
Pet. gaz. t. 2. f. 1.
Habitat in Europa.*
- scalaris. 35. *C. thorace mutico cylindrico, coleoptris linea flava dentata punctisque flavis, antennis mediocribus. Faun. suec. 494.
Habitat in Europa.
Variat linea cerulecente loco flavæ.*
- popul-neus. 36. *C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus.
Gadd sat. 79. Cerambyx fusco cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis.
Habitat in Europa.*
- cylindricus. 37. *C. thorace mutico cylindrico linea albida, elytris fastigiatis nigris, pedibus anticis pallidis.
Ræf. inf. 2. scarab. 2. t. 3.
Habitat in Europa.
Antennæ vix corpore longiores.*
- oculatus. 38. *C. thorace mutico cylindrico luteo: punctis duobus nigris, elytris fastigiatis linearibus nigris.
Uddm. diff. 31. Cerambyx ferrugineo-rufus, elytris nigro cinereis punctis excavatis nigris.
Habitat in Europa.
Antennæ mediocres.*
- zonarius. 39. *C. thorace mutico cylindrico rugoso, antennis longioribus, elytris obtusis fuscis: fascia lineari albida.
M. L. U.
Habitat in America.*

* * * * * *Thorace inermi subrotundo f. ex globo depresso.*

- ferrati-
cornis. 40. *C. thorace mutico subovali, corpore lurido fusco, antennis compressis ferratis mediocribus.*
Habitat in Europa.
- ruficus. 41. *C. thorace mutico subrotundo nudo, corpore lurido, antennis brevioribus subulatis.*
Fn. succ. 492. Cerambyx fuscus, punctis thoracinis impressis.
Habitat in Europa.
- femora-
tus. 42. *C. thorace inermi subrotundo, corpore atro, femoribus rubris, antennis mediocribus.*
Habitat in Germania.
Sequenti dimidio minor, angustior; sola femora rubra.
Antennæ vix corporis longitudine.
- viola-
ceus. 43. *C. thorace mutico subrotundo, corpore violaceo, antennis mediocribus.*
Fn. succ. 495. Cerambyx violaceus nitens, antennis nigris, femoribus clavatis.
Gadd diff. 28. Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris cæruleiscentibus.
Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 1.
Habitat in Europa.
- auratus. 44. *C. thorace dente laterali depresso viridi-inauratus, antennis nigris, femoribus posticis cæruleis.*
Habitat in America. Rolander.
Similis C. violaceo. Caput & Thorax viridi-inaurata. Dens thoracis utrinque postice a basi sinu excavatus. Elytra rubro-viridi-aurata. Antennæ nigrae, vix corpore longiores. Abdomen & totum corpus subtus viridi-aeneum. Pedes purpurei: Femora postica cærulea.
- stigma. 45. *C. thorace submutico subrotundo excavato punctato, corpore atro, elytris lævibus: stigmate albo.*
Habitat in America. Rolander.
Totus niger. Thorax hemisphaericus, submarginatus, punctis numerosis excavatus, postice ad angulum lateralem vix dentibus duobus utrinque excavatus. Scutellum laeve, longius quam in reliquis. Elytra laevia, nigra,

nigra, singula pone scutellum lineola extorsum obliqua alba.

striatus. 46. *C. thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris striatis, antennis brevibus.*

Habitat in Europa.

testaceus. 47. *C. thorace mutico subrotundo glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus. Fn. suec. 491.*

Habitat in Europa.

bajulus. 48. *C. thorace mutico subrotundo villosa, tuberculis duobus, antennis brevibus.*

Fn. suec. 489. Cerambyx nigricans, thorace villosa cinereo, punctis duobus glabris.

Fr. sch. inf. 13. t. 10.

β. Fn. suec. 490. Cerambyx testaceus, thorace villosa cinereo lineolis duabus glabris.

Habitat in Europa; in America septentrionali. Kalm.

fennicus. 49. *C. thorace mutico subrotundo tuberculis subferrugineo obsolete, elytris violaceis, antennis longiusculis.*

Uddm. diff. 33. Cerambyx elytris nigro caeruleis apice abdominis ferrugineo.

Habitat in Europa.

undatus. 50. *C. thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis submediocribus. Fn. suec. 488.*

Habitat in Europa.

sanguineus. 51. *C. thorace mutico subrotundo elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus.*

Habitat Upsaliæ in parietibus. Isac. Uddman.

Statura omnino C. Bajuli, at Thorax supra Scutellum.

Elytra, Annis omnino sanguinea, tomento vix conspicuo; reliqua atra. Thorax supra magis lateribus depressus,

quam bajulus.

castaneus. 52. *C. thorace mutico subrotundo, corporeque nigro, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus.*

Habitat in Svecia.

Magnitudo C. undati, sed paulo angustior. Femora postica nigra. Latera thoracis parum rubra. Antennae corpore breviores. Affinis C. rustico, sed minor.

180. LEPTURA. *Antennæ fetaceæ.**Elytra apicem versus attenuata.**Thorax teretiusculus.*

- * *Thorace ovato s. antrorsum oblongiusculo angustiore. Elytris apice truncatis.*

aquatica. 1. *L. deaurata*, antennis nigris, femoribus posticis dentatis.
Fn. suec. 509.

Raj. inf. 100. *Cantharis arundines frequentans.*

β. *Leptura subæneo-violacea*, femoribus posticis dentatis.
Fn. suec. 510.

Habitat in plantis aquaticis, Nymphæis, Caricibus, Phellandrio, cujus radices adhæret pupa intra globum brunneum.

melanura. 2. *L. nigra*, elytris rubescentibus lividisve apice nigris. *Fn. suec.* 499.

Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6. *Scarabæus arboreus major violaceo ruber.*

Raj. inf. 499. *Cerambyx niger*, elytris flavis extremitatibus nigris.

Pet. gaz. t. 20. f. 5. *Capricornus exiguus*, vaginis rubentibus apice nigro.

Gadd. diff. 27. *Leptura thorace nigro nitido, elytris obsolete sordideque flavescentibus.*

Habitat in Europa.

rubra. 3. *L. nigra*, thorace elytris tibiisque purpureis. *Fn. suec.* 500.
Fn. suec. 497. *Leptura nigra*, thorace elytrisquæ rufis.

Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6. *Scarabæus arboreus major purpureo-ruber.*

Habitat in Europa.

virens. 4. *L. viridi-flava*, antennis luteo viridique variis. *Faus. suec.* 496.

Habitat in Europa.

sericea. 5. *L. viridi-cærulea*, elytris subfastigiatis.
Habitat in Europa.

4-maculata. 6. *L. nigra*, elytris lividis; maculis quatuor nigris. *Fn. suec.* 502.

Habitat in Europa.

- meridia- 7. *L. nigra*, abdomine pedibus basique elytrorum flavis.
na. *Habitat in Germania. Forskåhl.*
Statura L. melanuræ, sed major; basis antennarum rufa.
" *Articuli pedum apice nigri. Elytrorum apices præmorfi.*
- interro- 8. *L. nigra*, elytris lividis: fascia longitudinali arcuata ma-
gationis. culisque quatuor nigris.
Uddm. diff. 35. t. 1. f. 2. Leptura nigra, elytris fusco
flavis: maculis octo nigris.
Habitat in Europa.
- 6-macu- 9. *L. nigra*, coleoptris testaceis: maculis sex nigris mar-
lata. gine connexis. *Fn. succ. 504.*
Habitat in Europa.
- 4-fascia- 10. *L. nigra*, elytris testaceis, fasciis quatuor nigris. *Faun.*
tar *succ. 505.*
Habitat in Europa.
- attenuata. 11. *L. elytris fastigiatis attenuatis fulvis: fasciis quatuor*
nigris, pedibus testaceis.
Habitat in Europa.
- nigra. 12. *L. elytris fastigiatis, corpore nigro nitido, abdomi-*
ne rufo.
Habitat in Europa.
- * * *Thorace subgloboso, nec antice attenuato. Elytris*
apice obtusis, nec truncatis.
- virginea. 13. *L. thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdomi-*
ne rufo.
Gadd diff. 26. Leptura nigra, elytris cærulefcentibus,
toto abdomine rubro.
Habitat in Europa.
- collaris. 14. *L. thorace globoso abdomineque rubris, elytris nigris.*
Habitat in Europa.
- rustica. 15. *L. thorace globoso tomentoso, elytris cinereis: fasciis*
linearibus albidis undatis.
Habitat in Europa.
- mystica. 16. *L. thorace globoso tomentoso, elytris fusco-cinereis*
antice rufis: fasciis linearibus arcuatis lataque canis.
Habitat in Europa.

- necydalea. 17. *L. thorace subglobofo, elytris subulatis mucronatis glauco-aureis.*
Habitat in America. Rolander.
Similis L. aquaticæ. Elytra attenuata & vere subulata, glaberrima, glauco-flavescentia, margine purpurascens. Caput nigrum. Antennæ filiformes, nigra, corpore $\frac{1}{2}$ breviores. Femora clavata. Abdomen nigrum, teres ut ichneumoni, incisuris margine albis.
- detrita. 18. *L. thorace globofo nigricante, elytris fuscis: fasciis quatuor transversis flavis, pedibus rufis.*
Uddm. diff. 31. Cerambyx ferrugineo rufus, elytris nigro cinereis punctis excavatis nigris.
Habitat in Europa.
- arcuata. 19. *L. thorace globofo nigro, elytris nigris: fasciis linearibus flavis: tribus retrorsum arcuatis, pedibus ferrugineis.*
Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 4. f. 1. Scarabæus arboreus luteo pictus.
Uddm. diff. 30. Cerambyx nigris elytris: fasciis 4 flavis arcuatis.
Habitat in Europa.
- arietis. 20. *L. thorace globofo nigro, elytris nigris: fasciis flavis: secunda antrorsum arcuata, pedibus ferrugineis.*
Fn. succ. 507. Leptura nigra, elytrorum lineis transversis flavis, pedibus testaceis.
Raj. inf. 82. n. 22. Scarabæus niger, lineolis luteis pulchre variegatus.
Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 5. f. 3. List. mus. t. 31. f. 1.
Habitat in Europa.
- præusta. 21. *L. thorace subglobofo fusco, elytris flavis, apice nigris, pedibus quatuor pallidis.*
Fn. succ. 506. Leptura nigra, elytris flavis apice nigris.
Habitat in Europa.
- linearis. 22. *L. thorace ovato, corpore cyaneo lineari, antennis longioribus. M. L. U.*
Habitat in India.
Antennæ corpore sesquialongiores. Variat femoribus clavatis & linearibus.