

595.76
P58m
pt.46

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

QUARANTE-SIXIÈME FASCICULE

(16 juillet 1926)

PAR

JAN 7 1938
MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS
“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES ”
15, RUE D'ENGHEN, 15

1926
Tous droits réservés

Natural History Library

595.76

P58m

pt. 46

Nouveautés diverses⁽¹⁾

Xylotrechus rufoapicalis n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, membris pro parte rufescens, elytris brunneis, ad basin et apice rufis, antice et postice griseo undulato-fasciatis; capite inter oculos multi et, in vertice, uni-costato; thorace globuloso, ruguloso-punctato, in disco pro parte transverse plicato; scutello lato, nigro, albo cincto; infra corpore albo notato. Long. 13 mill. Yunnan. — Ressemble à *fuliginosus* Frm., mais dessins blancs plus grêles et élytres largement roux au sommet.

Raphuma 5-notata v. nov. atricollis. Thorace nigro. Madura.

R. pingana n. sp. Sat elongatus, postice attenuatus, parum nitidus, niger, griseo pubescens, elytris fulvo pubescentibus, antice arcuate et postice transverse griseo fasciatis, ad humeros breve albo lineatis, thorace postice et infra corpore externe albo notatis; thorace elongato, antice et postice attenuato, dense et minute ruguloso-punctato; scutello albo; elytris sat elongatis, postice attenuatis, apice sinuatis, externe minute dentatis; pedibus posticis longissimis. Long. 14 mill. Chine. — Espèce caractérisée par sa forme non parallèle jointe à ses dessins élytraux.

Amauresthes multifenestratus n. sp. Elongatus, supra opacus, niger, pro parte luteo pubescens aut fasciatus; capite incarinato, dense punctato; medio sulca-

(1) Les types des espèces et variétés décrites ici figurent au moins dans ma collection.

tulo; thorace globuloso, luteo pubescente, medio late et sinuate nigro maculato, externe subannulato nigro notato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, apice oblique truncatis, minute et dense ruguloso-punctatis, nigris, luteo diverse fasciatis et nigro notatis. Long. 13 mill. Chine. — Espèce ressemblant, par ses dessins élytraux, à *X. atronotatus* Pic, mais, en plus de la tête non carénée, en différant par les dessins du dessus plus jaunes, laissant, sur le disque des élytres, des macules complètement, ou en majeure partie, bordées de jaune et des dessins noirs particuliers sur le prothorax qui, en outre, est nettement arrondi au milieu.

Melanauster nankineus n. sp. Elongatus, niger, elytris vase ænescentibus, his multi et irregulariter albo maculatis, haud granulatis; antennis brunneis, ad basin griseis, articulo 1° nigro; mesosterno antice in medio paulo elevato. Long. 28 mill. Chine. — Voisin de *glabripennis* Mots., en diffère par les antennes brunes et les élytres moins noirs.

Zorilispe rufipennis n. sp. Angustatus, nitidus, griseo pubescens et albo hirsutus, niger, elytris rufis, apice paulo attenuatis et truncatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Distinct, à première vue, de *fulvisparsa* Pasc. par la coloration, les élytres non marqués de gris au sommet.

Cyaritus subfasciatus n. sp. Oblongus, longe hirsutus, niger, infra corpore pro parte, pedibus, femoribus nigro notatis, elytrisque ad basin rufis; thorace sat breve, antice impresso, postice strangulato, mediocre parum dense punctato; elytris ad basin impressis et dense punctatis, apice sparse punctatis, ante medium et ante apicem reducte et arcuate griseo-fasciatis, post medium oblique griseo fasciatis. Long. 7 mill. Tonkin. — Voisin de *hamatus* Pasc., coloration différente, élytres avec une fascie pubescente postmédiane complète, etc.

Pterolophia tonkinea n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, niger, dense et fere uniformiter griseo-pubescent, elytris post medium piceo oblique notatis, apice truncatis, antice et postice minute tuberculatis, membris pro parte rufis. Long. 9-10 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, plus allongé avec un revêtement différent, la gibbosité fasciculée postérieure raccourcie.

P. bilineaticeps n. sp. Oblongus, postice attenuatus, niger, dense griseo pubescens, capite postice brunneo bilineato, elytris antice et medio piceo notatis, apice minute truncatis, ad basin fortiter tuberculatis; thorace parum breve et robusto, antice medio impresso. Long. 12 mill. Tonkin. — Voisin de *annulicornis* Pic, prothorax et revêtement différents, tête munie de 2 ligneoles brunes.

Le **P. bisulcaticollis** mihi, du Tonkin, ayant aussi deux lignes foncées sur la tête, est plus grand, à revêtement gris jaunâtre, ayant les membres en partie roux, les élytres ornés d'une fascie brune oblique postérieure et de côtes bien marquées, multimaculés de foncé, largement tronqués au sommet; le prothorax offre deux sillons médians parallèles avec des bandes alternées foncées et jaunes.

P. bimaculaticeps n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, niger, pro parte rufescens, griseo aut luteo pubescens, nigro maculatus, elytris ad medium late et oblique griseo-luteo fasciat, postice griseo-undulato-fasciat, et nigro notatis, apice truncatis, ad basin mediocre tuberculatis. Long. 13 mill. Chine. — Très distinct du précédent par la forme allongée, la tête simplement bimaculée de brun en arrière, etc. *

P. Iacosus n. sp. Oblongus, postice attenuatus, niger, fulvo pubescens, elytris post basin late albo notatis, his intuberculatis, apice subrotundatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *Bowringi* Pas. s'en

distingue, à première vue, par l'absence de tubercules distincts sur la base des élytres.

Le **laosensis** mihi, du Laos, très voisin du précédent, présente un revêtement fauve presque uniforme, avec de vagues bandes transversales ondulées foncées ou gris jaunes, avec le 4^e article des antennes blanc, au lieu d'être annelé de gris au milieu.

Le **dapensis** mihi, du Tonkin, lui aussi dépourvu de gibbosité élytrale, a les élytres moins courtes, les antennes revêtues de pubescence grise et le dessus du corps densément pubescent, presque entièrement jaune avec une large fascie grise raccourcie antémédiane et une fascie postmédiaine étroite et ondulée de même coloration. On peut établir pour cette espèce et celles dépourvues de tubercules, ou de crêtes pileuses, sur les élytres, un sous-genre nouveau que je nomme **Incamelomorpha**.

Ropica brevelineata n. sp. Sat elongatus, griseo pubescens, niger, antennis pedibusque pro majore parte rufis, antennis pedibusque pro majore parte rufis; thorace fulvo trilineato, lineis externis reductis, sat elongato, fortiter sat sparse punctato; elytris lineaō-punctatis, pro parte substriatis, ad humeros reducte fulvo bilineatis, postice diverse fulvo maculatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *posticalis* Pasc., très distinct par son revêtement particulier.

R. subdentaticeps n. sp. Subcylindricus, postice attenuatus, rufescens, pro parte piceus, sat uniformiter griseo pubescens; antennis sat gracilibus et elongatis; capite lato, parum dense punctato, tuberculis subdentatis; thorace parum breve, dense ruguloso-punctato; elytris thorace paulo latioribus, postice attenuatis, apice medio subangulatis, lineaō-punctatis, pro parte substriatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, revêtement différent, prothorax plus densément ponctué, etc.

R. rufonotata n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, sat dense griseo pubescens, in elytris postice multi albo notatis, niger, thorace elytrisque rufo notatis; thorace breve et lato, mediocre sat sparse punctato; elytris irregulariter punctatis, apice subrotundatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Diffère de *subnotata* Pic par les élytres plus allongés, marqués de roux, le revêtement différent.

Le **R. Coomani** mihi, du Tonkin, voisin du précédent, s'en distingue par le corps tout noir, les élytres un peu plus courts et ornés de mouchetures jaunes plus nombreuses à l'extrémité qu'antérieurement, la ponctuation plus irrégulière ou plus rapprochée des élytres.

R. posticalis v. nov. rufescens. Rufescens, pro parte brunnescens, pro parte luteo pubescens, elytris postice multi albo notatis. Tonkin.

Eudaphisia n. gen. Corpus oblongus, postice attenuatus; antennis gracilibus, longissimis, scapo elongato, apice paulo angulato; thorace ad basin paulo strangulato; elytris lateraliter subrotundatis, apice inermibus; pedibus gracilibus, sat elongatis, tibiis intermediis non emarginatis, tarsis sat validis, unguibus appendiculatis. — Voisin de *Daphisia* Pasc., s'en distingue par les élytres non mucronés, les antennes beaucoup plus grêles et bien plus longues que le corps.

Eudaphisia albonotata n. sp. Oblongus, postice attenuatus, opacus, niger, supra et infra pro parte albo notatis, articulis 3-5 antennarum ad basin pedibusque testaceis; capite inter oculos albo lineato; thorace lateraliter albo undulato-signato; elytris ad basin rufis, ad scutellum albo maculatis et signaturis diversis quinque albo notatis: fascia antica et altera postica, maculis tribus mediana, apicalis, antemediana externa et reducta; pectore lateraliter et abdomineque pro parte rufescentibus dense albo pubescentibus. Long. 10 mill. Tonkin.

Sybra postnotata n. sp. Angustatus, griseo pubescens, supra luteo notatus, niger, elytris pro parte, antennis et pedibus pro parte rufis; antennis gracilibus, ciliatis, elytris paulo superantibus; capite parum lato, sulcato, fortiter punctato, oculis sat approximatis; thorace parum elongato, disperse punctato, medio et lateraliter luteo vittato; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, postice paulo attenuatis, apice truncatis et externe longe dentatis, ad humeros in disco paulo et ante apicem late rufo notatis, antice reducte luteo lineatis aut maculatis, sat irregulariter punctatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par la structure de ses élytres jointe au revêtement.

Orcesis albopubens n. sp. Angustatus, niger, pro parte uniformiter albo pubescens, capite thoraceque externe bilineatis et medio albo unilineatis; capite thoraceque sat fortiter et parum dense punctatis, illo subquadrato; elytris thorace paulo latioribus, postice valde attenuatis, apice mucronatis, irregulariter punctatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Bien plus étroit que *spinipennis* Pic, avec la dent apicale plus longue, le revêtement différent.

Cacia tonkinensis n. sp. Oblongus, nitidus, albo et nigro hirsutus, niger, pro parte griseo pubescens, elytris ad basin et post medium albo fasciatis, pro parte undulato-pubescentibus; articulo 1^o antennarum longissimo, valde hirsuto; thorace breve et lato; elytris brevibus, fortiter et irregulariter punctatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Voisin de *herbacea* Pasc., premier article des antennes plus cylindrique, troisième article presque droit, bande prébasale blanche des élytres étroite et plus nette, etc.

Atelais angustata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, niger, griseo pubescens, supra pro parte luteo lineatus; antennis corpore paulo longioribus, gracilibus, articulo 1^o robusto, capite thoraceque fortiter et sparse

punctatis, illo subquadrato, luteo 5 vittato; elytris thorace paulo latioribus, postice valde attenuatis, apice acuminato-dentatis, lineato-punctatis, luteo lineatis et minute albo maculatis; femoribus validis, tibiis anticis arcuatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin de *illaesa* Pasc., plus étroit avec les élytres dépourvus de macules noires, pattes foncées.

Machotypa infasciculata n. sp. Sat robustus, opacus, niger, dense sat uniformiter griseo pubescens, paulo fusco notatus; thorace supra fortiter gibboso, medio depresso et triangulariter inciso; elytris ad basin minute tuberculatis et diverse granulatis, sat elongatis. Long. 22 mill. Kina Balu. — Voisin de *thoracica* W., en diffère, à première vue, par les élytres munis, sur leur base, de petits tubercules non fasciculés.

M. insulcata n. sp. Sat robustus et breviusculus, opacus, niger, pro parte purpureo pubescens et nigro notatus, elytris ad basin nigris, late griseo pubescentibus, medio fusco bimaculatis, apice fusco maculatis et rubro undulatis; thorace supra paulo elevato, medio insulcato; elytris satis brevibus. Long. 17 mill. Tonkin. — Voisin de *suffusa* Pasc. et s'en distinguant, à première vue, par les élytres plus courts.

Mutatocoptops albosparsa n. sp. Oblongus, niger, supra multi et diverse albo maculatus aut undulatus, membris albo notatis. Long. 18-22 mill. Yunnan. — Voisin de *niveosparsa* Fairm., revêtement moins moucheté, blanc, uniforme sur fond glabre.

M. Vitalisi n. sp. Oblongus, latior in ♀, niger, sat dense luteo-fulvo pubescens, elytris multi et minute nigro maculatis, membris luteo pubescentibus, nigro maculatis. Long. 16-20 mill. Laos (coll. Pic et Vitalis). — Voisin du précédent, distinct par son revêtement pubescent dense et jaune un peu fauve.

M. purpureomixta n. sp. Oblongus, niger, supra pro

parte griseo pubescens et pro parte purpureo lineatus aut maculatus, elytris multi nigro maculatis, antennis ad basin pedibusque pro majore parte purpureo pubescentibus. Long. 14 mill. Tonkin. — Voisin de *annulipes* Gah., revêtement différent.

Niphona albolateralis n. sp. Angustatus, postice pauculo attenuatus, niger, fulvo et griseo pubescens, elytris antice et lateraliter anguste albo vittatis; antennis corpore non longioribus; thorace lateraliter sinuato et ante medium subgibboso, supra medio trisulcato et bicarinato; elytris apice valde incisis et bidentatis. Long. 15 mill. Laos (ex Vitalis). — A placer près de *excisa* Pascoe, très distinct par ses élytres à bande blanche antérieure et externe.

N. minuta n. sp. Angustatus, subparallelus, niger, fulvo et griseo pubescens; thorace parum breve, antice et postice attenuato, lateraliter subsignato et minute subtuberculato, supra inaequale, medio postice impresso, sed non distincte sulcato; elytris apice incisis, angulis parum prominulis. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin de *regisferdinandi* Paiva, en diffère, à première vue, par le prothorax non bituberculé sur les côtés antérieurs.

Camptocnema longicornis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, niger, fulvo aut griseo pubescens, elytris lateraliter medio longe albo notatis, antennis longissimis; thorace lateraliter sinuato, antice subtuberculato, in disco trisulcato et bicarinato; elytris apice oblique truncatis, angulis externis dentatis. Long. 20 mill. Tonkin. — Distinct de *lateralis* W. par les très longues antennes et la macule blanche latérale allongée des élytres.

C. lunulata n. sp. Angustatus, subparallelus, niger, fulvo aut griseo pubescens, elytris lateraliter medio longe albo notatis et ad basin nigro maculatis; anten-

nis corpore non longioribus. Long. 15 mill. Laos (ex Vitalis). — Diffère du précédent par la forme du corps plus étroite et subparallèle, les antennes seulement de la longueur du corps, les élytres ornés chacun d'une macule basale discale noire veloutée cerclée de fauve.

Mesosa minor n. sp. Oblongus, nigro-piceus, membris aliquot pro parte rufis, griseo et luteo maculatus, aut undulatus, elytris antice oblique et postice sinuato nigro fasciatis; capite elongato; thorace breve, lateraliter subrotundato; elytris satis latis et brevibus. Long. 7-8 Yunnan. — Voisin de *unifasciata* Pic, très distinct par sa petite taille et l'absence de fascie sinuée antérieure noire sur les élytres.

M. tenuefasciata n. sp. Oblongus, nitidus, piceus, pro parte griseo pubescens; antennis annulatis, capite thoraceque griseo aut nigro vittatis, illo sat breve et parum lato, irregulariter punctato et nigro maculato; elytris brevibus, irregulariter pubescentibus, post medium anguste albo fasciatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *unifasciata* Pic, plus trapu avec les élytres ayant une fascie blanche postmédiane, au lieu d'une fascie noire antérieure.

Stesilea perforata n. sp. Elongatus, piceus, aliquot pro parte rufescens, supra pro parte vage lineato pubescens, elytris disperse albo notatis, diverse et irregulariter perforato-punctatis; capite lato, antennis parum brevibus, sat gracilibus, articulo 1° valido, 3°, 4° paulo curvatis, annulatis; thorace subquadrato, antice paulo attenuato; elytris thorace sat latioribus, elongatis, postice attenuatis, apice truncatis, supra antice depresso. Long. 12 mill. Tonkin. — Sans doute voisin de *inornata* Pascoe que je ne connais pas en nature.

Pardaloberea n. gen. Corpus angustatus, articulo 1° antennarum sulcato et carinato, capite post oculos longe prolongato; thorace longissimo, sinuato, transverse pli-

cato; pedibus brevibus et crassis, femoribus valde dilatatis, tibiis anticis et intermediis arcuatis. — Voisin de *Oberea* Muls., très distinct par la forme du prothorax, la tête munie d'une sorte de cou, les cuisses plus robustes.

Pardaloberea curvaticeps n. sp. Rufus, infra corpore pro parte brunneo notato, antennis, pygidio apice elytrisque postice circa et apice nigris, his fortiter punctatis, apice truncatis et externe dentatis. Long. 18 mill. Tonkin.

Oberea posticata Pic. Angustatus, rufus, antennis pygidioque supra nigris, elytris postice nigro cinctis; thorace parum breve, lateraliter fere recto; elytris elongatis, fortiter lineato punctatis, post basin attenuatis, apice bidentatis, dens externa longe prolongata. Long. 20 mill. Tonkin. — Voisin de *formosana* Pic, un peu moins étroit, antennes moins longues, etc.

La var. nov. **rufopyga** a le pygidium roux, les élytres nettement, mais brièvement, noirs au sommet avec le prothorax moins cylindrique.

O. yunnana n. sp. Elongatus, rufo-testaceus, capite, antennis, pygidio elytrisque apice nigris; thorace breve et lato; elytris elongatis, post basin attenuatis, apice subtruncatis et ciliatis, antice lineato, postice irreguliter, punctatis. Long. 20 mill. Yunnan. — Voisin de *robustior* Pic, plus élancé, avec le pygidium entièrement noir.

O. binhensis n. sp. Elongatus, rufo-testaceus, antennis ad basin nigris; thorace breve; elytris parum elongatis, post basin attenuatis, apice oblique truncatis, rufis, apice nigro notatis, lineato punctatis. Long. 15-16 mill. Tonkin. — Voisin de *rufotestacea* Pic, moins gracile avec les antennes bicolores, les élytres foncés au sommet.

Stibara parumpunctata n. sp. Elongatus, rufus, an-

tennis tarsisque nigris, elytris lateraliter nigro costatis, parum et trilineato punctatis. Long. 20 mill. Malabar.

— Diffère de *multipunctata* Pic par la ponctuation disposée sur trois rangées seulement : une sur le côté infléchi et deux en dessus, près de la côte latérale, les points externes étant plus gros.

Phytoecia sikkimensis v. nov. diversicornis. Abdomine, pygidio antennisque nigris, his apice vase brunnecentibus. Indes.

Trichochrysea scutellaris n. sp. Oblongus, nitidus, diverse hirsutus, cyaneus, aliquot pro parte viridi tinctus, scutello viride; antennae gracilibus, ad basin rufo tinctis; capite fortiter et sparse punctato, epistome indistincto, antice valde inciso; thorace elytrisque fortiter sat sparse punctatis, illis latis et brevibus. Long. 7-8 mill. Tonkin. — Voisin de *hirta* F., en diffère par l'écusson vert, la ponctuation plus écartée de l'avant-corps.

T. Donckieri n. sp. Oblongus, nitidus, fortiter et sparse punctatus, diverse hirsutus, cyaneus, labro membrisque pro parte viridi tinctis, calo humerale subæneo; antennae gracilibus. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, plus robuste, moins brillant, à calus huméral non de la couleur des élytres.

T. Bedoci n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, diverse hirsutus, capite thoraceque sparse, elytris irregulariter punctatis, cyaneo-violaceus, infra corpore, capite antice pedibusque viridi tinctis; antennae gracilibus, ad basin rufotinctis; epistome indistincto, antice valde inciso. Long. 6-7 mill. Tonkin. — Distinct, à première vue, des précédents par les élytres à ponctuation irrégulière et en partie plissés.

T. Coomani n. sp. Oblongus, nitidus, diverse hirsutus, diverse et sparse punctatus, cyaneus, pro parte viridescens, capite minute et sparse punctato, epistome

distincto, lato, antice fere recto. Long. 6 mill. Tonkin. — Espèce caractérisée et distincte des précédentes par la forme de l'épistome et la tête finement ponctuée sur le vertex.

T. multicolor n. sp. Oblongus, nitidus, diverse hirsutus, capite elytrisque sparse punctatis, thorace sat dense punctato; viridis, capite postice elytrisque pro parte auratis aut cupreis; antennis gracilibus, nigris, ad basin rufo-tinctis; epistome indistincto, antice inciso. Long. 7 mill. Tonkin. — Se distingue des précédents par la coloration et le prothorax à ponctuation plus rapprochée.

T. curta n. sp. Subovatus et latus, nitidus, diverse hirsutus, fortiter et sparse punctatus, cyaneo-violaceus, antennis ad basin rufo tinctis; epistome indistincto, antice paulo inciso. Long. 7 mill. Tonkin. — Voisin de *antennata* Jac., s'en distingue, à première vue, par le vertex non strigueux.

T. robusta n. sp. Oblongus, parum nitidus, diverse punctatus, nigro hirsutus et diverse pubescens, nigro-aeneus, pro parte cupreus; antennis gracilibus, rufescens-tibibus; capite thoraceque parum pubescentibus, dense punctatis et pro parte plicatis; elytris pro parte luteo-aurato pubescentibus et undulatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Par sa coloration et son revêtement voisin de *japana* Mots., plus robuste, avec les élytres à pubescence plus irrégulièrement disposée.

T. sericea n. sp. Oblongus, parum nitidus, nigro hirsutus, griseo aut luteo pubescens, aeneus, pedibus cupreis; antennis gracilibus, nigris, ad basin rufis, pedibus cupreis. Long. 9 mill. Chine. — Très voisin du précédent, mais avec le prothorax simplement densément et finement ponctué, les élytres plus inégales, à revêtement différent et pubescence soyeuse plus fine.

T. brevipennis n. sp. Subovatus, parum nitidus, di-

verse hirsutus et luteo-griseo pubescens, æneus, pro parte cupreus; antennis rufescentibus, gracilibus; capite minute, parum dense punctato; thorace breve et lato, minute sat dense punctato; elytris brevibus et lati, diverse pro parte fortiter et sparse punctatis. Long. 7 mill. Bornéo. — Très distinct du précédent par les élytres courts, le revêtement un peu jaunâtre.

T. undulata n. sp. Oblongus, parum nitidus, nigro-hirsutus, pro parte luteo aut rubro pubescens, nigro-æneus, pedibus purpureis, antennis gracilibus, rufescentibus; capite thoraceque dense ruguloso-punctatis, illo parum lato, pro parte pubescente; elytris irregulatiter pro parte fortiter punctatis, pro parte undulato pubescentibus. Long. 6 mill. Thibet. — Ressemble à *Lesnei* Berl., mais le prothorax est plus large et en partie revêtu de pubescence soyeuse.

Cephalolia Forestieri n. sp. Elongatus, parum depresso-sus, nitidus, rufus, antennis nigris, elytris apice parum late et oblique nigris; capite mediocre punctato; thorace transverso, fortiter et sparse punctato, medio lave lineato; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, minute striato-punctatis. Long. 5 mill. Guyane Fr. — Voisin de *partita* Weise, plus allongé avec la coloration noire apicale laissant une bordure rousse sur les côtés, sommet excepté.

C. bicoloripes n. sp. Oblongo-elongatus, subconvexus, nitidus, niger, tibiis tarsisque testaceis, elytris antice et externe longe testaceo notatis; capite mediocre punctato; thorace transverso, fortiter et sparse punctato; elytris thorace sat latioribus, minute striato-punctatis, externe sulcatis. Long. 5,5 mill. Brésil. — Voisin de *fulvipes* Baly, un peu moins allongé avec l'abdomen noir et les pattes bicolores.

Demothispa atra n. sp. Oblongus, sat convexus, nitidus, niger, palpis pedibusque testaceis, femoribus apice

piceis; capite fere impunctato; thorace valde transverso, fere impunctato, lateraliter impresso; elytris thorace sat latioribus, lineato-punctatis, fere instriatis, lateraliter impressis. Long. 5 mill. Vénézuela. — Voisin de *jataiensis* Pic, plus lisse avec les pattes plus largement claires.

D. rufa n. sp. Oblongus, parum convexus, nitidus, rufus, abdomine brunnescente; capite parum punctato; thorace lato, mediocre lâve, lateraliter fortiter et disperse punctato; elytris minute striato-punctatis. Long. 5 mill. Guyane Fr. — A placer près de *pallida* Baly.

D. bicoloricornis n. sp. Oblongo-subovatus, parum convexus, nitidus, testaceus, supra medio pro parte rufescens, antennis nigris, ad basin late et apice breve rufis. Long. 4 mill. Guyane Fr. — Plus large que le précédent, avec les antennes bicolores; diffère, d'autre part, de *latifrons* W. par les antennes ayant à leur base plusieurs articles roux.

D. testaceicornis n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, ruber, antennis testaceis, elytris cyaneis. Long. 7 mill. Pérou. — Espèce très distincte de *fallaciosa* Pic par sa forme robuste jointe à la coloration de ses antennes.

Ommadius nigrohumeralis n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, hirsutus, nigro-subæneus, capite antice, antennis ad basin, pectore pro parte, abdomine pedibusque pro majore parte testaceis, elytris ad basin ante et post medium testaceo fasciatis, fasciis diverse sinuatis, antice in disco testaceo lineatis, sutura et margine pro parte rufis; capite valido, inter oculos biimpresso et carinulato; thorace parum elongato, sat robusto, supra paulo impresso, medio incarinato, antice et postice transverse sulcato, minute parum dense punctato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, apice excepto, lineato pro parte fortiter punctatis; pedibus satis robustis. Long. 11 mill.

Tonkin. — Peut se placer près de *bifasciatus* Cast., sculpture du prothorax autre, fascies des élytres différentes, l'antérieure contournant le calus huméral noir et n'atteignant pas la suture, etc.

Phæocyclotomus Phungi n. sp. Parum elongatus, subparallelus, piceo hirsutus, niger, vage subæneus, in elytris pro parte rufo tinctus, abdomine membrisque testaceis, femoribus apice piceis, supra griseo pubescens, elytris vage et diverse griseo fasciatis; articulis antennarum elongatis, pro parte antice arcuatis; thorace breve et lato, antice et postice sulcato; elytris thorace paulo latioribus, sat elongatis, apice breve attenuatis, sat regulariter pro parte fortiter usque ad apicem lineato-punctatis, diverse et paulo granulatis; pedibus sat gracilibus. Long. 8-10 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *orbatus* Kuw., dont il se distingue, à première vue, par la coloration différente.

Stigmatium postfasciatum n. sp. Elongatus, sparse hirsutus, rufus, antennis apice et femoribus posticis pro parte piceis; antennis apice paulo dilatatis, articulo ultimo sat elongato; thorace sat breve et lato, antice sulcato, postice biimpresso et strangulato; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, apice breve attenuatis, sat regulariter lineato-punctatis, apice excepto, paulo granulatis, rufis, signaturis nigris ornatis: macula antica parva discoidalis, fasciis 2 posticis, sinuatis pro parte junctis, prima externa et antice longe prolongata; pedibus parum gracilibus. Long. 6 mill. Tonkin. — Ressemble à *cicindeloides* Gray, plus parallèle et dessins noirs des élytres différents.

Priotoma atronotata n. sp. Globulosus, nitidus, niger, antennis tarsisque rufis, holosericeo pro parte hirsute et undulate pubescens, elytris ad suturam antice nigro maculatis, macula fulvo pubescens. Long. 3 mill. Rép. Argentine (coll. C. Bruch et Pic). — Espèce très distincte par la présence d'une macule élytrale commune, subarrondie, noire et pubescente de fauve.

Magnanobium n. gen. Corpus elongatus; capite verticale, elongato, oculis magnis; antennis non pectinatis, articulo 1° crasso, subarcuato, 2° elongato, pro parte subangulato, 9-11 longissimis aut articulis 3-8 longioribus et 7-10 duplo longioribus; thorace infra excavato, lateraliter marginato, postice supra non elevato; coxis anticis prominulis, approximatis; pedibus gracilibus, tibiis anticis apice sulcatis, tarsis elongatis, non emarginatis. — Sans doute voisin de *Oligomerodes* Fall. Diffère, à première vue, de *Oligomerus* Redt. par la tête plus longue, la structure des antennes, les tarses plus longs.

Magnanobium elongatum n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, rufus, aliquot abdomine paulo infuscato; capite thoraceque minute et dense punctatis; elytris thorace sat latioribus, subsulcatis et pro parte linea-to-punctatis. Long. 7 mill. Rép. Argentine (coll. C. Bruch et Pic). — J'attribue à cette espèce comme ♀ et comme variété, sous le nom de **obscurum**, 2 exemplaires de taille un peu plus grande, à coloration générale plus ou moins obscurcie, les membres étant roux, à élytres plus nettement striés et linéolés de pubescence grise.

Macrosiagon excavatipenne n. sp. ♀. Plus minusve angustatus, nitidus, parum pubescens, rufus, aliquot infra corpore pro majore parte antennis apice, femoribus anticis pro parte nigris, elytris testaceis, in disco late et longe excavatis, apice acuminate; antennis pectinatis; capite sat elongato, postice impresso et subarcuato, fortiter et irregulariter punctato, thorace elongato, postice medio deplanato et externe longe impresso. Long. 8-9 mill. Rép. Argentine (coll. C. Bruch et Pic). — Peut se placer près de *excavatum* Chp., coloration plus claire, prothorax moins élargi en arrière, etc.

Pelecotomoides griseovittata n. sp. Elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, nigro-piceus aut pro parte

rufescens, capite femoribusque rufis; capite postice elevato, fortiter et dense punctato, oculis sat approximatis, articulo 1^o antennarum elongato, 2^o subgloboso, 3^o elongato, 4^o et sequentibus plus minusve longe pectinatis; thorace dense punctato, sat breve, antice attenuato, antice et postice externe impresso, medio postice sulcato; elytris elongatis, apice attenuatis; sulcatis et griseo lineatis. Long. 10-12 mill. Rép. Argentine (coll. C. Bruch et Pic). — Espèce très distincte par ses élytres conjointement sillonnés et ornés d'étroites lignes grises longitudinales.

Rhipiphorus Bruchi n. sp. Nitidus, niger, aut pro parte rufescens, palpis, antennis ad basin, pedibus 4 antice's elytrisque testaceis; antennis longe pectinatis ♀, aut flabellatis ♂, bicoloribus; capite in vertice paulo elevato, minute et sparse punctato; thorace fere lâve, lateraliter sinuato, antice attenuato, angulis posticis sat prominulis; elytris parum punctatis, intus impressis. Long. 7 mill. Rép. Argentine (coll. C. Bruch et Pic). — Voisin'de *valdivianus* Phil. et s'en distinguant, à première vue, au moins par les antennes bicolores et les pattes plus claires.

R. Bruchi s. esp. diversipes. Capite thoraceque sat dense griseo pubescentibus, illo distincte punctato; abdomen late aut paulo luteo notato, pedibus nigris, diverse luteo annulatis. Rép. Argentine (coll. C. Bruch et Pic). — A cause de la coloration bicolore des antennes, bien que le prothorax soit distinctement ponctué, je considère cette forme comme une modification de la précédente espèce.

Eustrophinus subtestaceus n. sp. Oblongo-subovatus, apice attenuatis, nitidus, luteo pubescens, rufō-testaceus, supra medio pro parte brunnescente, antennis nigris, ad basin et apice rufis; oculis approximatis; thorace parum breve, antice subarcuato, minute et sparse punctato; elytris ad humeros paulo dilatatis, fere in-

striatis sed lineato-punctatis, intervallis depresso-s, sparse punctatis. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin de *bicoloricornis* Pic, qui, lui aussi, est de forme oblongue et subovalaire, mais coloration plus claire, élytres moins allongés, etc.

Brasilium giganteum n. sp. Parum elongatus, nitidus, luteo pubescens, rufus, pro parte brunnescens, scutello, antennis ad basin pedibusque testaceis, elytris testaceis, medio ad suturam piceo et breve lineatis, ad basin et externe antice piceo marginatis; capite thorace-que dense granuloso-punctatis, illo breve et valde transverso, supra multi impresso; elytris parum elongatis, lateraliter sinuatis, apice attenuatis, ad basin impressis, diverse pro parte fortiter punctatis. Long. 8 mill. Bré-sil. — Espèce distincte entre toutes par sa grande taille et son prothorax très impressionné.

B. suturale n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo dilatatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, anten-nis medio piceis, elytris ad basin externe que pro parte et diverse piceo marginatis, sutura pro majore parte picea; thorace parum lato, semicirculare, dense rugulo-so punctato, supra paulo impresso; elytris thorace sat latioribus, postice paulo dilatatis, apice breve attenuatis, irregulariter pro parte dense et minute punctatis. Long. 5,5 mill. Amazones. — Très distinct de *atro-fasciatum* Pic, en outre de la coloration élytrale, par le prothorax moins court et moins inégal.

Jalapanum n. gen. Corpus elongatus; antennis pa-rum gracilibus, 11 articulatis; thorace transverso, late-raliter marginato, supra trisulcato; elytris paulo margi-natis; pedibus sat gracilibus, articulo penultimo tar-sarum paulo dilatato et lobato, unguibus reductis, den-tatis. — Genre voisin de *Osphyta* Ill. par plusieurs ca-ractères plastiques et s'en distinguant, à première vue, par la particulière structure de son prothorax, muni de trois sillons bien marqués, le médian plus long et plus droit.

Jalapanum maculaticeps n. sp. Elongatus, subparallelus, opacus, dense punctatus et parum sparse griseo pubescens, niger, capite inter oculos rufo notato, thorace geniculisque rufis, abdomine rufo notato, mandibulis pro parte testaceis. Long. 7 mill. Mexique.

Asclera incostata n. sp. Angustatus, opacus, griseo pubescens, olivaceus, membris pro parte piceis, capite antice, palpis, antennis ad basin, thorace pedibusque pro parte testaceis; thorace sat elongato, antice paulo dilatato, medio biimpresso; elytris dense rugulosopunctatis, incostatis. Long. 7 mill. Thibet. — Voisin de *fornosana* Pic, mais prothorax non brillant, antennes plus foncées, pattes largement testacées. Varie par les antennes rousses avec les pattes en majeure partie foncées (var. **ruficornis**), ou antennes et pattes presque entièrement foncées (v. **obscurimembris**).

Chrysanthia cyanescens n. sp. Angustatus, nigro-cyanescens, membris pro parte brunnescens; thorace elongato et angustato, lateraliter non dilatato, medio longe sulcato. Long. 7 mill. Indes: Kulu. — Voisin de *fuscimembris* Frm., mais prothorax plus étroit et coloration différente.

Oxaxis albolineatus n. sp. Elongatus, fere opacus, griseo pubescens, rufo-testaceus, capite, antennis, tarsis, abdomine elytrisque nigris, his ad suturam et lateraliter late albo lineatis. Long. 7 mill. Costa-Rica. — Voisin de *Pauli* Pic, moins allongé, prothorax égal, tête toute noire, etc.

O. notaticeps n. sp. Elongatus, fere opacus, griseo pubescens, testaceus, palpis antennisque nigris, rufo annulatis, femoribus apice, tibiis tarsiisque nigris, capite in vertice piceo maculato, elytris in disco et externe antice nigro lineatis. Long. 8-10 mill. Colombie. — Voisin de *bilineata* Chp., en diffère par la tête maculée, le sommet des cuisses noir.

Sisenes infasciatus n. sp. Elongatus, fere opacus, pa-
rum et breve pubescens, niger, thorace aurantiaco tri-
lineato, capite infra oculos scutelloque aurantiacis,
elytris nigro metallicis, ad humeros longe aurantiaco
vittatis, his costatis et dense ruguloso punctatis. Long.
7 mill. Costa-Rica. — Voisin de *fasciatus* Pic, élytres
plus courts et dépourvus de fascie.

Micronarcedes atricolor n. sp. Elongatus, nitidus,
parum pubescens, niger, elytris vage cupreis; capite
parum punctato; thorace breve et lato, supra late im-
presso, sat dense punctato; elytris dense ruguloso-punc-
tatis. Long. 6 mill. Colombie. — Voisin de *infasciatus*
Pic, moins allongé avec le prothorax plus fortement im-
pressionné et la coloration générale foncée.

Diplectrus vicinus n. sp. Elongatus, subopacus, gri-
seo pubescens, testaceus, palpis, antennis, femoribus
apice, tibiis tarsisque nigris; thorace minute et dense
punctato. Long. 18-20 mill. Brésil. — Très voisin de
giganteus Chp., s'en distingue, à première vue, par le
prothorax non roussâtre, de la coloration des élytres, et
à structure différente.

D. testaceipes n. sp. Elongatus, subopacus, griseo
pubescens, testaceus, antennis pro parte nigris; thorace
elongato, lateraliter antice gibbuloso, supra multi im-
presso, minute et dense punctato. Long. 16-18 mill.
Colombie. — Distinct, à première vue, du précédent par
les pattes testacées et la structure du prothorax.

Le **D. flavescentis** mihi, de Colombie, un peu brillant,
est entièrement flave, antennes comprises et le pro-
thorax n'a pas de gibbosités latérales marquées.

Bradymerus seminitidus n. sp. Oblongus, niger, an-
tennis ad basin pedibusque rufescentibus, subopacus,
elytris nitidis; capite thoraceque dense granuloso-punc-
tatis, illo medio impresso et multi tuberculato, lateraliter
multi dentato; elytris thorace paulo latioribus, sat

brevibus, parum striatis, lineato foveolatis. Long. 7 mill. Indochine. — Voisin de *rugatulus* Frm., plus foncé, tête sans aspérités, prothorax différent, élytres brillants, etc.

B. elegans (Chat.). Elongatus, niger, elytris castaneis, subopacus, elytris paulo nitidis; capite thoraceque dense ruguloso-punctatis, illo pro parte plicato, latera-liter crenulato, parum transverso; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, substriatis, pro parte lineato-punctatis, pro parte granulatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Bien plus allongé que le précédent, avec la sculpture tout autre.

Le **B. Vitalisi** mihi, du Cambodge, est roussâtre, un peu moins allongé que le précédent, plus brillant, avec l'avant-corps nettement ponctué, la ponctuation en partie pupilleuse, le prothorax à peine crénelé et multi-impressionné en dessus, les élytres à stries crénelés, avec les intervalles en partie subdéprimés, finement ponctués.

B. simplicithorax n. sp. Oblongus, sat latus, nitidus, rufus, supra medio paulo infuscatus; capite thoraceque dense ruguloso aut pupillato punctatis; capite ante oculos dilatato; thorace sat breve et lato, late marginato, increnulato; elytris thorace non latioribus, sat brevibus, minute et multi carinatis, intervallis concavis, irregulariter et multi punctatis. Long. 5-5,5 mill. Tonkin. — Espèce caractérisée et particulière par la forme robuste, le prothorax non crénelé, la sculpture élytrale.

Cargilius Anceyi n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufescens, elytris nigro-piceis, antice reducte luteo fasciatis, ad apicem rufo notatis, membris rufis; capite antice sinuato et breve, in mare bidentato, ♀ subarcuato, illo rufo aut piceo; thorace lateraliter ♂ parum longe cornato, transverso, minute et sparse punctato; elytris substriato-punctatis, intervallis deplanatis, multi

punctatis. Long. 6,7 mill. Zanguebar. — Voisin de *affinis* Geb., en diffère, à première vue, par les cornes plus courtes du prothorax ♂ et cet organe roussâtre.

Pycna Sikorain. sp. Oblongus, subparallelus, subconvexus, rufus; capite lato, antice paulo impresso, externe angulato, late et sparse punctato; thorace breve et lato, angulis, anticis sat prominulis, fortiter et sparse punctato; elytris crenato-striatis, intervallis fere impunctatis. Long. 5,5 mill. Madagascar. — Diffère de *impressifrons* Frm. par la ponctuation de la tête plus large, la coloration rousse, etc.

P. atra n. sp. Oblongo-elongatus, subparallelus, paulo convexus, niger, membris paulo rufescensibus; capite parum lato, medio impresso, antice externe late elevato, medio sparse punctato; thorace parum breve, angulis anticis prominulis, fortiter et sparse punctato; elytris crenato-striatis, intervallis fere impunctatis. Long. 7 mill. Madagascar. — Espèce caractérisée par sa tête relativement petite et la coloration noire du dessus du corps.

Diaperis 4-maculatus n. sp. Oblongus, niger, elytris rubris, antice in singulo transverse 4 maculatis et postice undulato et pro parte interrupte nigro fasciatis, sutura nigra, antice rufa; oculis sat distantibus, vertice vage rufo notato, fortiter et sparse punctato, medio foveolato; thorace transverso, mediocre et sparse punctato, antice paulo attenuato; elytris non brevibus, non fortiter lineato-punctatis, intervallis minute punctatis; pedibus nigris, femoribus antice pro parte rufis. Long. 7 mill. Thibet. — A placer près de *sanguineipennis* Bates.

D. rufipes v. nov. nigronotata. Elytris rufis, antice nigro maculatis et postice nigro sinuato-fasciatis, sutura, antice excepta, nigra. Floride. — Variété caractérisée par la division de la bande antérieure noire normale. — La var. nov. **bicoloriceps**, voisine de la précéd-

dente, a la tête rousse en arrière et foncée en avant. Floride.

Platidema unicornutum n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, rufus, supra niger, elytris antice testaceo undulato-fasciatis et postice testaceo maculatis, membris rufo testaceis; capite in vertice cornu robusto munito; thorace sat fortiter et sparse punctato; elytris striato-punctatis, intervallis punctatis. Long. 4 mill. Java. — Voisin de *aurimaculatum* Grav., plus étroit, première fascie différente remontant jusqu'à la base vers les épaules.

P. discoidale n. sp. Oblongo-ovatus, opacus, rufus, thorace pro parte elytrisque medio late nigris; capite ♂ inaequale, bicornuto, ♀ bigibboso; thorace transverso, parum distincte punctato; elytris minuto lineato-punctatis, fere instriatis, intervallis deplanatis. Long. 3,5-4,5 mill. Sumatra. — Très voisin de *sericeum* Geb., cornes des ♂ plus saillantes, celles-ci pointues ou fasciculées au sommet, la gauche étant un peu plus longue, élytres largement foncées sur leur milieu, etc. — La var. nov. **diversicorne**, de Malacca, a la corne gauche très longue, dilatée à la base, la droite émoussée et peu marquée, la tête plus largement excavée chez ♀.

P. bicornutum n. sp. ♂. Parum elongatus, nitidus, rufus, membris pallidioribus, capite postice et elytris in disco ad suturam paulo brunnescentibus; capite longe bicornuto, cornis supra piceis; thorace breve et valde transverso, minute et sparse punctato; elytris sat fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, minute et sparse punctatis. Long. 3 mill. Bornéo. — Espèce très distincte par ses longues cornes droites conjointement à sa coloration. — La var. nov. **semiobscurum**, de Bornéo, a la tête noire en arrière et les élytres plus largement foncés.

P. rufimembris n. sp. Oblongo-subovatus, rufus, supra viridi-metallicus; capite longe bicornuto ♂, aut simplice ♀; thorace breve et transverso, minute et sparse

punctato; elytris sat fortiter striato-punctatis, intervallis convexis, sparse punctatis. Long. 5 mill. Banguay. — Voisin de *Marseuli* Lewis, en diffère, à première vue, par les membres plus clairs.

P. rufoscutum n. sp. Oblongus, rufus, supra pro parte viridi-metallicus; capite bicornuto ♂, aut simplice ♀, rufo marginato; scutello rufo; elytris striato-punctatis; intervallis subdepressis, sparse punctatis. Long. 4 mill. Java. — Voisin du précédent.

P. rufotinctum n. sp. Oblongo-subovatus, rufescens, supra pro parte æneo-viridescens, membris testaceis; capite simplice, minute et sparse punctato, oculis distantibus; thorace sat breve et lato, diverse parum sparse punctato; elytris minute striato-punctatis, intervallis depresso, multi punctatis. Long. 5 mill. Java. — Diffère, à première vue, des précédents par la coloration du dessus à transparence roussâtre et la ponctuation moins écartée du prothorax.

P. cyaneolimbatum n. sp. ♂. Oblongo-subovatus, nitidus, convexus, rufescens, infra corpore pro parte piceo, supra metallicus, pro majore parte purpureus, elytris cyaneo marginatis; capite diverse bicornuto; thorace minute punctato; elytris lineato-punctatis, fere instriatis, intervallis deplanatis, parum punctatis; membris rufis. Long. 5,5 mill. Malacca. — Espèce très distincte par sa coloration conjointement à la structure de sa tête, dont la corne gauche est presque nulle, tandis que la droite est longue et pointue.

P. tenggerense n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, parum convexus, rufus, supra viridi-olivaceus aut ænescens, membris rufis; capite simplice, minute parum sparse punctato, oculis distantibus; thorace breve et lato, minutissime et sparse punctato; elytris fere instriatis, lineato-punctatis, intervallis deplanatis, minute et sparse punctatis. Long.

6-7 mill. Java. — Voisin de *chalceum* Geb., pattes plus claires, dessous roux, etc.

P. Modiglianii n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, subconvexus, rufescens, thorace pro parte elytrisque piceis, his antice luteo undulato-fasciatis et apice late et longe luteis; capite breve bicornuto ♂; thorace sat fortiter et parum sparse punctato; elytris striato-punctatis, intervallis convexis, minute punctatis. Long. 5 mill. Mentawai. — Peut se placer près de *subfascia* Walk., tête à structure différente avec les deux dents presque pa-reilles.

Le **P. reducticorne** mihi, de Manindjan, très voisin du précédent, est roux avec le prothorax et les élytres largement noirs, celles-ci ayant une fascie antérieure ondulée jaune éloignée de la base et le sommet extérieurement roux.

P. atromaculatum n. sp. ♂. Oblongo-ovatus, nitidus, subdepressus, rufus, thorace pro parte nigro; elytris rufis, ad basin nigro maculatis et ad medium nigro undulato-fasciatis; thorace diverse bicornuto ♂, sat fortiter et parum sparse punctato; elytris minute striato-punctatis, intervallis subdepressis, parum punctatis. Long. 5 mill. Banguey. — Voisin des précédents, mais coloration élytrale différente et corne droite, bien plus longue que la gauche.

P. Coomani n. sp. Oblongus, nitidus, subconvexus, rufus, capite elytrisque nigris, his antice luteo fasciatis et postice luteo maculatis; capite sat fortiter punctato, oculis parum distantibus; antennis validis nigris, ad basin rufis; thorace rufo, aliquot piceo, minute et sparse punctato; elytris fere instriatis, lineato-punctatis, intervallis deplanatis, parum punctatis; pedibus testaceis; abdomine rufo, apice nigro. Long. 5 mill. Tonkin. — Sans doute voisin de *perpolitum* Geb., en diffère, à première vue, au moins par le sommet des élytres foncé.

P. Boucardi n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, rufus, thorace pro parte piceo, mediocre sat sparse punctato; elytris nigris, ad basin luteo sinuato-fasciatis et apice luteo maculatis, substriatis; capite simplice. Long. 4,5 mll. Sumatra. — Peut se placer près de *sumatranum* Geb., en diffère, à première vue, par la coloration noire plus étendue sur les élytres.

D. Demangei n. sp. Oblongo-ovatus, minutus, convexus, nitidus, rufus, elytris ad basin late nigro maculatis, ad medium sinuata et interrupte nigro fasciatis; capite simplice; thorace dense punctato; elytris striato-punctatis, intervallis convexis. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin des précédents, plus convexe, avec une fascie interrompue étroite aux élytres.

P. Crampeli n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, subconvexus, rufescens, membris pallidioribus, infra corpore pro parte, capite postice, thorace medio elytrisque piceis, his ad humeros et ad apicem rufo maculatis; capite ♂ breve bituberculato, ♀ simplice; thorace sat minute et sparse punctato; elytris substriato-punctatis. Long. 3 mill. Congo Français. — Peut se placer près de *latitarse* Geb., dessins des élytres différents, taille plus petite, tête différente.

P. Favareli n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, nitidus, subconvexus, rufus, capite nigro; elytris ad basin nigro maculatis et ad medium nigro undulato-fasciatis, signaturis nigris ad suturam junctis; capite inæqualiter sed late bidentato; thorace sat minute et sparse punctato; elytris substriato-punctatis. Long. 5 mill. Congo Français. — Espèce caractérisée par les deux forts tubercules cornus de la tête inégaux, le gauche plus long que le droit.

P. mutilatum n. sp. ♂. Oblongo-subovatus, nitidus, sat deplanatus, rufo-testaceus, supra pro parte brunneus; capite brunneo, antice testaceo et medio angu-

lato, postice inæquale bidentato; thorace brunneo, rufo notato, diverse sat sparse punctato; elytris brunneis, antice reducte luteo-undulato fasciatis et apice luteo notatis, striato-punctatis. Long. 4 mill. Zanzibar. — Voisin du précédent, très distinct par la forme plus déprimée et la structure de la tête munie à droite d'une corne cylindrique robuste, poilue au sommet et à gauche d'une courte et large dent.

P. trituberculatum n. sp. ♂. Oblongo-subovatus, nitidus, paulo deplanatus, rufo-testaceus, pedibus pallidioribus, elytris ad basin nigro maculatis et ad medium oblique et undulato nigro fasciatis, signaturis nigris ad suturam junctis; capite antice tuberculato, postice lato et parum distincte bituberculato; thorace minute et sparse punctato; elytris striato-punctatis. Variat.: macula nigra basalis ad fasciam non juncta (v. nov. *interruptum*). Long. 4 mill. Gabon. — Voisin de *Hollmi* Geb. par le dessin des élytres, mais tête rousse et autrement conformée.

P. leonense n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, subconvexus, capite postice nigro, elytris ad basin in disco longe nigro notatis; capite simplice, antice biimpresso, postice transverse sulcato; thorace parum minute et sparse punctato; elytris substriato-punctatis, intervallis latis, antice deplanatis. Long. 4 mill. Siera-Leone. — Espèce distincte, à première vue, par sa particulière coloration élytrale.

Le **P. proximum** mihi, de la même provenance, diffère du précédent par la coloration générale rousse, dessus compris, la tête munie postérieurement de 2 cornes, la droite un peu plus courte que la gauche.

Le **P. binotatum** mihi, de l'Ogoué, voisin des précédents, est plus grand, plus allongé, avec la tête munie de 2 tubercules dentiformes pareils, le prothorax est largement noir au milieu, les élytres sont noirs, marqués de roux à la base et au sommet.

P. Mocquerysi n. sp. Subovatus, sat nitidus, subconvexus, concolor, rufo-testaceus; capite simplice, dense punctato; thorace minute sat dense punctato; elytris striato-punctatis, intervallis convexis. Long. 3 mill. Gabon. — Espèce caractérisée par sa forme jointe à sa coloration concolore; peut se placer près de *Goryi* C. Br.

P. tomentosum v. nov. apicale. Rufus, thorace medio elytrisque pro majore parte piceo-ænescentibus; capite sat longe bicornuto; thorace pro parte dense punctato; elytris late striato-punctatis, intervallis convexis. Long. 5 mill. Gabon. — Diffère au moins de la forme type par les élytres marqués de roux à l'extrémité et la pubescence un peu espacée.

Hoplocephala convexa n. sp. ♂. Oblongus, convexus, nitidus, rufus, capite thoraceque piceo-metallicis, elytris rufo-ænescentibus, antennis nigris, ad basin rufis; capite antice sat longe et postice longissime bidentato; thorace fortiter sat sparse punctato; elytris sat brevibus, fere instriatis, pro parte fortiter lineato-punctatis, intervallis diverse punctatis. Long. 4 mill. Guyane Fr. — A placer près de *distans* Chp., moins foncé de coloration et à tête seulement bituberculée antérieurement.

H. testaceipes n. sp. Oblongus, subconvexus, parum nitidus, rufo-testaceus, pedibus pallidioribus; capite ♂ antice medio tuberculato, postice duobus cornibus validis et rectis munito, ♀ postice minute tuberculato; thorace fortiter sat dense punctato; elytris sat brevibus, fere instriatis, diverse punctatis. Long. 4 mill. Guyane Fr. — Voisin du précédent, dessus non métallique, forme plus parallèle et convexe, tête seulement tuberculée antérieurement.

H. minuta n. sp. Oblongus, parum convexus, subnitidus, rufus; capite ♂ antice minute et postice breve bituberculato, ♀ fere simplice, antice impresso; thorace sat dense punctato; elytris instriatis, irregulariter

punctatis. Long. 3 mill. Guyane Fr. — A placer près de *coides* Chp., coloration plus rousse et tête autrement conformée.

H. luteonotata n. sp. Oblongo-elongatus, subconvexus, nitidus, rufus, antennis pallidioribus, elytris nigris, pro parte rufo cinctis, ad basin luteo fasciat; ♂ capite antice bituberculato et postice breve bicornuto, ♀ simple; thorace fortiter sat sparse punctato; elytris sat elongatis, substriatis et pro parte lineato-punctatis. Long. 5 mill. Guyane Fr. — A placer près de *lateralis* F., en diffère, à première vue, par sa courte fascie antérieure jaune.

H. armata v. nov. **curticornis** ♂. Rufescens, capite antice sinuato, postice breve et late bicornuto. Guyane.

H. atricollis n. sp. ♀. Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, rufus, capite thoraceque nigris, elytris ad medium brunnescens; capite simple, transverse bisulcato, fortiter sat dense punctato; thorace fortiter et sparse punctato; elytris sat brevibus, pro parte lineato, pro parte irregulariter et diverse punctatis. Long. 3 mill. Guyane Fr. — Espèce de coloration particulière, pouvant se placer près de *distans* Chp.

Eutochia atra n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, antennis tarsisque vague rufescens; capite thoraceque sparse punctatis, illo sat breve, antice paulo attenuato; elytris sat fortiter striato-punctatis, intervallis minute punctatis; tibiis anticis intus fortiter curvatis, externe crenulatis. Long. 7 mill. Ceylon. — Diffère nettement de *lateralis* Boh. par la coloration générale noire.

Diaclina brevis n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, rufescens, membris pallidioribus, capite postice piceo; thorace breve et lato, antice paulo attenuato, diverse et sparse punctato; elytris apice valde attenuatis, substriato-punctatis, intervallis minute punctatis. Long.

3,5 mill. Sumatra. — Espèce très distincte par sa petite taille jointe à sa coloration.

D. Boucardi n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite antice, thorace lateraliter membrisque rufis, elytris nigris, ad basin in disco apiceque rufo maculatis. Long. 4 mill. Sumatra. — Voisin du précédent, plus allongé avec les élytres maculés.

Le **D. madurensis** mihi¹, de Madura, de coloration analogue, est plus grand, plus parallèle, moins aplati, les élytres n'ont pas de stries appréciables et les angles antérieurs du prothorax sont très arrondis.

D. latemaculata n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, subdepressus, rufus, capite thoraceque medio late nigris, elytris nigris, ad basin et apice late rufo-testaceo maculatis; thorace sat breve, antice paulo attenuato, diverse punctato; elytris fere instriatis et lineato-punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 5 mill. Madura. — Distinct, à première vue, du précédent par la macule antérieure des élytres plus claire et non isolée du bord latéral.

Eubrianax albomaculatus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, niger, elytris in disco antice vage rufescensibus, thorace lateraliter antice albo maculato, minute sat dense punctato; elytris postice paulo dilatatis, pro parte costatis, irregulariter punctatis. Long. 6 mill. Chine. — Voisin de *insignis* Frm., prothorax non bordé, mais maculé de clair.

E. palawanus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, thorace externe vage pallido notato; antennis gracilibus, longe flabellatis; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato et marginato, antice externe impresso; elytris parum elongatis, postice paulo dilatatis, ad suturam striatis, minute sat dense punctatis. Long. 2 mill. Palawan. — Voisin de *minutus* Pic, moins large, avec le prothorax plus foncé et plus rétréci en avant.

Scirtes joloensis n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, mediocre parum dense punctatus, rufo-testaceus, membris pallidioribus. Long. 2 mill. Cameroun. — Voisin de *brunneiceps* Pic, plus étroit et de coloration plus claire.

S. major n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, supra rufus, capite, thorace medio antennisque pro parte piceis; capite minute et dense punctato; thorace valde transverso, minute pro parte sat dense punctato; elytris pro parte fortiter et disperse punctatis. Long. 5 mill. Cameroun. — Voisin de *Alluaudi* Pic, moins parallèle avec les élytres plus fortement et moins densément ponctués.

S. maximus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, luteo pubescens, mediocre sat sparse punctatus, rufus, antennis apice, tibiis aut tarsis pro parte femoribusque posticis apice nigris. Long. 6-6,5 mill. Abyssinie. — Vosin du précédent, plus grand, plus mat, pattes en partie foncées.

S. notatipennis n. sp. Subovatus, explanatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, elytris ad basin et ad suturam piceo notatis, post scutellum piceo sinuato-fasciatis; capite thoraceque diverse punctatis, elytris fortiter sat dense punctatis, tibiis posticis apice diverse spinosis. Long. 5 mill. Uganda. — A placer près de *explanatus* Pic.

S. atricolor n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, fere glaber, niger, capite thoraceque parum et fere indistincte punctatis; elytris minute et irregulariter punctatis. Long. 3,5 mill. Thibet. — Voisin de *Fouqueti* Pic par sa coloration, mais avant-corps moins ponctué et forme différente.

Artematopus robustus n. sp. Oblongus, nitidus, hir-

sutus, niger; capite sat dense punctato; thorace breve et lato, antice attenuato, lateraliter et antice fortiter marginato, irregulariter et sparse punctato; elytris sat fortiter striato-punctatis. Long. 9-10 mill. Equateur.
— A placer près de *4-maculatus* Pic.

A. rufithorax n. sp. Oblongo-elongatus, griseo pubescens et longe hirsutus, nitidus, rufus, elytris nigro-piceis; capite fortiter et sparse punctato, antennis sat elongatis, pilosis; thorace breve et lato, antice attenuato, paulo marginato, fortiter et sparse punctato; elytris fortiter striato-punctatis, intervallis convexis, parum punctatis. Long. 7 mill. Costa-Rica. — Peut se placer près de *elongatus* Guer.

A. robusticollis n. sp. Oblongo-subovatus, griseo pubescens, capite thoraceque dense punctatis, parum nitidis, elytris nitidis, niger, supra subæneus, pro parte rufescens, antennis, pedibus pro parte abdomineque rufis, elytris in disco antice et postice vagè rufo notatis, his sat brevibus, striatis, striis fortiter punctatis. Long. 6 mill. Costa-Rica. — Voisin de *Baeri* Pic, mais prothorax moins court, subconvexe et plus densément ponctué.

Ptilodactyla vittata v. nov. **invittata**. Elytris nigris, invittatis. Brésil.

P. lata n. sp. Sat brevis et latus, nitidus, supra glaber, minutissime punctatus, rufus, antennis et infra corpore pro parte piceis; thorace breve et lato, antice medio subarcuate prolongato, medio postice impresso, lateraliter paulo deplanato; elytris latis et brevibus, apice attenuatis, ad humeros impressis et ad suturam sulcatis, lateraliter paulo marginatis. Long. 6 mill. Bolivie. — A placer près de *Baeri* Pic, un peu plus foncé de coloration, ponctuation plus nette, etc.

**TABLE
POUR LE QUARANTE-SIXIÈME FASCICULE**

	Page
Nouveautés diverses	1