

*Niger, pilis nigris erectis, parce villosus, capite thoraceque parce punctatis, late rufis, hoc macula parva ad medium, margineque basali nigris, elytris seriatim grosse punctatis, pedibus rufis, antennis articulis 5-11 rufis, fusco-annulatis.*

M. Newman, (Entomologist, 1842, mai, p. 300), décrit deux espèces de *Phœa*, de Manille, qu'il appelle : *Dapsilis* et *Dilecta*. Ne les ayant pas vues en nature, je ne saurais dire s'ils appartiennent au groupe actuel.

### NOTE SYNONYMIQUE

SUR UN GENRE DU GROUPE DES TRAGOCÉPHALITES.

(*Cerambycides*.)

1<sup>er</sup> mai 1857.

Dans ma monographie des Tragocéphalites (Arch. Ent. vol. I, p. 34), j'ai créé un genre nouveau sous le nom de *Tragiscus*; mais ce nom ayant été déjà employé par Klug (Monastber d. Berl. Acad. 1855, p. 651) pour désigner une coupe générique de la famille des Scarabéïdes (tribu des Coprites, groupe des Onthophagites) voisines des *Eurysternus*, il convient de débaptiser mon genre. Je lui imposerai donc le nom de *Tragiscoschema*, de τραγισκος, petit bouc, et σκῆμα, figure.

---

J'ai eu tort de dire, dans ma Monographie des Cicindélides, vol. I, p. 11, que l'*Agrius fallaciosus* ♂ avait sept segments abdominaux; il n'en a réellement que six comme chez les *Manticora*.

---