

SYNOPSIS DES STIBARA

DE MA COLLECTION.

15 mai 1857.

STIBARA Hope.

Trans. of the Linn. Soc. 1841, vol. 18, p. 598.

Glenea Newman. Ent. 1842, p. 301 et suiv. (1).

Sphenura Chev. Rev. et Mag. de Zool., 1855, p. 288,

et Dej. Cat., 3^e édit., p. 376 (2).

Caractères génériques. Tête penchée en arrière. Yeux échancrés en dessus. Antennes de grosseur variable et de onze articles; le premier le plus gros, le troisième moins long que les deux suivants, les huit derniers obsolètement articulés. Prothorax plus long que large; saillie prosternale plate, très étroite; saillie mésosternale plate également, plus large antérieurement. Ecusson arrondi. Elytres coupées carrément à la base, dépassant le prothorax, ayant le plus souvent les épaules très aiguës, allongées, plus ou moins atténuées ou étroites en arrière; le plus souvent quadri-épineuses, et rarement arrondies ou coupées droit à l'extrémité. Cinq segments abdominaux, les premier et dernier les plus grands. Cuisses intermédiaires et postérieures plus ou moins arquées.

(1) Agassiz (*Nomenclator Zool. Col.*, d. 73) cite également le nom de *Glenea*, mais je ne sache pas que M. Newman ait donné une diagnose de ce genre.

(2) M. A. Chevrolat, loc. cit., a appliqué le nom de *Sphenura* Dej. aux espèces de l'Afrique occidentale.

I^{re} DIVISION. *Elytres non épineuses à l'extrémité.*

1. *Stibara Tetraspilota*. Assam. Hope, Trans. of the Linnean Soc., vol. 18, p. 598.
2. — *Morbillosa*. Inde. Fabr. Syst. Eleut. II, p. 319.
3. — *Trilineata*. Inde. Hope, Trans. of the Linnean Soc., vol. 18, p. 598.
4. — *Westermanni*. Natal. Dej. Cat., 3^e éd., p. 376.

5. STIBARA FORTUNEI Newman.

Trans. of the Ent. Soc. of London, New Series, vol. 2, 1852-53, p. 112.

Patrie : Schang-Haï. Long. 16 à 17 mill.; larg. 5 à 6 mill.

D'un vert pâle ou terne avec des taches noires.

Tête verdâtre, excepté le front qui est noir. Antennes noires, sauf la partie intérieure du premier article, et l'extrémité du troisième qui sont verdâtres. Prothorax de même couleur, ayant deux petites taches rondes au milieu. Ecusson et élytres verdâtres; sur ces dernières, deux grandes taches antérieurement, divisées au milieu par une bande verdâtre transversale souvent peu apparente; deux autres taches un peu moins grandes au tiers postérieur, n'atteignant point l'extrémité des élytres; ayant deux points verdâtres très petits près des bords latéraux. Poitrine et abdomen de même couleur que ceux-ci; une bande noire transversale sur les premiers segments abdominaux; une tache au milieu du cinquième et dernier. Pattes verdâtres maculées de noir.

II^e DIVISION. *Elytres quadriépineuses à l'extrémité.*

6. *Stibara Conspuncta*. Sylhet. Melly.
7. — *7-guttata*. Java. Dej. Cat. p. 376.
8. — *Signata*. Java. Dej. Cat. p. 376.
9. — *Torquata*. Sylhet. Melly.
10. — *Jucunda*. Sénégal. Dej. Cat. p. 376.

11. STIBARA INDIANA Thomson.

Patrie : Inde. Long. 15 mill.; larg. 4 à 5 mill.

Noire, avec des taches d'un jaune clair ou pâle. Antennes noires.

Deux taches longitudinales entre les yeux, et une troisième enveloppant la base du prothorax. Deux bandes transversales obliques vers le tiers postérieur des élytres, et deux taches d'un vert très obscur à leur extrémité. Deux taches sur les bords latéraux de la poitrine; troisième et quatrième segments abdominaux jaunâtres; les autres grisâtres au milieu, ainsi que les pattes.

Tête et prothorax ponctués. Elytres criblées de trous enfoncés. Dessous du corps et pattes lisses.

12. STIBARA S.-MARLE Thomson.

Patrie : Sylhet. Long. 17 mill.; larg. 5 mill.

D'un jaune clair ou blanchâtre avec des taches et des bandes brunes. Antennes et pattes d'un brun clair.

Tête, prothorax et écusson recouverts d'une pubescence d'un jaune blanchâtre; un point noir près de la base du prothorax. Elytres recouvertes en partie de la même pubescence, sauf sur les bords latéraux; quatre bandes sur chaque élytre; première paire oblique; seconde rejoignant la suture; les deux dernières paires formant en quelque sorte deux cercles. Dessous du corps varié de brun, et pubescent également.

13. STIBARA FUNERULA Thomson

Patrie : India. Long. 13 mill.; larg. 4 mill.

D'un noir mat. Antennes de même couleur. Une bande blanchâtre à la base du prothorax; deux taches de même couleur

un peu après le milieu des élytres et deux points blancs à leur extrémité. Dessous du corps varié de blanc. Pattes brunâtres.

Front ponctué. Prothorax et élytres lisses, sauf les épaules et les bords latéraux, où l'on observe quelques points enfoncés; épaules très acuminées; élytres très atténuées vers l'extrémité. Pattes lisses.

14. STIBARA CAPRICIOSA Thomson.

Patrie : Inde. Long. 13 mill. ; larg. 4 mill.

D'un brun foncé rougeâtre avec des taches jaunâtres sur les élytres. Antennes et pattes brunes.

Une tache blanche à la base du prothorax. Ecusson blanc. Dix taches sur les élytres, dont six au tiers antérieur, disposées en hexagone; deux premières, les plus grandes, vers le tiers postérieur, et deux autres, plus petites, vers l'extrémité. Six taches blanches disposées par paires, sous les épaules, sur la poitrine, et sur les bords latéraux du troisième segment abdominal.

Tête et prothorax très fortement ponctué. Elytres criblées de points enfoncés, moins prononcés postérieurement. Dessous du corps et pattes lisses.

15. STIBARA ANTICEPUNCTATA Thomson.

Patrie : Java. Long. 12 mill. ; larg. 4 mill.

Tête, dessous du corps, et partie réfléchie des élytres d'un gris obscur. Antennes noires. Une bande d'un jaune clair partant du front, et traversant le prothorax jusqu'à l'écusson. Prothorax noir. Ecusson jaune. Partie antérieure des élytres d'un brun rougeâtre; deux petites bandes jaunes transversales un peu avant le milieu de leur longueur; tout le reste noir, sauf

deux taches rondes jaunâtres à l'extrémité. Pattes d'un brun clair.

Prothorax ponctué. Partie antérieure des élytres criblée de points enfoncés; celles-ci un peu atténuées vers l'extrémité.

16. STIBARA OBSOLETEPUNCTATA Thomson.

Patrie : Inde. Long. 12 mill.; larg. 4 mill.

Diffère de la *S. anticepunctata* par les caractères suivants :

Tête et prothorax entièrement noirs. Elytres obsolètement ponctuées antérieurement. Taches submédianes des élytres remontant supérieurement vers les bords latéraux. Prothorax plus étroit et plus allongé.

17. STIBARA OUDETERA Thomson.

Patrie : Borneo. Long. 13 à 14 mill. ; larg. 4 à 5 mill.

Diffère de la *S. anticepunctata* par les caractères ci-après :

Une bande d'un blanc éclatant entourant la base et la partie inférieure du prothorax. Partie postérieure des élytres d'un brun métallique brillant. Deux taches blanches sur les propleures; métathorax de même couleur. Les quatre premiers segments abdominaux d'un blanc éclatant sur les bords, brunâtres au milieu; dernier segment d'un brun foncé rougeâtre.

Elytres avec des points enfoncés très espacés antérieurement; à peine atténuées vers l'extrémité.

18. STIBARA ARITHMETICA Thomson.

Patrie : Ceylan. Long. 13 mill. ; larg. 4 mill.

Noire. Tête d'un jaune obscur entre les yeux. Deux petits traits blanchâtres sur le front. Deux bandes blanches mal limitées partant des joues et longeant le corps entier; une autre bande

blanche bien limitée traversant le prothorax longitudinalement. Ecusson de même couleur, ainsi que la suture des élytres. Pattes grises.

Front ponctué. Prothorax lisse. Elytres criblées de gros points enfoncés. Pattes lisses.

19. STIBARA ALGEBRAICA Thomson.

Patrie : Java et Borneo. Long. 14 mill. ; larg. 4 mill.

Très voisine de la *S. arithmetica*, dont elle diffère par les caractères suivants :

Une seule bande sur le front. Celles du prothorax et des élytres plus larges, d'un jaune fauve; deux autres bandes très minces vers les bords latéraux. Abdomen varié de jaune fauve. Pattes brunes.

Extrémité des élytres plus échancrée.

20. STIBARA MATHEMATICA Thomson.

Patrie : Singapore. Long. 10 mill. ; larg. 2 à 3 mill.

Diffère de la *C. algebraica* par les caractères ci-après :

Tête bordée de blanc antérieurement et latéralement; deux traits de même couleur sur le front; yeux bordés de blanc. Trois bandes longitudinales de même couleur sur le prothorax, dont une au milieu, et deux latérales. Des taches brunes sur la poitrine et sur l'abdomen.

Ponctuation des élytres moins forte.

21. STIBARA ILLUMINATA Thomson.

Patrie : Singapore. Long. 13 mill. ; larg. 4 mill.

D'un noir mat en dessus, avec des lignes longitudinales d'un bleu terne ou grisâtre; dessous du corps et pattes d'un gris clair.

Même dessin sur la tête que chez la *S. mathematica*, mais moins distinct. Une ligne longitudinale au milieu du prothorax. Cinq lignes longitudinales également sur les élytres.

Prothorax à peine ponctué. Elytres très ponctuées. Deux taches noires sur les bords latéraux du premier segment abdominal.

22. *STIBARA ANA* Thomson.

Patrie : Java. Long. 11 à 12 mill. ; larg. 4 mill.

Entièrement brune et sans taches en dessus ; quelques taches blanchâtres en dessous.

Tête et prothorax ponctués. Elytres criblées de gros points enfoncés, la ponctuation diminuant beaucoup vers l'extrémité. Dessous du corps et pattes lisses.

23. *STIBARA OBESA* Thomson.

Patrie : Sylhet. Long. 12 mill. ; larg. 5 mill.

Courte et trapue comparativement aux autres espèces. Voisine de la *S. Angerona* Buq. in Dej. Cat.

Tête d'un jaune sale, avec deux traits de même couleur sur le front. Prothorax et antennes d'un brun fauve avec une ligne jaunâtre au milieu, et des pubescences de même couleur sur les côtés. Elytres d'un brun clair ; on aperçoit vers l'extrémité deux taches obliques d'un jaune sale entourées d'une auréole noirâtre. Dessous du corps et pattes bruns variés de gris.

Prothorax lisse. Quelques points enfoncés sur la partie antérieure des élytres.

24. *STIBARA ARGUS* Thomson.

Patrie : Inde. Long. 12 mill. ; larg. 4 mill.

Antennes, tête et prothorax, noirs ; les deux derniers variés de

fauve sur les bords latéraux. Ecusson noir. Une tache de même couleur à chaque épaule. Elytres d'un brun clair, jaunâtres vers la suture, avec huit taches noires disposées par paires. Poitrine et abdomen noirs, les segments abdominaux bordés de blanc. Pattes d'un brun clair.

Tête et prothorax ponctués. Elytres avec de gros points enfoncés antérieurement, et assez espacés.

25. *STIBARA SANGUINARIA* Thomson.

Patrie : Java. Long. 10 à 12 mill. ; larg. 4 mill.

En dessus, d'un rouge de brique terne ; en dessous, brun varié de blanc. Deux raies blanchâtres partant du labre et aboutissant au prothorax ; joues blanches ; deux bandes de même couleur sur les bords latéraux inférieurs du prothorax ; quatre bandes sur la poitrine. Antennes noires. Pattes brunâtres.

Prothorax très finement ponctué. Elytres assez fortement ponctuées.

26. *STIBARA CARINATA* Thomson.

Patrie : Java. Long. 13 mill. ; larg. 4 mill.

D'un rouge de brique sans taches. Dessous du corps, pattes et antennes noirs.

Quatre points noirâtres très obsolètes enfoncés sur le prothorax, qui est lisse ainsi que la tête. Cinq carènes élevées, très fortes, sur chaque élytre ; les espaces qui les séparent ont des séries de points disposés longitudinalement. Dessous du corps et pattes lisses.

27. *STIBARA COSMOPOLITA* Thomson.

Patrie : Inde, Sylhet, Manille. Long. 15 à 16 mill. ; larg. 4 à 5 mill.

D'un brun plus ou moins foncé ou clair, sauf les antennes et

l'extrémité des élytres qui sont noires. Tibias postérieurs noirâtres.

Tête et prothorax lisses. Quelques carènes longitudinales obsoletes ou peu distinctes sur les élytres; ponctuation assez espacée. Dessous du corps et pattes lisses.

28. *Stibara bidentata*. Guinée. Fabr. Syst. Eleut. II, p. 325, 42.

29. *STIBARA ANNULATA* Thomson.

Patrie : Inde boréale. Long. 10 mill. ; larg. 3 mill.

Tête et prothorax d'un testacé fauve. Les trois premiers articles des antennes noirs, les autres brunâtres et bordés de noir à l'extrémité. Dessous du corps grisâtre. Pattes d'un brun clair.

Tête et prothorax faiblement ponctués. Elytres couvertes de séries de points longitudinaux jusque vers le tiers postérieur. Dessous du corps et pattes lisses.

30. *STIBARA BICOLOR* Thomson.

Patrie : Inde. Long. 8 à 10 mill. ; larg. 2 à 3 mill.

D'un testacé fauve jusque vers le milieu des élytres, qui alors deviennent noirâtres. Antennes comme chez la *S. annulata*. Segments abdominaux grisâtres au milieu.

Tête et prothorax finement pointillés. Partie antérieure des élytres criblée de gros points enfoncés; partie postérieure presque lisse, ainsi que le dessous du corps et les pattes.
