

trouvent les épines latérales; tantôt ayant, tantôt n'ayant pas de ligne médiane; faiblement pointillé au milieu; ponctué latéralement. Ecusson assez large, arrondi. Elytres plus brusquement déprimées en dessus, et moins atténuées latéralement vers l'extrémité que chez le *D. Pallasii*; finement pointillées; la ponctuation devenant beaucoup plus forte sur les bords latéraux antérieurs. Dessous du corps et pattes finement et obsolètement pointillés.

Dédié à M. Léon Fairmaire, entomologiste distingué et l'un des auteurs de la *Faune entomologique française*.

---

#### NOTE SYNONYMIQUE

SUR

#### UN GENRE DU GROUPE DES TETRAOPHTHALMITES.

Mon genre *Lamprocleptes* (Arch. Ent. p. 64) ainsi que celui d'*Onchoderes* de M. A. Chevrolat (Cat. Dej., 3<sup>e</sup> édit., p. 377) sont identiques avec les *Phœa* de M. Newman; or, ce dernier genre ayant la priorité, les deux premiers doivent disparaître nécessairement.

---

#### MÉLANGES ET NOUVELLES.

M. Henri-Célestin Deyrolle, envoyé au Gabon l'année dernière, par MM. le comte de Mnischek et James Thomson, dans le but d'explorer la faune entomologique de ce pays, vient de revenir à Paris avec une belle récolte d'insectes. M. Thomson se propose de publier incessamment, dans les *Archives*, la relation de ce voyage.

---