

Osservazioni - Specie diffusa in gran parte dell'Europa, presente anche in alcune isole dell'arcipelago delle Canarie e in poche stazioni dell'Africa nord-occidentale. Per l'Italia era not adì Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, Lucania e Calabria (CANZONERI, 1981, *Lavori Soc. ven. Sci. nat.*, 6: 86).

188 - **Iphthiminus italicus** ssp. **italicus** (Truqui, 1857) (Coleoptera Tenebrionidae)

GRIDELLI, 1950, *Mem. Biogeogr. adriat.*, 1: 176; SPILMAN, 1973, *Proceed. ent. Soc. Wash.*, 75 (1): 39.

Nuove stazioni del Lazio, Puglia e Sicilia e prima segnalazione per la Basilicata di specie mediterranea centro-orientale.

Reperti - Lazio: Tenuta di Capocotta (RM), II.1968, leg. S. Bruschi 2 es. (coll. Autore); Puglia: M. Sacro (Gargano), VI.1979, leg. R. Sama 1 es. (coll. Autore); Basilicata: Pietra Pertosa (PZ), m 1000, I.VI.1980, leg. F. Montemurro 1 es. (coll. Autore); Sicilia: San Fratello (ME), 9.VII.1983, leg. V. Aliquò 1 es. (coll. Autore); id., Caronia (ME), 8.XII.1972, leg. Romano 2 es. (coll. Autore); id., Nebrodi, Portella di Femmina Morta, m 1400 - 1600, 18 IV.1971, leg. R. Mignani 3 es. (coll. Autore, coll. Meloni); id., Madonie, Piano Battaglia, m 1600, 31.III.1970, 3.V.1973, leg. V. Aliquò 3 es. (coll. Autore, coll. Meloni); id., Madonie, Piano Zucchi, 8.VI.1975, leg. V. Aliquò 1 es. (coll. Meloni).

Osservazioni - La specie sensu lato è presente, oltre che in Italia, in Jugoslavia, Albania, Grecia, Creta, Cipro, Asia Minore e Siria. La ssp. *italicus*, endemica italiana, era nota di poche località di Toscana e Arcipelago Toscano (Is. Montecristo), Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Corsica (GRIDELLI, l.c.; GARDINI, 1975, *Lavori Soc. ital. Biogeogr.*, 5: 61); indicata da LUIGIONI (1929, *Cat. Col. Ital.*: 727) e da PORTA (1934, *Fn. Col. Ital.*, 4: 152) anche per il Piemonte.

P. LEO

(Via Tola 21, 09128 Cagliari)

189 - **Brachyta interrogationis** (Linneo, 1758) (Coleoptera Cerambycidae)

VILLIERS, 1978, *Fn. Col. France*, 1: 107; SAMA, 1988, *Fauna d'Italia*, 26: 117.

Prima segnalazione per il Veneto di specie euroasiatica.

Reperti - Veneto, Cortina d'Ampezzo (BL), gruppo delle Cinque Torri, m 2255, 20. VII.1988, A. Zonta leg. 1 es. (coll. Autore). Su ombrellifera in prato.

Osservazioni - Specie sinora nota di tutta la regione alpina, con eccezione del Veneto e della Venezia Giulia (SAMA, l.c.).

A. ZONTA

(Via S. Stefano 1, 36061 Bassano del Grappa - VI)

190 - **Phoracantha semipunctata** (Fabricius, 1775) (Coleoptera Cerambycidae)

SAMA, 1988, *Fauna d'Italia*, 26: 71.

Seconda segnalazione per la Corsica di specie australiana già nota dell'Italia centro-meridionale e insulare.

Reperti - Corsica, Bastia, rive dello Stagno di Biguglia, 3.VIII.1989, F. Vitali leg. 3 es. (coll. Autore). Già morti su ceppo di *Eucalyptus* sp.

Osservazioni - Specie australiana diffusasi un po' ovunque; nota per l'Italia di Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Di Corsica era noto un unico esemplare di Ajaccio (OROUSSET, 1984, *Nouv. Rev. entom.* (n.s.), 1 (3): 322; SAMA, l.c.).

(Via Roma 7, 16121 Genova)

F. VITALI