

282 - **Saperda scalaris** (Linneo, 1758) (Coleoptera Cerambycidae)

SAMA, 1988, Fauna d'Italia, 26: 160.

Prima segnalazione per le Marche.

Reperti - Pioraco (MC) 3.VII.1994; 11.VII.1994 (in coll. autore).*Osservazioni* - Esemplari su tronco morto di noce nelle ore tardo-pomeridiane.

A. STROCCHI

(via A. De Gasperi 89, 60027 Osimo - AN)

283 - **Alosterna tabacicolor** (DeGeer 1777) (Coleoptera Cerambycidae)

SAMA, 1988 - Fauna d'Italia, 25: 29.

Prima segnalazione per la Liguria.

Reperti - Sassello: Palo (SV) 1.VI.1988 F. Vitali leg. 1 ♂, Vara inferiore (SV) 13.VI.1993 F. Vitali leg. 1 ♀, (coll. autore).*Osservazioni* - Specie euro-siribica montana nota di tutta Italia tranne Liguria, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. (SAMA, l. c.).284 - **Callimellum angulatum** (Schrank 1789) (Coleoptera Cerambycidae)

SAMA, 1988 - Fauna d'Italia, 25: 81.

Prima segnalazione per la Liguria.

Reperti - Sassello: Palo (SV) 4.VI.1988 F. & A. Vitali leg. 3 ♂♂, id. 1.VI.1991 F. & A. Vitali 2 ♂♂, su fiori di rovo (coll. autore).*Osservazioni* - Specie mediterranea, in Italia sporadica e segnalata di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Sicilia. (SAMA, l. c.).285 - **Molorchus minor** (Fabricius 1792) (Coleoptera Cerambycidae)

PORTA, 1934 - Fauna Col. Ital., IV: 187.

SAMA, 1988 - Fauna d'Italia, 25: 75.

ANGELINI, 1991 - Mem. Soc. ent. ital., 70 (1): 227.

Prima segnalazione per la Liguria.

Reperti - Colle del Melogno (SV) 16.VI.1994 F. Vitali leg. 1 ♂ su infiorescenze di *Spyraea* sp. (coll. autore).*Osservazioni* - Specie euro-anatolico-siribica, legata a boschi altitudinali di conifere. Nota in Italia di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata. (SAMA, l. c.), Calabria (ANGELINI, l. c.). Citata da PORTA (l. c.) anche di Toscana.286 - **Obrium brunneum** (Fabricius 1792) (Coleoptera Cerambycidae)

PORTA, 1934 - Fauna Col. Ital., IV: 190.

SAMA, 1988 - Fauna d'Italia, 25: 85.

ANGELINI, 1991 - Mem. Soc. ent. ital., 70 (1): 227.

Specie citata da PORTA (l. c.) per la Liguria e mai più risegnalata.

Reperti - Colle del Melogno (SV) 16.VI.1994 F. Vitali leg. 3 ♂♂ 3 ♀♀, su infiorescenze di *Spyraea* sp. (coll. autore).*Osservazioni* - specie euro-irano-anatolica, legata a boschi altitudinali di conifere, discende sino alla Calabria seguendo le stazioni relitte di *Abies alba*. Certa in Italia di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Basilicata (SAMA, l. c.), Calabria (ANGELINI, l. c.).

287 - **Ropalopus insubricus** (Germar 1824) (Coleoptera Cerambycidae)

SAMA, 1988 - Fauna d'Italia, 25: 99.

Interessante reperto già noto di Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Reperti - Ormea città (CN) 16.VI.1988 F. Vitali leg. 1 ♀.

Osservazioni - Rara specie montana a distribuzione sud europea-maghrebina. Già nota delle Alpi Graie, Cozie e Marittime (Terme di Valdieri) (SAMA, l. c.).

F. VITALI

(via Roma 7/12, 16121 Genova)

288 - **Dryops similis** Bollow, 1936 (Coleoptera Dryopidae)

MASCAGNI & CALAMANDREI, 1992, Redia 75 (1): 128.

Prima segnalazione per il Veneto, il Molise e la Puglia.

Reperti - Veneto: Mira, Marano (VE), 13.VIII.1960, Rosa leg., 2 exx. (in coll. Angelini e in coll. Mascagni). Molise: Zittola, Montenero v. (IS), 7.VI.1990, 1 ex. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila), 2, 6 & 11.V.1991, Fiordigigli & Osella leg., 8 exx. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila e in coll. Mascagni), Zittola (IS), 7.VI.1990, Osella leg., 2 exx. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila e in coll. Mascagni). Puglia: Riserva Le Cesine WWF, S. Cataldo (LE), VIII.1982, Angelini leg., 1 ex. (in coll. Angelini).

Osservazioni - La specie è nota di Piemonte, Lombardia, Trentino e Alto Adige, Emilia e Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzi, Basilicata, Sardegna (MASCAGNI & CALAMANDREI, l.c.). È specie di palude e vive tra la vegetazione di riva.

289 - **Elmis aenea** (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera Elmidae)

MASCAGNI & CALAMANDREI, 1992, Redia 75 (1): 130.

Seconda segnalazione per l'Abruzzo.

Reperti - Abruzzo: fiume Tirino, Capestrano (AQ), 1.XI.1993, Osella leg., 1 ex. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila), Carpineto di Nora 900 m, Gran Sasso (AQ), 29.X.1993, Osella leg., 3 exx. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila e in coll. Mascagni), fiume Sangro, Camosciara (AQ), 8.X.1993, Pannunzio leg., 11 ex. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila e in coll. Mascagni), sorgenti fiume Vera, Tempera (AQ), 8.XII.1993, Osella leg., 60 exx. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila e in coll. Mascagni), Popoli (PE), 11.XII.1993, Osella leg., 26 exx. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila e in coll. Mascagni), torrente Nora, S.Bartolomeo (PE), 29.X.1993, Pannunzio & Osella leg., 9 exx. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila e in coll. Mascagni), torrente Nora, Valle S.Giovanni (PE), 29.X.1993, Pannunzio leg., 7 exx. (in coll. Dip. di Sc. Ambient. Univ. L'Aquila e in coll. Mascagni).

Osservazioni - La specie è nota di Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Calabria (MASCAGNI & CALAMANDREI, l.c.), Abruzzo (BALDARI, AUDISIO & BELFIORE, 1980, Atti XII Congr. Naz. Ital. Entomol., Roma, 2: 139-153) la specie è nota solo della provincia di Teramo, fiume Tordino. La specie vive nei corsi d'acqua di pianura, collina e montagna sotto pietre e tra i muschi.

290 - **Elmis maugetii** Latreille, 1798 (Coleoptera Elmidae)

MASCAGNI & CALAMANDREI, 1992, Redia 75 (1): 129.

Prima segnalazione per l'Umbria e seconda segnalazione per l'Abruzzo.

Reperti - Umbria: fiume Menodre 750 m, Sellano (PG), 7.VI.1975, Angelini leg., 6 exx. (in coll. Angelini e in coll. Mascagni), Gualdo Tadino (PG) 700m, 8.VI.1975, Angelini leg., 7 exx. (in coll. Angelini e in coll. Mascagni). Abruzzo: Opi (AQ) 1000 m, 12.VIII.1980, Rosa leg., 2 exx. (in