

Synonymisierung von *Graecoeme eggeri* ADLBAUER, 2006 (Coleoptera: Cerambycidae)

K. ADLBAUER

Abstract

Graecoeme eggeri ADLBAUER, 2006 is recognized as a subjective junior synonym of *Penichroa fasciata* (STEPHENS, 1831).

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, *Graecoeme eggeri*, *Penichroa fasciata*, new synonymy.

Penichroa fasciata (STEPHENS, 1831)

Graecoeme eggeri ADLBAUER, 2006 – **syn.n.**

Das jüngst beschriebene Taxon *Graecoeme eggeri* ADLBAUER, 2006 ist ein jüngeres subjektives Synonym von *Penichroa fasciata* (STEPHENS, 1831). Der Holotypus von *G. eggeri* ist ein relativ kleines, einfarbig dunkelbraunes Weibchen (ADLBAUER 2006).

Penichroa fasciata ist 6–15 mm lang. Dieser nachtaktive, sehr agile Bockkäfer entwickelt sich polyphag in trockenen Ästen und dünneren Stämmchen von Laubgehölzen, seltener auch von Koniferen. Die Art ist zirkummediterran-zentralasiatisch verbreitet.

In Mitteleuropa kommt *P. fasciata* nur in der Schweiz vor (SLAMA 2006). In Frankreich reicht das Areal dieser Spezies relativ weit nach Norden (BENSE 1995). Nach Osten zu reicht das Verbreitungsgebiet bis Turkmenien und Tadschikistan (VILLIERS 1978, SAMA 2002, DANILEVSKY 2003). Auch nach Nordamerika wurde *P. fasciata* eingeschleppt (LINSLEY 1962).

Typischerweise ist *P. fasciata* braun gefärbt mit einer weißlichgelben Querbinde vor der Mitte der Elytren, die an der Suture etwas verschmälert oder ganz unterbrochen ist, einem hellen Schulterfleckchen und einem ebensolchen hellen Apikalfleck. Die Zeichnungsausprägung ist aber in hohem Grad variabel. Die Mittelbinde kann zu je einem Fleck reduziert sein. Im Extremfall kann die helle Zeichnung völlig fehlen (VILLIERS 1978, PESARINI & SABBADINI 1994). Die völlig dunkle, einfarbige Form ist als var. *lugubris* RAGUSA, 1884 beschrieben worden.

Danksagung

Herrn Dr. Andrea Sabbadini, Milano, danke ich herzlich für den Hinweis auf diese Synonymie.

Literatur

- ADLBAUER, K. 2006: *Graecoeme eggeri* gen.n., sp.n. – der erste Vertreter der Oemini aus Europa (Coleoptera: Cerambycidae). – Koleopterologische Rundschau 76: 379–382.
- BENSE, U. 1995: Bockkäfer. Illustrierter Schlüssel zu den Cerambyciden und Vesperiden Europas. – Weikersheim: Margraf, 512 pp.

- DANILEVSKY, M.L. 2004: Systematic list of longicorn beetles (Cerambycoidea, Coleoptera) of the territory of the former USSR. – http://www.uochb.cas.cz/~natur/cerambyx/list_ussr.htm.
- LINSLEY, E.G. 1962: The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and Classification of the Subfamily Cerambycinae, Tribes Opsimini through Megaderini. – Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 188 pp.
- PESARINI, C. & SABBADINI, A. 1994: Insetti della Fauna Europea. Coleotteri Cerambicidi. – *Natura, Rivista di Scienze Naturali* 85 (1/2): 1–132.
- SAMA, G. 2002: Atlas of the Cerambycidae of Europe and the Mediterranean Area, Volume 1: Northern, Western, Central and Eastern Europe; British Isles and Continental Europe from France (excl. Corsica) to Scandinavia and Urals. – Zlin: Kabourek, 173 pp., 729 Abb.
- SLAMA, M. 2006: Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera Cerambycidae. – *Folia Heyrovskyana* 4: 1–40.
- VILLIERS, A. 1978: Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. – Paris: Lechevalier, 607 pp.

Dr. Karl ADLBAUER

Landesmuseum Joanneum, Zoologie, Raubergasse 10, A – 8010 Graz, Österreich