

Description d'un Longicorne inédit de Bolivie [Col.]

Par le R. P. BELON.

Sans parler des caractères nombreux énumérés par la formule de Lacordaire [*Genera* VIII, 360], le groupe des O브리онидес est « reconnaissable à la longueur et à l'étroitesse du prothorax, à la grandeur du premier segment abdominal, et au faciès particulier de ses espèces ». Tout en s'y rattachant à plus d'un titre, l'insecte de Bolivie dont je publie la description diffère assez des *Obrionum* et genres voisins, principalement par sa structure ventrale, pour rendre nécessaire l'établissement d'une nouvelle coupe.

Anobrium, nov. gen.

Corpus supra et subtus longioribus pilis setulisque paulo brevioribus intermixtis serialim hirtum. — *Caput thorace latius, intra antennis haud concavum; palpi maxillares labialibus longiores, ultimo articulo elongato rix fusiformi, apice subacuminato; genae exiguae; frons subverticalis, convexiuscula, arcuatim emarginata et ab epistomate discreta; tubera antennifera parum prominula, basi haud contigua sed satis remota, apice integro, cotylis tamen insertis.* — *Oruli prominentes, grosse granulati, fortiter emarginati; lobis inferioribus rotundatis, antice tubera paulo excedentibus; superius sat latis pone tubera productis, ibique parum inter se distantibus.* — *Antennae setaceae, corpore breviores ($\frac{3}{4}$), tam extus quam intus longioribus et minus elongatis pilis intermixtis, densioribus quidem sub quinque prioribus articulis, minus dense sub reliquis fimbriatae; scapo elongato, ad basin gracili, obconico, grosse punctato; 2° exiguo, sed saltem aequo longo ac lato; 3° circiter scapum aequante; 4° ad 10° sensim decrescentibus; 11° acuminato.* — *Thorax elongatus, cylindricus, elytris valde angustior, spina parva post medium laterum instructus.* — *Elytra thorace capiteque simul sumptis duplo longiora, fere parallela, convexiuscula, pone scutellum oratim et juxta suturam anguste depressa.* — *Coxae anticae globosae, rix prominentes, prosterno angusto separatae, extus haud angulatae, acetabulis retro clausis; coxae intermediae mesosterno declivi paulo minus angusto separatae, acetabulis extus clausis.* — *Femora clarata, postica elytris valde breviora, 3° ventris segmentum in $\frac{1}{4}$, 2° in $\frac{1}{4}$, rix excedentia; tibiae haud graciles, longius parce villosae, praetereaque dorso intermediarum densius breviter fimbriato; tarsorum articulus primus 2° et 3° simul sumptis, vel quarto subaequalis;*

anguliculis divergentibus. — Segmentum centrale primum longius, duobus subsequenteribus aequale; quintum, in ♂ vix praecedente longius, apice subarcuatum emarginato, in ♀ quarta evidenter longius, in medio longitudinali subsulcatum, versus apicem magis depressum angulatimque emarginatum.

Anobrium Oberthüri, n. sp. — Nitidulum, longe villosum, rufotestaceum, capite tamen necnon antennarum scapo thoraceque nigris; oculis rufescentibus. Frons punctata, punctis aliquot fortioribus inter lobos oculorum supernos approximatis et pone ipsos subseriatim retro divergentibus; clypeo occipiteque laevibus. Thorax fortiter rugose punctatus, ante basin in medio lineola tenui usque ad trientem longitudinis producta et utrinque macula pariter pubescente punctiformi signatus. Elytra basi fortius, versus apicem obsolete, punctata. Metasternum (quandoque infuscatum) et ventris segmenta sparsim punctulata. — Long. 6,5-7,5 mill.

Bolivie. — Une série d'exemplaires dans les collections de M. Argod et de M. René Oberthür.

Je suis heureux de remercier, en lui dédiant cette espèce, notre distingué collègue qui a bien voulu me communiquer des types précieux et me fournir des renseignements de très grande valeur pour mon étude sur les Longicornes de Bolivie.

Diagnoses d'Hétéromères recueillis par M. Charles Alluaud à Madagascar [COL.]

PAR MAURICE PIC.

Scraptia (Canifa subparallela, n. sp. — *Elongata, subdepressa, nitida, griseo-pilosa, testacea; capite rufescente, oculis nigris; antennis satis validis, corporis medium superantibus; thorace transverso, clytris paulum angustiore, antice subarcuato, in medio et postice sulcatulo, ad basin et lateraliter impresso; scutello mediocre; clytris subparallelis, sat fortiter punctatis, apice subrotundatis, sutura basi leviter depressa; pedibus mediocribus.* — Long. 2 mill.

Majunga (coll. Alluaud et Pic).

Paraît voisin de *S. anaspina* Fairm. (Ann. Belg., 1898, p. 239), d'après la description.