Monitore Zoologico Italiano

ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY

PUBBLICATO DALLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

N. S. SUPPLEMENTO IV | 30 . 10 . 1972 | NO. 11 : 247-294

COLÉOPTÈRES CERAMBYCIDAE DE L'AFRIQUE ORIENTALE

(PUBBLICAZIONI DEL CENTRO DI STUDIO PER LA FAUNISTICA ED ECOLOGIA TROPICALI DEL C.N.R.: LXIII)

S. BREUNING et A. VILLIERS

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

Reçu le 5 janvier 1972

I. Introduction . . . . . page 247
II. Liste des espèces . . . . . » 248
A. Sous-Famille Prioninae . . . . . » 248
B. Sous-Famille Aseminae . . . . . » 250
C. Sous-Famille Cerambycinae . . . . . » 250
D. Sous-Famille Lamiinae . . . . . » 256
III. Description des espèces nouvelles . . . . . » 273
A. Sous-Famille Aseminae . . . . . » 273
B. Sous-Famille Cerambycinae . . . . . » 274
C. Sous-Famille Lamiinae . . . . . » 283
IV. Liste des localités . . . . . » 291
Summary . . . . . » 294
Riassunto . . . . . » 294

I. INTRODUCTION

L'importante collection de Cérambycidés d'Afrique orientale qui nous a été communiquée par le « Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del Consiglio Nazionale delle Ricerche », est intéressante à divers titres: d'une part elle constitue un ensemble d'Insectes provenant de localités précises, ce qui est rare dans les récoltes anciennes et, d'autre part, elle comprende 13 espèces nouvelles et 2 genres nouveaux.

Nous sommes heureux d'adresser ici nos plus vifs remerciements: à Monsieur le Prof. L. Pardi, Directeur de l'Istituto di Zoologia dell'Univer-

sità di Firenze et du Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del C.N.R., qui a bien voulu nous confier l'étude du matériel étudié ici; à Monsieur le Prof. B. Lanza, Directeur du Museo Zoologico dell'Università di Firenze; à Monsieur A. Martelli pour la révision du manuscrit et le classement du matériel; à nos collègues E.A.J. Duffy et R.M. Quentin qui ont bien voulu examiner pour nous diverses espèces critiques.

Le matériel étudié provient des récoltes de Messieurs: Dr. R. Amoroso, Prof. F. Bigi, Prof. L. Cipriani, Prof. L. Dallai, E. Esposito, E. Faà di Bruno, U. Fiechter, Dr. U. Funaioli, Prof. G. Paoli, Dr. Mordini, A. Sammicheli, mais surtout par les Expeditions Biologiques en Somalie.

Abréviations:

S.B.S. = Spedizione Biologica in Somalia del Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del C.N.R.;

S.B.E. = Spedizione Biologica in Etiopia del Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del C.N.R.;

M.N.H.N. = Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris;

M.F. = Museo Zoologico dell'Università di Firenze.

II. LISTE DES ESPÈCES

A. Sous-Famille PRIONINAE

Tribu Macrotomini

Macrotoma palmata Fabricius.

Répartition géographique: Sahara central et méridional, Égypte, toute l'Afrique au Sud du Sahara.

Spécimens étudiés:

Afgoi (Somalie); 1 ex. n. 254 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959.

Alessandra (Somalie); 1 ex. n. 412 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Baidoa (Somalie); 1 ex. n. 259 M.F., leg. G. Paoli, X.1931.

Giohar (Somalie); 2 ex. n. 256 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968; 1 ex. n. 256 M.F., leg. S.B.S., 25.IV.1968; 1 ex. n. 258 M.F., leg. G. Paoli, IV-V.1926.

Javello (Éthiopie); 3 ex. n. 410 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI.1938-1.III.1939.

Lugh (Somalie); 2 ex. n. 260 M.F., leg. G. Paoli, 26.X.1913.

Moweka Moshi Diotz, m 1530 (Tanzanie); 1 ex. n. 460 M.F., leg. U. Funaioli, 13.XI.1967-III.1968.

Neghelli (Éthiopie); 1 ex. n. 411 M.F., leg. L. Cipriani, 4.III.1939.

Tsavo National Park, West (Kénya); 1 ex. n. 261 M.F., leg. U. Funaioli, 17-24.IV.1968.

Tribu Prionini

Tithoes confinis Castelnau.

Répartition géographique: Afrique, au Sud du Sahara, dans les zones sahélienne et soudanienne.

Spécimens étudiés:

Afgoi (Somalie); 1 ex. n. 250 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959.

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 249 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 28.IV.1968.

Camp Awash, Awash National Park (Éthiopie); 2 ex. n. 518 M.F., leg. M.L. Azzaroli, B. Lanza et E. Granchi (S.B.E.), IV.1971.

Giohar (Somalie); 1 ex. M.N.H.N., leg. G. Paoli, VIII.1916.

Lugh (Somalie); 1 ex. n. 251 M.F., leg. G. Paoli, 25.XI.1913.

Setit (Éthiopie); 1 ex. n. 514 M.F., *donavit* E.H. Giglioli, 15.VIII. 1907.

Tithoes maculatus Fabricius.

Répartition géographique: Afrique intertropicale.

Spécimens étudiés: Mweka Moshi Diotz, m 1530 (Tanzanie); 1 ex. n. 253 M.F., leg. U. Funaioli, XI.1967-III.1968; 1 ex. n. 462 M.F., leg. U. Funaioli, XI.1967-III.1968.

Acanthophorus arabicus Thomson.

Répartition géographique: Arabie, Sahara central et méridional; espèce nouvelle pour la Somalie.

Spécimens étudiés: Afgoi (Somalie); 3 ex. n. 252 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959; 1 ex. M.N.H.N., leg. A. Sammicheli, IX.1959.

Tribu Anacolini

Cantharocnemis spondyloides Serville.

Répartition géographique: du Sénégal à la Mer Rouge.

Spécimen étudié: Alessandra (Somalie); 1 ex. n. 257 M.F., leg. S.B.S., 16.VIII.1962.

Cantharoctenus somalius Gahan.

Répartition géographique: connu seulement de Somalie.

Spécimens étudiés: Afgoi (Somalie); 1 ex. n. 255 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959; 1 ex. M.N.H.N., leg. A. Sammicheli, IX.1959.

B. Sous-Famille ASEMINAE

Tribu Asemini

Tetropiopsis somaliensis Villiers n.sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimens étudiés:

Bender Casim (Somalie); 1 ex. n. 213 M.F. (holotype), leg. Mordini, 24.IV.1938.

Run (Somalie); 1 ex. M.N.H.N. (paratype), leg. S.B.S., 6.VIII.1964.

C. Sous-Famille CERAMBYCINAE

Tribu Oemini

Nosoeme clavipes Kolbe.

Répartition géographique: Uganda, Éthiopie.

Spécimen étudié: Dembi (Éthiopie); 1 ex. n. 312 M.F., leg. L. Cipriani, 28.II.1939.

Brunoeme n.gen. *rufolimbata* n.sp. Villiers.

Répartition géographique: décrit de l'Éthiopie.

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 214 M.F. (holotype), leg. E. Faà di Bruno, XI.1938-III.1939.

Metallyra nitidicollis Gestro.

Répartition géographique: décrit de l'Éthiopie (Galla).

Spécimens étudiés: Giohar (Somalie); 2 ex. n. 313 M.F., leg. G. Paoli, III-V.1926; 1 ex. n. M.N.H.N., leg. G. Paoli, III-V.1926.

Hypoeschrus abyssinicus Jordan.

Répartition géographique: Sahara, zones sahélienne et soudanienne d'Afrique.

Spécimens étudiés:

Eggi (Somalie); 1 ex. n. 315 M.F., leg. S.B.S., 22-26.VIII.1962; 1 ex. M.N.H.N., leg. S.B.S., 22-26.VIII.1962.

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 314 M.F., leg. G. Paoli, IV-V.1926.

Xystrocera dispar Fahroeus.

Répartition géographique: Afrique australe et orientale.

Spécimens étudiés:

Giohar (Somalie); 5 ex. n. 309 M.F., leg. G. Paoli, VI.1925, IV-VI. 1926, X.1926; 1 ex. n. 311 M.F., leg. S.B.S., 27.VIII.1964.

Lugh (Somalie); 1 ex. n. 310 M.F., leg. G. Paoli, 25-27.X.1913; 2 ex. M.N.H.N.

Linopteridius africanus Villiers n.sp.

Répartition géographique: Kénya et Somalie.

Spécimen étudié: Ola Uager (Somalie); 1 ex. n. 568 M.P. (paratype), leg. S.B.S., 15-18.VIII.1970.

Tribu PSATHYRINI

Thapsyrus n.gen. *martellii* Villiers n.sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 215 M.F. (holotype), leg. S.B.S., 18-28.IV.1968.

Tribu CERAMBYCINI

Coelodon servum White.

Répartition géographique: du Sénégal à la Somalie.

Spécimens étudiés:

Afgoi (Somalie); 2 ex. n. 373 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959.

Bender Casim (Somalie); 1 ex. n. 413 M.F., leg. Mordini, 8.V.1938.

Mogadiscio (Somalie); 1 ex. n. 372 M.F., leg. G. Paoli, V.1913; 2 ex. M.N.H.N., leg. G. Paoli, V.1913.

Dinsor (Somalie); 1 ex. n. 517 M.F., leg. R. Amoroso, II.1963.

Taurotagus greenfieldi Gahan.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimen étudié: Berbera (Somalie); 1 ex. n. 374 M.F., leg. G. Paoli, IX.1913.

Plocaederus sp. (*cineraceus* Fairmaire ?).

Répartition géographique: décrit de Somalie (type non retrouvé !).

Spécimen étudié: Dara Davò (Somalie); 1 ex. n. 371 M.F., leg. S.B.S., 6.VIII.1969.

Plocaederus emini Waterhouse.

Répartition géographique: Afrique orientale.

Spécimens étudiés:

Barentù (Éthiopie); 1 ex. n. 377 M.F., leg. L. Cipriani, 10.I.1939.
Jesomma (Somalie); 1 ex. n. 375 M.F., leg. S.B.S., 5.VIII.1968.
Callis (Somalie); 1 ex. n. 376 M.F., leg. S.B.S., 20.VIII.1969.
Run (Somalie); 3 ex. n. 378 M.F., leg. S.B.S., 2.VIII.1964; 2 ex. M.N.H.N.

Plocaederus denticornis Fabricius.

Répartition géographique: toute l'Afrique au Sud du Sahara.

Spécimens étudiés:

Bud-Bud (Somalie); 1 ex. n. 369 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968.
Giohar (Somalie); 1 ex. n. 370 M.F., leg. S.B.S., 24.IX.1964.
Jesomma (Somalie); 1 ex. n. 368 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968.
Run (Somalie); 3 ex. n. 367 M.F., leg. S.B.S., 2.VIII.1964.

Cerambyx scopolii Fuessly.

Répartition géographique: région paléarctique.

Spécimen étudié: Giumbo (Somalie); 1 ex. n. 366 M.F., leg. A. Flechter. (Vraisemblablement importé).

Pachydissus aspericollis Fairmaire.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimens étudiés: Giohar (Somalie); 2 ex. n. 308 M.F., leg. G. Paoli, III-IV.1926; 1 ex. M.N.H.N.

Margites lineatus Gahan.

Répartition géographique: Afrique orientale.

Spécimen étudié: Afmadù (Somalie); 1 ex. n. 326, leg. S.B.S., 7. IX.1964.

Derolus somaliensis Villiers n.sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 216 M.F. (holotype), leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Derolus subaureus Jordan.

Répartition géographique: Afrique au Sud du Sahara.

Spécimens étudiés:

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 324 M.F., leg. G. Paoli, III-IV.1926.
Ola Uager (Somalie); 1 ex. M.N.H.N., leg. S.B.S., 14.IX.1964.

Derolus sulcatus Aurivillius.

Répartition géographique: Afrique orientale.

Spécimen étudié: Allengo (Somalie); 1 ex. n. 323 M.F., leg. G. Paoli, 27.IX.1913.

Tribu HESPEROPHANINI

Sromatium barbatum Fabricius.

Répartition géographique: Asie méridionale, Mascareignes, Madagascar, Afrique orientale.

Spécimens étudiés:

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 327 M.F., leg. S.B.S., 25.IV.1968.
Mogadiscio (Somalie); 1 ex. n. 328 M.F., leg. G. Paoli, V.1913.

Hololeprus sammichelii Villiers n.sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimen étudié: Afgoi (Somalie); 1 ex. n. 217 M.F. (holotype), leg. A. Sammicheli, IX.1959.

Zoodes liturifer Walker.

Répartition géographique: Arabie, Afrique au Sud du Sahara, dans les zones sahélienne et soudanienne.

Spécimens étudiés:

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 306 M.F., leg. G. Paoli, IV-V.1926.

Lugh (Somalie); 6 ex. n. 307 M.F., leg. G. Paoli, X.1913; 2 ex. M.N.H.N.

Tribu PHORACANTHINI

Cordylomera annulicornis Fairmaire.

Répartition géographique: Afrique orientale.

Spécimens étudiés: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 321 M.F.; leg. G. Paoli, III-IV.1925; 1 ex. n. 322 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Tribu OBRIINI

Ossibia fuscata Chevrolat.

Répartition géographique: Afrique sahélienne et soudanienne, du Sénégal à l'Afrique australe.

Spécimens étudiés:

Alessandra (Somalie); 1 ex. n. 320 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Giohar (Somalie); 6 ex. n. 316 M.F., leg. G. Paoli, III-VII.1926; 4 ex n. 317 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-20.IV.1968.

Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 319 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Lugh (Somalie); 6 ex. n. 318 M.F., leg. G. Paoli, X.1913; 2 ex. M.N.H.N.

Tribu CALLICHROMINI

Compsomera speciosissima Gerstaecker.

Répartition géographique: Afrique orientale, décrit du Mozambique.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 329 M.F., leg. G. Paoli, 1929.

Compsomera nigricollis Gahan.

Répartition géographique: décrit de Tanzanie.

Spécimen étudié: Mogadiscio (Somalie); 1 ex. n. 332 M.F., leg. S.B.S., 27.IV.1968.

Xanthospila flavoplagiata Fairmaire.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimens étudiés:

Jesomma (Somalie); 1 ex. n. 331 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968.

Mogadiscio, broussaille (Somalie); 2 ex. n. 330 M.F., leg. G. Paoli, 28.V.1913.

Observation: l'exemplaire de Jesomma est remarquable par les taches préapicales claires des élytres qui sont dilatées et se rejoignent sur la suture en formant une large bande.

Mecosaspis auratipennis Kolbe.

Répartition géographique: Afrique orientale.

Spécimens étudiés: Moweka Moshi Diotz, m 1530 (Tanzanie); 2 ex. n. 573 M.F., leg. U. Funaioli, XI.1967-III.1968.

Euporus abyssinicus Müller. (1)

Répartition géographique: Éthiopie.

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 333 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI.1938-III.1939.

Closteromerus puncticollis Gestro.

Répartition géographique: décrit d'Éthiopie (Galla).

Spécimens étudiés: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 334 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI.1938-III.1939; 1 ex. M.N.H.N.

Rhopalomeces dilaticornis Aurivillius.

Répartition géographique: décrit de Tanzanie (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimens étudiés: Ghersale (Somalie); 1 ex. n. 335 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 22.IV.1968; 1 ex. M.N.H.N.

---

(1) E.A.J. Duffy det.

Rhopalomeces discretus Aurivillius.

Répartition géographique: Tanzanie.

Spécimens étudiés: Moweka Moshi Diotz, m 1530 (Tanzanie); 2 ex. n. 458 M.F., leg. U. Funaioli, XI.1967-III.1968.

Helymaeus argyrothorax Fairmaire.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimens étudiés:

Ghersale (Somalie); 1 ex. n. 336 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 22.IV.1968.

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 337, leg. B. Lanza (S.B.S.), 30.IV.1968; 1 ex. M.N.H.N.

Tribu CLYTINI

Calanthemis subcruciatus White. (1)

Répartition géographique: Natal, Mozambique, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimens étudiés: Ola Uager (Somalie); 2 ex. n. 325 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1970; 1 ex. n. 571 M.F., leg. S.B.S., 15-18.VIII.1970.

Observation: un des exemplaires cités ci-dessus correspond parfaitement au type de *C. tenuis* Jordan qui n'est vraisemblablement qu'une forme de petite taille de *subcruciatus*.

D. SOUS-FAMILLE LAMIINAE

Tribu PHANTASINI

Phantasis dolosa Kolbe.

Répartition géographique: Éthiopie, Somalie, Sudan.

Spécimens étudiés:

Afgoi (Somalie); 1 ex. n. 263 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959.

Neghelli (Éthiopie); 2 ex. n. 262 M.F., leg. E. Faà di Bruno, I-IV. 1936; 1 ex. M.N.H.N., leg. E. Faà di Bruno, I-IV. 1936.

---

(1) R.M. Quentin det.

Tribu MESOSINI

Coptops aedificator Fabricius.

Répartition géographique: toute l'Afrique tropicale, Madagascar, Ceylan.

Spécimens étudiés:

Afgoi (Somalie); 1 ex. n. 267 M.F., leg. A. Sammicheli, 1961.
Gelib (Somalie); 1 ex. n. 269 M.F., leg. S.B.S., 1962.
Giohar (Somalie); 1 ex. n. 266 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1970.
Giuba (Somalie); 1 ex. n. 270 M.F., leg. G. Paoli, 4.VII.1913.
Mogadiscio (Somalie); 1 ex. n. 264 M.F., leg. S.B.S., 4-7. VII.1962.
Ola Uager (Somalie); 2 ex. n. 265 M.F., leg. S.B.S., 14.IX.1964, 13-15.VIII.1970.
Run (Somalie); 1 ex. n. 268 M.F., leg. S.B.S., I-VIII.1964.

Tribu STERNOTOMINI

Prosopocera (s.s.) *lactator* Fabricius.

Répartition géographique: Sénégal, Congo, Ouganda, Tanganyika, Éthiopie.

Spécimens étudiés:

Afgoi (Somalie); 1 ex. n. 461 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959.
Giohar (Somalie); 1 ex. n. 272 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 28.IV.1968.
Javello (Éthiopie); 2 ex. n. 415 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-II.1939.

Prosopocera (s.s.) *inermis* Aurivillius.

Répartition géographique: Damar (Afrique méridionale), Tanzanie.

Spécimen étudié: Tsawo National Park, West (Tanzanie); 1 ex. n. 515 M.F., leg. U. Funaioli et A. Aragona, 17-24.IV.1968.

Prosopocera (s.s.) *marmorata* Gahan.

Répartition géographique: Somalie, Kénya, (espèce nouvelle pour l'Éthiopie).

Spécimens étudiés:

Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 421 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII. 1938, I-III.1939.

Dolo (Éthiopie); 1 ex. n. 422 M.F., leg. L. Cipriani, 6.III.1939.

Prosopocera (*Alphitopola*) *fisheri* Breuning.

Répartition géographique: Tanzanie, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimens étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 274 M.F., leg. S.B.S., 18-20.IV.1968; 1 ex. n. 273 M.F., leg. G. Paoli, 1913.

Prosopocera (*Alphitopola*) *peeli* Gahan.

Répartition géographique: Somalie, Kénya, Tanzanie.

Spécimens étudiés: Alessandra (Somalie); 5 ex. n. 416 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Prosopocera (*Alphitopola*) *peeli confluentina* Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Kénya, Tanzanie, (espèce nouvelle pour l'Éthiopie).

Spécimens étudiés:

Alessandra (Somalie); 1 ex. n. 416 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 417 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-II.1939.

Prosopocera (*Alphitopola*) *pulcherrima* Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Tanzanie.

Spécimen étudié: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 418 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Prosopocera (*Alphitopola*) *parvula* Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Ouganda.

Spécimens étudiés: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 419 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Prosopocera (*Dalterus*) *somaliensis* Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Éthiopie.

Spécimen étudié: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 420 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Prosopocera (*Dalterus*) *inermis* Aurivillius.

Répartition géographique: Afrique Sud-Ouest (Damara), (espèce nouvelle pour la Tanzanie).

Spécimen étudié: Tsavo National Park, West (Tanzanie); 1 ex. n. 515 M.F., leg. U. Funaioli et A. Aragona, 17-24.IV.1968.

Tribu Tragocephalini

Chariestes gestroi Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Ouganda.

Spécimens étudiés: Gelib (Somalie); 2 ex. n. 442 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Tribu Xylorhizini

Cymatura fasciata Guérin.

Répartition géographique: République Centre-Africaine, Congo, Ouganda, Tanzanie, Éthiopie.

Spécimen étudié: Genale (Somalie); 1 ex. n. 271 M.F., leg. C. Cei, 1939.

Tribu Apomecynini

Apomecyna parisii Breuning.

Répartition géographique: Somalie (Giohar).

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 276 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Apomecyna binubila Pascal.

Répartition géographique: Afrique méridionale, Éthiopie et jusqu'au Dahomey.

Spécimens étudiés: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 275 M.F., leg. G. Paoli, 7.II.1926; 1 ex. M.N.H.N., leg. G. Paoli, 6.IX.1926.

Apomecyna trifasciata Quendenfeldt.

Répartition géographique: de l'Angola jusqu'au Dahomey et à la Somalie.

Spécimens étudiés: Alessandra (Somalie); 1 ex. n. 277 M.F., leg. S.B.S., 16.VIII.1962; 1 ex. n. 439 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Hyagnis vagemaculatus mediofasciatus Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Éthiopie, Congo, Rhodésie, Transvaal.

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 443 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939, (ex. mauvais état).

Eunidia kristenseni Aurivillius.

Répartition géographique: du Sénégal au Kénya et à l'Arabie.

Spécimens étudiés:

Lugh (Somalie); 8 ex. n. 278 M.F., leg. G. Paoli, X.1913; 1 ex. M.N.H.N., leg. G. Paoli, X.1913.
Moweka Moshi Diotz, m 1530 (Tanzanie); 1 ex. n. 516 M.F., leg. U. Funaioli, XI.1967-III.1968.

Eunidia flavicans Breuning.

Répartition géographique: Somalie.

Spécimens étudiés:

Giohar (Somalie); 13 ex. n. 279 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968; 1 ex. n. 280 M.F., leg. G. Paoli, IV-V.1926.
Giuba (Somalie); 1 ex. n. 281 M.F., leg. G. Paoli, 3.VII.1913.

Eunidia somaliensis Breuning.

Répartition géographique: Somalie.

Spécimens étudiés:

Afmedù, 1 km Ouest (Somalie); 1 ex. n. 282 M.F., leg. S.B.S., 1-10.VIII.1962.
Giumbo (Somalie); 1 ex. n. 283 M.F., leg. A. Fiechter.

Eunidia fulgurata Aurivillius.

Répartition géographique: Kénya, Éthiopie, Somalie.

Spécimens étudiés:

Chisimaio (Somalie); 1 ex. n. 284 M.F., leg. B. Lanza et F. Ferrara (S.B.S.), 21.VIII.1970.

Ola Uager (Somalie); 1 ex. n. 572 M.F., leg. S.B.S., 13-15.VIII.1970.

Eunidia macrophthalma Breuning.

Répartition géographique: Somalie.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 285 M.F., leg. S.B.S., 18-28.IV.1968.

Eunidia haplotrita Aurivillius.

Répartition géographique: Kénya, Éthiopie, Somalie.

Spécimens étudiés:

Burbisciara (Somalie); 1 ex. n. 286 M.F., leg. G. Paoli, 24.XI.1913.
Mogadiscio (Somalie); 1 ex. n. 287 M.F., leg. G. Paoli, 25.XI.1913.

Eunidia quadricincta Aurivillius.

Répartition géographique: Kénya, Somalie.

Spécimens étudiés: Giohar (Somalie); 5 ex. n. 288 M.F. leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968; 2 ex. M.N.H.N., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Eunidia mucorea Gahan.

Répartition géographique: Tanzanie, Kénya, Somalie.

Spécimens étudiés:

El Ure (Somalie); 1 ex. n. 289 M.F., leg. G. Paoli, X.1923.
Gelib (Somalie); 2 ex. n. 438 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Eunidia marmorata Gestro.

Répartition géographique: Ouganda, Kénya, Somalie.

Spécimens étudiés:

Lugh (Somalie); 3 ex. n. 290 M.F., leg. G. Paoli, X.1913; 1 ex. M.N.H.N., leg. G. Paoli, X.1913.

Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 435 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Eunidia piperita Gahan.

Répartition géographique: Somalie, Kénya, Tanzanie, Rhodésie, Transvaal.

Spécimens étudiés: Javello (Éthiopie); 3 ex. n. 432 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939, (1 des 3 ex. mutilé).

Eunidia caffra flavescens Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Éthiopie, Kénya, Rhodésie.

Spécimen étudié: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 433 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Eunidia senilis distinguenda Aurivillius.

Répartition géographique: Somalie, Kénya, Rhodésie, Mozambique, Transvaal.

Spécimen étudié: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 434 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Eunidia ambigua Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Éthiopie.

Spécimen étudié: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 436 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Eunidia thomseni guttata Breuning.

Répartition géographique: Arabie, Somalie, Kénya, Ouganda, Tanzanie, Rhodésie, Transvaal.

Spécimen étudié: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 437 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Enaretta conifera Aurivillius.

Répartition géographique: du Transvaal à la Tanzanie, Congo, Côte d'Ivoire.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 291 M.F., leg. S.B.S., I.1969.

Ogmodera sulcata Aurivillius.

Répartition géographique: Tanzanie, Éthiopie, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimen étudié: Geriban (Somalie); 1 ex. n. 292 M.F., leg. S.B.S., 12.VIII.1964.

Minononymoides n. gen. *somaliensis* Breuning n. sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimen étudié: Bur Dinsor (Somalie); 1 ex. n. 218 M.F. (holotype), leg. S.B.S., 23.VII.1962.

Tribu Pteropliini

Niphona appendiculata Gerstaecker.

Répartition géographique: répandu par toute l'Afrique tropicale.

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 431 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Tribu Agapanthiini

Hyllisia flavicans Breuning.

Répartition géographique: Somalie.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 293 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 24.IV.1968.

Hyllisia stenideoides Pascoe.

Répartition géographique: Somalie, Afrique orientale jusqu'au Natal, Congo oriental.

Spécimens étudiés: Javello (Éthiopie); 3 ex. n. 445 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Hyllisia stenioides melagris Aurivillius.

Répartition géographique: Somalie, Afrique orientale jusqu'au Natal, Congo oriental.

Spécimen étudié: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 446 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Hyllisia somaliensis Breuning n. sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 219 M.F. (holotype), leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 28.IV.1968.

Tetraglenes somaliensis Breuning.

Répartition géographique: Somalie.

Spécimens étudiés:

Genale (Somalie); 1 ex. n. 295 M.F., leg. E. Esposito.
Giohar (Somalie); 1 ex. n. 294 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.
Ola Uager (Somalie); 1 ex. M.N.H.N., leg. S.B.S., 15.IX.1964.

Batrachorhina cephalotes Breuning.

Répartition géographique: Kénya, Somalie.

Spécimen étudié: Balad (Somalie); 1 ex. n. 296 M.F., leg. S.B.S., 30.VIII.1964.

Pterolophia (s.s.) *scripta* Gerstaecker.

Répartition géographique: du Mozambique à l'Éthiopie.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 297 M.F., leg. S.B.S., 25.IV.1968.

Tribu ANCYLONOTINI

Lasiopezus nigromaculatus Kolbe.

Répartition géographique: Somalie, Éthiopie, Kénya, Tanzanie, Mozambique, Transvaal, Natal.

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 427 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Lasiopezus brunoi Breuning n. sp.

Répartition géographique: décrit d'Éthiopie.

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 221 M.F. (holotype), leg. E. Faà di Bruno, X-XII.1938, I-III.1939.

Ancylonotus tribulus Olivier.

Répartition géographique: toute l'Afrique tropicale.

Spécimen étudié: El Bur (Somalie); 1 ex. n. 298 M.F., leg. S.B.S., 6.IX.1962.

Idactus coquereli Fairmaire.

Répartition géographique: Ouganda, Kénya, Somalie, Obock.

Spécimens étudiés:

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 300 M.F., leg. S.B.S., 24.IX.1964; 4 ex. M.N.H.N., leg. S.B.S., 24.IX.1964.

Run (Somalie); 14 ex. n. 299 M.F., leg. S.B.S., 3.VIII.1964-19.VIII. 1969.

Idactus maculicornis Gahan.

Répartition géographique: Mozambique, Tanzanie, Kénya, Ouganda, Éthiopie, Somalie, Arabie.

Spécimens étudiés:

Jesomma (Somalie); 4 ex. n. 301 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968.

Run (Somalie); 1 ex. n. 302 M.F., leg. S.B.S., 3.VIII.1964; 2 ex. M.N.H.N., leg. S.B.S., 3.VIII.1964.

Idactus elliotti Gahan.

Répartition géographique: Madagascar, Comores, Natal, Mozambique, Ouganda, Congo, Tanzanie, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 303 M.F., leg. S.B.S., 24.IX.1964.

Idactus bettoni Gahan.

Répartition géographique: Mozambique, Tanzanie, Kénya, Somalie.

Spécimens étudiés:

Jesomma (Somalie); 1 ex. n. 304 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968.

Run (Somalie); 1 ex. n. 305 M.F., leg. S.B.S., 6.VIII.1964.

Idactus somaliensis Breuning n. sp.

Répartition géographique: décrit de Dinsor et Giohar.

Spécimens étudiés:

Dinsor (Somalie); 1 ex. n. 220 M.F. (holotype), leg. S.B.S., 18-19.VII.1962.

Giohar (Somalie); 1 ex. M.N.H.N. (paratype), leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Idactus spinipennis Gahan.

Répartition géographique: Tanzanie, Kénya, Éthiopie, Sudan, Somalie, Obock.

Spécimens étudiés:

Bud Bud (Somalie); 1 ex. n. 340 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968.
El Bur (Somalie); 1 ex. n. 338 M.F., leg. S.B.S., 5-9.IX.1962.
Run (Somalie); 1 ex. n. 341 M.F., leg. S.B.S., 7-19.VIII.1969; 1 ex. n. 339 M.F., leg. S.B.S., 3.VIII.1964.

Tribu DORCASCHEMATINI

Olenecamptus albidus Jordan.

Répartition géographique: Gabon, Congo, Transvaal, Tanzanie, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 342 M.F., leg. G. Paoli, IV-V.1926.

Tribu HECYNINI

Biobessa beatrix Gahan.

Répartition géographique: Afrique orientale.

Spécimens étudiés:

Tsavo National Park, West (Tanzanie); 1 ex. n. 524 M.F., leg. U. Funaioli et A. Aragona, 17-24.IV.1968.
Mweka Moshi Diotz, m 1530 (Tanzanie); 1 ex. n. 526 M.F., leg. U. Funaioli, XI.1967-III.1968.

Tribu CROSSOTINI

Crossotus plumicornis Serville.

Répartition géographique: du Sénégal à la Somalie.

Spécimens étudiés:

Bardera (Somalie); 1 ex. n. 211 M.F., leg. Osservatorio Fitipatologico, II.1935.
Barire (Somalie); 1 ex. n. 209 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1959.
Eggi (Somalie); 1 ex. n. 210 M.F., leg. S.B.S., 22-26.VIII.1962.

El Bur (Somalie); 1 ex. n. 206 M.F., leg. S.B.S., 5-9.IX.1962.
Giohar (Somalie); 1 ex. n. 205 M.F., leg. S.B.S., 24.IX.1964.
Javello (Éthiopie); 2 ex. n. 426 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.
Matagoi (Somalie); 1 ex. n. 207 M.F., leg. G. Paoli, 1913.
Mogadiscio (Somalie); 1 ex. n. 212 M.F., leg. G. Paoli, V.1913; 4 ex. M.N.H.N.
Run (Somalie); 10 ex. n. 208 M.F., leg. S.B.S., 6-9.VIII.1964, 7-19.VIII.1969.

Crossotus sublineatus Gestro.

Répartition géographique: Sudan, Somalie, Éthiopie.

Spécimens étudiés:

Afmedù (Somalie); 1 ex. n. 346 M.F., leg. S.B.S., 2-10.VII.1962.
Bardera (Somalie); 1 ex. n. 520 M.F., leg. R. Amoroso, IV.1963.
Geriban (Somalie); 1 ex. n. 315 M.F., leg. S.B.S., 12.VIII.1964.
Jesomma (Somalie); 3 ex. n. 343 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968.
Run (Somalie); 7 ex. n. 344 M.F., leg. S.B.S., 2-8.VIII.1964, 9-18.VIII.1969; 4 ex. M.N.H.N.

Crossotus subocellatus Fairmaire.

Répartition géographique: Sahara, Sudan, Éthiopie, Somalie, Égypte, Arabie.

Spécimens étudiés: Run (Somalie); 2 ex. n. 347 M.F., leg. S.B.S., 7-19.VIII.1969.

Crossotus vagepictus Fairmaire.

Répartition géographique: Kénya, Soudan, Éthiopie, Somalie, Obock.

Spécimens étudiés:

Bardera (Somalie); 1 ex. n. 525 M.F., leg. R. Amoroso, IV.1963.
Dinsor (Somalie); 1 ex. n. 521 M.F., leg. R. Amoroso, II.1963.
Geriban (Somalie); 1 ex. n. 348 M.F., leg. S.B.S., 13.VIII.1964.

Crossotus freoides Breuning.

Répartition géographique: Somalie.

Spécimens étudiés:

Afmadù (Somalie); 1 ex. n. 349 M.F., leg. S.B.S., 1970.
Chisimaio, 16 km Ouest-Sud-Ouest (Somalie); 1 ex. n. 350 M.F., leg. S.B.S., 8.VIII.1970.

Crossotus brunneopictus Fairmaire.

Répartition géographique: Ouganda, Tanzanie, Kénya, Somalie, (espèce nouvelle pour l'Éthiopie).

Spécimens étudiés:

Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 425 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Run (Somalie); 1 ex. n. 351 M.F., leg. S.B.S., 6.VIII.1964.

Crossotus genalis Aurivillius.

Répartion géographique: Kénya, Éthiopie, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimens étudiés:

Afmadù (Somalie); 1 ex. n. 352 M.F., leg. S.B.S., 2-10.VIII.1962.
Meldac (Somalie); 1 ex. n. 353 M.F., leg. G. Paoli, 23.VIII.1913.

Crossotus argenteus Hintz.

Répartition géographique: Tanzanie, Kénya, Somalie.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 354 M.F., leg. G. Paoli, 1926.

Crossotus somaliensis Breuning n. sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimen étudié: Jesomma (Somalie); 1 ex. n. 222 M.F. (holotype), leg. S.B.S., 15.VIII.1968.

Crossotus erlangeri Hintz.

Répartition géographique: Somalie, Éthiopie, Soudan.

Spécimen étudié: Bardera (Somalie); 1 ex. n. 519 M.F., leg. R. Amoroso, IV.1963.

Dichostathes trilineatus Hintz.

Répartition géographique: Tanzanie, Kénya, Somalie.

Spécimens étudiés:

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 356 M.F., leg. G. Paoli, VII.1926.
Ola Uager (Somalie); 1 ex. n. 355 M.F., leg. S.B.S., 13-15.VIII.1970.

Hecyroides lateriplagiatus Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Kénya, Tanzanie, (espèce nouvelle pour l'Éthiopie).

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 430 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Tribu CEROPLESINI

Ceroplesis revoili Fairmaire.

Répartition géographique: Éthiopie, Somalie.

Spécimens étudiés:

Bud Bud (Somalie); 1 ex. n. 359 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968.
Dusa Mareb (Somalie); 1 ex. n. 362 M.F., leg. S.B.S., 4.VIII.1969.
El Bur (Somalie); 1 ex. n. 463 M.F., leg. S.B.S., 5-9.IX.1962.
Garoe (Somalie); 1 ex. n. 363 M.F., leg. S.B.S., 6.VIII.1969.
Geriban (Somalie); 5 ex. n. 357 M.F., leg. S.B.S., 12.VIII.1964.
Mahaddei (Somalie); 2 ex. n. 360 M.F., leg. S.B.S., 4.VIII.1969.
Ola Uager (Somalie); 1 ex. n. 358 M.F., leg. S.B.S., 12.IX.1964.
Run (Somalie); 1 ex. n. 361 M.F., leg. S.B.S., 19.VIII.1964; 4 ex. M.N.H.N.

Ceroplesis revoili ssp. *pauli* Fairmaire.

Répartition géographique: Tanzanie, Kénya, Éthiopie, Somalie.

Spécimens étudiés:

Chisimaio (Somalie); 1 ex. n. 364 M.F., leg. B. Lanza et F. Ferrara (S.B.S.), 21.VIII.1970.
Dinsor (Somalie); 2 ex. n. 365 M.F., leg. S.B.S., 19-26.VII.1962, II.1963.

Ceroplesis militaris aurivillii Hintz.

Répartition géographique: Transvaal, Mozambique, Rhodésie, Congo, Tanzanie, Éthiopie, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimens étudiés:

Alessandra (Somalie); 1 ex. n. 423 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.
Chisimaio (Somalie); 1 ex. n. 227 M.F., leg. B. Lanza et F. Ferrara (S.B.S.), 21.VIII.1970.
Giohar (Somalie); 1 ex. M.N.H.N., leg. S.B.S., I.1969.
Ola Uager (Somalie); 7 ex. n. 226 M.F., leg. S.B.S., 13-15.VIII.1970.

Paranaleptes reticulatus Thomson.

Répartition géographique: Tanzanie, Kénya, Éthiopie, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimens étudiés:

Afgoi (Somalie); 1 ex. n. 228 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959.
Ghersale (Somalie); 1 ex. n. 229 M.F., leg. S.B.S., 22.IV.1968.
Mweka Moshi Diotz, m 1530 (Tanzanie); 1 ex. n. 459 M.F., leg. U. Funaioli, XI.1967-III.1968.

Paranaleptes giraffa Kriesche.

Répartition géographique: Éthiopie, Somalie.

Spécimens étudiés: Bur Dinsor (Somalie); 3 ex. n. 230 M.F., leg. S.B.S., 19-23.VII.1962; 1 ex. M.N.H.N., leg. S.B.S., 19-23.VII.1962.

Titoceres jaspideus Serville.

Répartition géographique: dans la majeure partie de l'Afrique tropicale.

Spécimens étudiés:

Afmadù, 13 km Ouest (Somalie); 2 ex. n. 237 M.F., leg. S.B.S., 2-10.VIII.1962.
Anole (Somalie); 1 ex. n. 234 M.F., leg. G. Paoli, 5.VII.1913.
El Bur (Somalie); 1 ex. n. 239 M.F., leg. S.B.S., 5-9.IX.1962.
Giohar (Somalie); 1 ex. n. 523 M.F., leg. S.B.S., I.1969; 4 ex. n. 233 M.F., leg. G. Paoli, IV-V.1926.
Giumbo (Somalie); 1 ex. n. 232 M.F., leg. A. Fiechter.
Ola Uager (Somalie); 1 ex. n. 238 M.F., leg. S.B.S., 14.IX.1964; 5 ex. n. 231 M.F., leg. S.B.S., 19.VIII.1970.
Run (Somalie); 1 ex. n. 236 M.F., leg. S.B.S., 6.VIII.1964; 3 ex. n. 235 M.F., leg. S.B.S., 7-19.VIII.1969.

Tribu PHRYNETINI

Phryneta spinator obscura Olivier.

Répartition géographique: du Sénégal à l'Angola, Congo, Transvaal, Tanzanie, Kénya, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimens étudiés:

Eggi (Somalie); 2 ex. n. 240 M.F., leg. S.B.S., 22-26.VIII.1962.
Giohar (Somalie); 1 ex. n. 241 M.F., leg. G. Paoli, VII.1926.

Phryneta obliquata Haroid.

Répartition géographique: Congo, Ouganda, Tanzanie, Kénya, Somalie, (espèce nouvelle pour l'Éthiopie).

Spécimens étudiés:

Giohar (Somalie); 1 ex. n. 242 M.F., leg. S.B.S., 27.VII.1964.

Javello (Éthiopie); 4 ex. n. 429 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Calothyrza bottegi Gestro.

Répartition géographique: Somalie, Éthiopie, Tanzanie.

Spécimen étudié: Gelib (Somalie); 1 ex. n. 414 M.F., leg. F. Bigi, IV.1937.

Tribu Petrognathini

Mallonia patricii Breuning.

Répartition géographique: Somalie, (espèce nouvelle pour l'Éthiopie).

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 409 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Tribu Rhodopini

Stenidea densevestita Fairmaire.

Répartition géographique: Tanzanie, Kénya, Somalie.

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 243 M.F., leg. G. Paoli, I-III.1926.

Stenidea bituberosa Breuning.

Répartition géographique: Somalie, Kénya, Ouganda, (espèce nouvelle pour l'Éthiopie).

Spécimen étudié: Javello (Éthiopie); 1 ex. n. 444 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XII.1938, I-III.1939.

Sophronica nigrovittata Aurivillius.

Répartition géographique: Somalie.

Spécimens étudiés:

Baidoa (Somalie); 1 ex. n. 440 M.F., leg. E. Faà di Bruno, X-XII.1936.
Ola Uager (Somalie); 1 ex. n. 569 M.F., leg. S.B.S., 15-18.VIII.1970.

Sophronica bituberosoides Breuning n. sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimens étudiés: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 223 M.F. (holotype), leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968; 1 ex. n. 224 M.F. (paratype), leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968; 1 ex. M.N.H.N. (paratype), leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Tribu ACANTHOCININI

Jordanoleiopus (*Polymitoleiopus*) *monoxenoides* Breuning nov. sp.

Répartition géographique: décrit de Somalie.

Spécimen étudié: Eggi (Somalie); 1 ex. n. 225 M.F. (holotype), leg. S.B.S., 22-26.VIII.1962.

Acartus abyssinicus Breuning.

Répartition géographique: Kénya, Éthiopie, Somalie.

Spécimens étudiés:

Baidoa (Somalie); 1 ex. n. 441 M.F., leg. F. Bigi, X-XII.1936.
Giohar (Somalie); 1 ex. n. 244 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-20.IV.1968.

Exocentrus (*Camptomyme*) *subvariegatus* Breuning.

Répartition géographique: Obock, (espèce nouvelle pour la Somalie).

Spécimen étudié: Giohar (Somalie); 1 ex. n. 245 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Exocentrus (*Oligopsis*) *longipilis* Fairmaire.

Répartition géographique: Tanzanie, Kénya, Éthiopie, Somalie, Obock.

Spécimen étudié: Lugh (Somalie); 1 ex. n. 246 M.F., leg. G. Paoli, X.1913.

Tribu SAPERDINI

Nupserha somalica Breuning.

Répartition géographique: Somalie.

Spécimens étudiés: Giohar (Somalie); 6 ex. n. 248 M.F., leg. G. Paoli, 20.V.1925.

Tribu GLENEINI

Glenea apicalis westermanni Thomson.

Répartition géographique: Ouganda, (espèce nouvelle pour la Tanzanie).

Spécimen étudié: Mweka Moshi Diotz, m 1530 (Tanzanie); 1 ex. n. 527 M.F., leg. U. Funaioli, XI.1967-III.1968.

III. DESCRIPTION DES ESPÈCES NOUVELLES

A. SOUS-FAMILLE ASEMINAE

par

A. Villiers

Tribu ASEMINI

TETROPIOPSIS SOMALIENSIS n. sp.

Holotype. — Bender Casim, Migiurtinia (Somalie); 1 ♂ n. 213 M.F., leg. Mordini, 24.IV.1938, (Fig. 1).

Paratype. — Run, Garoe (Somalie); 1 ex. M.N.H.N., leg. S.B.S., 6.VIII.1964.

Description. — Tête et pronotum roux et luisants; antennes brun-jaunâtre clair, mates; élytres largement brun-jaunâtre le long de la suture, brun plus foncé latéralement et en arrière. Pattes testacées.

Très voisin de *T. numidica* Chobaut du Sahara septentrional, mais le pronotum aussi long que large, nettement plus étroit à la base qu'au bord antérieur (transverse, à base et bord antérieur subégaux chez *numidica*), ponctuation générale beaucoup plus forte et plus dense.

Long. 8,5 mm; larg. 1,75 mm.



Fig. 1. — *Tetropiopsis somaliensis* Villiers n. sp. ♂. Holotype.

B. Sous-Famille CERAMBYCINAE

par

A. Villiers

Tribu Oemini

Brunoeme n. gen.

Voisin de *Coptoeme* Aurivillius, même structure générale, mêmes proportions des articles antennaires, mais pronotum avec une aire centrale finement ridée-ponctuée et côtés avec une ponctuation très grossière, fovéolée et contiguë.

Espèce-type du genre: *B. rufolimbata* n. sp.



Fig. 2. — *Brunoeme rufolimbata* Villiers n. gen. n. sp. ♂. Holotype.

BRUNOEME RUFOLIMBATA n. sp.

Holotype. — Javello, Borana (Éthiopie); 1 ♂ n. 214 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI.1938-II.1939, (Fig. 2).

Description. — Brun-chocolat foncé, la suture des élytres, leur bord latéral et leur base, sauf le calus huméral, brun-roux. Corps et membres avec une assez dense pubescence rousse.

Tête assez fortement et densément ponctuée; vertex gibbeux. Pronotum transverse, à disque déprimé, densément et finement ponctué-ridé avec une ligne longitudinale médiane lisse et luisante, les côtés avec une ponctuation fovéolée contiguë. Elytres densément et finement ponctués,

élargis et légèrement explanés en arrière, légèrement déhiscents à l'apex, le disque avec une côte longitudinale partant de la base, à l'intérieur du calus huméral, et effacée à l'apex.

Long 12 mm; larg. (aux épaules) 3 mm.

LINOPTERIDIUS AFRICANUS n. sp.

Holotype. — Tana River (Kénya); 1 ex. M.N.H.N., coll. G. Babault, V.1915.

Paratype. — Ola Uager (Somalie); 1 ex. n. 568 M.F., leg. S.B.S., 15-18.VIII.1970, (Fig. 3).

Observation. — Le genre *Linopteridius* Fairmaire n'était jusqu'ici connu que de Madagascar.

Description. — Brun jaunâtre clair, les antennes et les pattes (sauf les tarses) un peu plus clairs, les côtés du prothorax légèrement assombris.

Yeux extrêmement gros, profondément échancrés, subcontigus sur le dessus de la tête. Front subcarré, élargi à la partie supérieure, finement rugueux avec un sillon longitudinal médian. Suture clypéo-frontale profondément enfoncée. Antennes atteignant presque l'apex des élytres; scape arqué, dépassant largement en arrière le sommet du pronotum; pédicelle aussi long que large; article III une fois et demie plus long que le scape; IV égal aux trois quarts du III; V un peu plus long que le III; VI un peu plus court que le V, VII un peu plus court que le VI; VIII et IX à peu près égaux aux trois quarts du VII; X nettement plus court que le IX et XI que le X.

Pronotum très allongé, une fois et demie plus long que large, sa plus grande largeur au milieu, les côtés légèrement convergents en faible courbe en avant et en arrière, la base un peu plus étroite que le bord antérieur. Celui-ci non rebordé, légèrement surélevé, assez fortement saillant en avant où il couvre entièrement le vertex de la tête. Disque convexe et légèrement bossué en avant, déprimé en arrière, finement ponctué et granuleux, les granules bien développées et râpeuses en avant. Bord antérieur du prosternum échancré et garni d'une frange de longs poils dorés.

Elytres à peu près quatre fois aussi longs que larges ensemble aux épaules, chacun en demi-ovale étiré à l'apex; toute la surface assez fortement et densément ponctuée sur une microsculpture serrée. Disque avec une côte submédiane, un peu oblique, partant un peu en arrière du calus huméral et disparaissant avant l'apex; région basilaire avec une très brève élévation arrondie longitudinale proche de la suture et parallèle à celle-ci...



Fig. 3. — *Linopteridius africanus* Villiers n. sp. Paratype.

Fémurs fortement aplatis, en ovale allongé. Tibias très grêles. Premier article des tarses postérieurs de peu plus court que les trois suivants réunis.

Long. 7-7,25 mm; larg. (aux épaules) 1 mm environ.

Tribu PSATHYRINI

THAPSYRUS n. gen.

Voisin de *Parauxesis* Aurivillius, même structure générale, même proportion des articles antennaires. En diffère par les saillies antennifères largement écartées au sommet, le front transverse, plus étroit à la base qu'au sommet, dépourvu de sillon longitudinal, le vertex non sillonné, les élytres largement arrondis à l'apex.

Espèce-type du genre: *T. martellii* n. sp.

THAPSYRUS MARTELLII n. sp.

Holotype. — Giohar (Somalie); 1 ex. n. 215 M.F., leg. S.B.S., 18-28.IV.1968, (Fig. 4).

Observation. — Les collections du Muséum de Paris renferment également une autre espèce du même genre dont on trouvera la description ci-dessous.

Description. — Tête brun foncé. Antennes brun foncé à la base, devenant roussâtres à partir du cinquième article, tous les articles, y compris le scape, noirs au sommet. Pronotum brun foncé, le disque avec la base, une vague ligne longitudinale médiane et deux lignes latérales arquées, noires. Scutellum noir. Elytres brun jaunâtre clair avec les dessins brun foncé suivants: une large bande latérale, englobant le calus huméral, s'étendant sur le premier tiers de l'élytre, puis remontant vers l'écusson, qu'elle n'atteint pas, et s'arrêtant contre la suture où elle se dilate en une tache subcarrée; une bande partant de la suture, au milieu de l'élytre et se dirigeant en zig-zag vers le bord latéral qu'elle atteint vers le tiers apical; en outre, cette bande dirige, le long de la suture une étroite bande qui atteint le cinquième apical de l'élytre où elle se dilate en une tache subrectangulaire. Pattes brunes, les tarses un peu plus clairs. Corps et membres hérissés de poils fauves.

Stature très allongée. Tête fortement et densément ponctuée, le front légèrement déprimé au milieu. Lobe inférieur des yeux aussi large que long, rétréci en avant. Pronotum fortement et très densément ponctué, transverse, fortement déprimé à la base, légèrement le long du bord collaire, les côtés convergents en avant et en arrière, munis au milieu d'une protubérance conique fortement saillante. Elytres près de 4 fois plus longs que larges aux épaules, finement et densément ponctués, légèrement élargis en arrière.

Long. 13 mm; larg. 2,5 mm.



Fig. 4. — *Thapsyrus martellii* Villiers n. gen. n. sp.
Holotype.

THAPSYRUS QUENTINI n. sp.

Holotype. — Nova Choupanga (Mozambique); 1 ex. M.N.H.N., leg. J. Surcouf.

Paratype. — Lindi (Tanzanie); 1 ex. M.N.H.N.

Description. — Tête orangée. Antennes brunes avec la base de tous les articles, y compris le scape et le pédicelle, orangée. Pronotum orangé,

le disque avec deux taches noires subarrandies contre le bord antérieur et trois taches ovalaires noires longitudinales devant la base. Scutellum noir. Elytres orangés avec les taches brun sombre suivantes: une subcarrée sur le calus huméral; une arrondie discale sur le sixième basal; une subarrondie discale au tiers basal, indistinctement unie à une grande tache allongée, parallèle à la suture et se prolongeant vers l'arrière pour s'arrêter un peu avant l'apex; contre, et à l'extérieur de cette bande, une tache ovalaire; dans un second exemplaire toutes ces taches sont réunies et forment une sorte de grande bande irrégulière. Fémurs orangés avec le tiers apical brun noir; tibias brun noir, tarses orangés.

Même structure que le précédent, mais angle formé par les tubercules antennifères un peu moins ouvert, pronotum moins large, de peu plus large que long, à côtés munis d'une protubérance faiblement saillante.

Long. 11,5 mm; larg. 2,2 mm.

Tribu CERAMBYCINI

DEROLUS (s. s.) SOMALIENSIS n. sp.

Holotype. — Giohar (Somalie); 1 ♀ n. 216 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968, (Fig. 5).

Description. — Allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, le scape court, à ponctuation dense et extrêmement fine. Pronotum aussi long que large, profondément et irrégulièrement ridé sur les disque. Elytres arrondis à l'apex, à peu près imponctués.

Brun foncé à pubescence brun clair avec de légers reflets dorés, surtout sur le pronotum.

Long. 13 mm; larg. 3 mm.

Tribu HESPEROPHANINI

HOLOLEPRUS SAMMICHELII n. sp.

Holotype. — Afgoi (Somalie); 1 ♀ n. 217 M.F., leg. A. Sammicheli, IX.1959, (Fig. 6).

Observation. — Cette espèce est voisine de *H. variolosus* Gerstaecker qui se distinguera de *sammichelii* par sa pubescense claire uniformément répartie, son sillon frontal se poursuivant sur le vertex, son pronotum plus transverse et moins dilaté en avant, ses élytres sans carène discale et à points dénudés plus larges et plus denses.



Fig. 5. — *Derolus* (s. s.) *somaliensis* Villiers n. sp. ♀. Holotype.

Description. — Brun rouge foncé sur l'avant-corps, plus clair sur les antennes, la face ventrale, les pattes et l'apex des élytres.

Tête couverte de poils blancs et roux mêlés; vertex gibbeux en arrière, le sillon interantennaire brièvement prolongé en arrière et se terminant en une fossette située au milieu de l'espace interoculaire. Pronotum transverse avec une ponctuation rugueuse forte mais peu serrée, le disque avec, un peu en avant du milieu, deux protubérances en cône mousse assez proches l'une de l'autre et, devant la base, deux intumescences



Fig. 6. — *Hololeprus sammichelii* Villiers n. sp. ♀.
Holotype.

obsolètes; côtés largement arrondis en avant (où le pronotum est un peu plus large que la tête avec les yeux), portant une protubérance conique vers le milieu, puis droits et fortement convergents vers la base qui est plus étroite que le bord antérieur; toute la surface avec des poils roux et blancs mêlés, ces derniers dominants vers les côtés. Elytres avec une forte carène discale, atténuée au tiers antérieur et s'arrêtant vers le cinquième apical, et deux carènes latérales obsolètes; base couverte de poils blancs formant un dense revêtement (sauf autour de l'écusson), cette pu-

bescence se poursuivant en une large bande suturale, dilatée vers le milieu, et s'atténuant vers le quart apical; le reste de l'élytre avec des poils roux; toute la surface avec de gros points enfoncés dénudés mais peu serrés.

C. Sous-Famille LAMIINAE

par

S. Breuning

Tribu Apomecynini

Mimononymoides n. gen.

Allongé. Antennes assez fines, un peu plus longues que le corps, peu densément frangées de poils courts; le scape court et assez fort, le troisième article sensiblement moins long que le quatrième, un peu plus long que le scape, le quatrième à peine plus long que le cinquième, les articles suivants diminuant en longueur. Tubercules antennifères modérément saillants. Yeux grossièrement facettés et fortement échancrés. Front transverse. Pronotum aussi long que large, pourvu d'un petit tubercule latéral. Elytres longs, un peu plus larges que le pronotum, subpointus à l'apex. Tête non rétractile. Saillie prosternale arquée. Saillie mésosternale légèrement inclinée vers l'avant. Métasternum de longueur normale. Cavités coxales intermédiaires ouvertes. Pattes de longueur moyenne, les fémurs claviformes, les tibias intermédiaires à sillon dorsal, les crochets divergents.

Type: *somaliensis* Breuning. Se range près du genre *Mimononyma* Breuning.

Mimononymoides somaliensis n. sp.

Holotype. — Bur Dinsor (Somalie); 1 ex. n. 218 M.F., leg. S.B.S., 23.VII.1962, (Fig. 7).

Description. — Lobes inférieurs des yeux quatre fois aussi longs que les joues. Pronotum à ponctuation peu dense et extrêmement fine. Elytres densément et très finement ponctués.

Brun foncé, couvert de pubescence brun clair. Moitié apicale des articles antennaires 4 à 11 légèrement rembrunie.

Long. 10 mm; larg. 2,5 mm.



Fig. 7. — *Mimononymoides somaliensis* Breuning n. gen.n. sp. Holotype.

Tribu AGAPANTHIINI

HYLLISIA SOMALIENSIS n. sp.

Holotype. — Giohar (Somalie); 1 ex. n. 219 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 28.IV.1968, (Fig. 8).

Description. — Très allongé. Antennes à 11 articles, les 4 premiers frangés de poils très courts, le troisième article sensiblement plus long



Fig. 8. — *Hyllisia somaliensis* Breuning n. sp. Holotype.

que le quatrième ou qu'un des articles suivants, un peu plus long que le scape, ce dernier très densément et très finement ponctué. Lobes inférieurs des yeux sensiblement plus longs que les joues. Tout le dessus très densément et finement ponctué. Elytres arrondis à l'apex.

Rouge foncé, couvert d'une très éparse pubescence jaunâtre. Pronotum avec 7 étroites bandes longitudinales jaunes, dont 3 se prolongent vers l'avant sur le vertex. Sur chaque élytre une étroite bande suturale jaune pâle, deux étroites bandes longitudinales discales jaunes et une bande latérale jaune plus large. Tarses à pubescence gris clair. Articles antennairs à partir du deuxième rouges.

Long. 9 mm; larg. 1,5 mm.

Tribu ANCYLONOTINI

IDACTUS SOMALIENSIS n. sp.

Holotype. — Dinsor (Somalie); 1 ex. n. 220 M.F., leg. S.B.S., 18-19.VII.1962, (Fig. 9).

Paratype. — Giohar (Somalie); 1 ex. M.N.H.N., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Description. — Proche de *klingi* Kolbe, mais l'épine latérale du pronotum précédée d'une bosse qui elle est pourvue de très petits dents accessoirs, les deux tubercules prémédians discaux du pronotum pointus, la crête post-basilaire de l'élytre pourvue d'un fascicule de poils, à son bord externe encore un petit tubercule pointu et ensuite de nombreux petits tubercules pointus surtout dans le tiers médian de l'élytre; toute la pubescence un peu plus sombre, brune entremêlée d'un peu de jaunâtre et de gris, seule la bande transversale médiane qui se termine également en tache sublatérale arrondie reste claire.

Long. 11-14 mm; larg. 3,5-5 mm.

LASIOPEZUS BRUNOI n. sp.

Holotype. — Javello, Borana (Éthiopie); 1 ex. n. 221 M.F., leg. E. Faà di Bruno, XI-XIII.1938, I-III.1939, (Fig. 10).

Description. — Allongé. Antennes plus de deux fois aussi longues que le corps, le scape assez court et fort, claviforme, le front assez densément et finement ponctué, l'épine latérale du pronotum pourvue de très petites dents accessoires à son bord antérieur, le disque ne portant que



Fig. 9. — *Idactus somaliensis* Breuning n. sp. Holotype.

deux bosses prémédianes très peu accusées, rapprochées de la ligne médiane. Elytres arrondis à l'apex et pourvus, chacun, d'une assez courte et haute crête discale postbasilaire.

Noir, couvert de pubescence jaune paille. Vertex avec trois taches brunes à son bord postérieur: une médiane plus grande et de chaque côté d'elle une petite. Pronotum avec une bande longitudinale médiane brune, de chaque côté du disque une très petite tache allongée médiane brun foncé et une tache triangulaire brun foncé au bord postérieur de l'épine



Fig. 10. — *Lasiopezus brunoi* Breuning n. sp. Holotype.

latérale. Elytres très densément marbrés de brun assez foncé au tiers basilaire et sur toute la moitié apicale, la pubescence foncée ininterrompue de long du bord latéral. D'assez petites taches brun foncé sur les côtés des métépisternes et des segments abdominaux. Les pattes en partie à pubescence brun foncé. Les articles antennaires 3 à 11 rembrunis à l'apex.

Long. 21 mm; larg. 7 mm.



Fig. 11. — *Crossotus somaliensis* Breuning n. sp. Holotype.

Tribu Crossotini

Crossotus somaliensis n. sp.

Holotype. — Jesomma (Somalie); 1 ex. n. 222 M.F., leg. S.B.S., 15.VIII.1968, (Fig. 11).

Description. — Proche de *subocellatus* Fairmaire, mais les lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues, le pronotum seulement extrêmement finement ponctué, les élytres imponctués sur les trois quarts postérieurs, les trois fascicules de poils de chacun de couleur noire, le scape non marbré de brun, les articles suivants beaucoup plus largement annelés de blanc à la base.

Long. 19 mm; larg. 7,5 mm.



Fig. 12. — *Sophronica bituberosoides* Breuning n. sp. Holotype.

Tribu RHODOPINI

SOPHRONICA BITUBEROSOIDES n. sp.

Holotype. — Giohar (Somalie); 1 ex. n. 223 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968, (Fig. 12).

Paratypes. — Giohar (Somalie); 1 ex. n. 224 M.F., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968; 1 ex. M.N.H.N., leg. B. Lanza et A. Simonetta (S.B.S.), 18-28.IV.1968.

Description. — Allongé. Antennes aussi longues que le corps, le troisième article aussi long que le quatrième, un peu moins long que le scape. Lobes supérieurs des yeux se touchant presque, les lobes inférieurs grands, les joues très courtes. Tout le dessus très densément et finement ponctué. Pronotum transverse. Elytres longs, arrondis à l'apex, pourvus, chacun, d'une bosse discale postbasilaire peu accusée.

Brun foncé, assez luisant, garni de poils dressés jaune pâles. Pattes rouges.

Holotype: long. 6 mm; larg. 1,5 mm.

Tribu ACANTHOCININI

JORDANOLEIOPUS (POLYMITOLEIOPUS) MONOXENOIDES n. sp.

Holotype. — Eggi (Somalie); 1 ex. n. 225 M.F., leg. S.B.S., 22-26.VIII.1962, (Fig. 13).

Description. — Antennes plus de deux fois aussi longues que le corps; le troisième article aussi long que le quatrième, un peu plus long que le scape. Lobes inférieurs des yeux presque de moitié plus longs que les joues. Pronotum fortement transverse, pourvu d'une épine latérale triangulaire et pointue, faiblement recourbée et rapprochée de la base. Elytres arrondis à l'apex, très densément et très finement ponctués.

Rougeâtre à pubescence jaune pale, orné de dessins brun rougeâtre. Pronotum avec deux taches longitudinales incurvées (a concavité du côté latéral) réunies le long de la ligne médiane. Sur chaque élytre une tache triangulaire assez grande à côté de l'écusson, une petite tache sur l'épaule, une telle sublatérale posthumérale, une très petite tache discale prémédiane, une large bande transversale médiane n'atteignant pas tout à fait le bord latéral, deux taches plus ou moins circulaires postmédianes: une discale et une sublatérale, et finalement une tache circulaire préapicale discale. Le tiers apical des tibias et les articles tarsairs 2 à 4 brun foncé, le tiers apical du scape également brun foncé.

Long. 4,5 mm; larg. 1,5 mm.

IV. LISTE DES LOCALITES

Afgoi: 2°8'30"N-45°7'35"E.
Afmadù: 0°31'3"N-42°3'59"E.
Alessandra = Labaddéy (île dans le fleuve Giuba à Nord-Ouest de Gelib).
Allengo: 2°40'N-42°30'E.



Fig. 13. — *Jordanoleiopus (Polymitoleiopus) monoxenoides* Breuning n. sp. Holotype.

Anole: 2°1'N-42°20'E.
Balad: 2°21'40''N-45°23'30''E.
Baidoa: 3°7'N-43°38'E.
Bardera: 2°20'N-42°16'E.
Barentù: 15°7'N-37°30'E.
Barire: 2°4'N-44°54'E.
Bender Casim: 11°17'23''N-49°10'39''E.
Berbera: 10°26'N-45°2'E.
Bosaso = Bender Casim.
Bud-Bud: 46°28'E-4°12'N.

Burbisciara (Somalie).
Bur Dinsor: 2°24'N-42°58'E.
Callis: 8°23'15"N-49°5'E.
Camp Awash (Awash National Park): 8°59'N-40°10'E.
Chisimaio: 0°22'40"S-42°33'E.
Dara Davò (peu de km au S de Run, moyenne vallée du Nogal).
Dembi: 8°5'N-36°27'E.
Dinsor: 2°24'18"N-42°58'40"E.
Dolo: 4°13'N-42°8'E.
Dusa Mareb: 5°32'N-46°24'E.
Eggi: 3°11'N-45°34'E.
El Bur: 4°40'N-46°37'E.
El Ure (Somalie).
Garoe: 8°24'26"N-48°28'50"E.
Gelib = Jilib: 0°29'N-0°46'30"E.
Genale: 1°48'N-44°42'E.
Geribran: 7°12'41"N-48°50'53"E.
Ghersale: 2°39'N-45°23'E.
Giauher = Giohar.
Giohar: 2°46'N-45°23'E.
Giuba: 0°12'S-42°40'E.
Giumbo: 0°15'S-42°47'E.
Hola Uager = Ola Uager.
Iscia Baidoa = Baidoa.
Javello: 4°54'N-38°6'E.
Jesomma: 4°3'N-45°44'E.
Jilib = Gelib.
Kalis = Callis.
Kismayu = Chisimaio.
Labaddéy = Alessandra.
Lindi (Tanzanie).
Lugh: 3°47'46"N-42°32'32"E.
Lugh Ganana = Lugh.
Lugh Ferrandi = Lugh.
Mahaddei Uen: 2°58'14"N-45°32'0"E.
Matagoi: 43°11'E-1°99'N.
Meldac (Bur): 1°51'N-42°56'E.
Mogadiscio: 2°1'58"N-45°20'56"E.
Moweka Moshi Diotz: 3°21'S-37°20'E.
Neghelli: 5°21'N-39°36'E.
Nova Choupanga (Mozambique).
Ola Uager: 1°11'S-41°34'E.

Run (Garoe): 8°48'N-48°52'E.
Setit (fleuve de l'Éthiopie).
Tana River (Kénya).
Tsavo National Park, West: 2°59'S-38°28'E.
Villabruzzi = Giohar.

SUMMARY

The authors have studied a large collection of Cerambycidae from Eastern Africa and described 3 new genera and 14 new species: *Tetropiopsis somaliensis* Villiers n. sp., *Brunoeme rufolimbata* Villiers n. gen. n. sp., *Linopteridius africanus* Villiers n. sp. (this genus was previously known only in Madagascar), *Thapsyrus martellii* Villiers n. gen. n. sp., *Thapsyrus quentini* Villiers n. sp., *Derolus* (*Derolus*) *somaliensis* Villiers n. sp., *Hololeprus sammichelii* Villiers n. sp., *Mimononymoides somaliensis* Breuning n. gen. n. sp., *Hyllisia somaliensis* Breuning n. sp., *Idactus somaliensis* Breuning n. sp., *Lasiopezus brunoi* Breuning n. sp., *Crossotus somaliensis* Breuning n. sp., *Sophronica bituberosoides* Breuning n. sp. and *Jordanoleiopus* (*Polymitoleiopus*) *monoxenoides* Breuning n. sp.

RIASSUNTO

Gli Autori hanno studiato una ricca collezione di Cerambycidae dell'Africa orientale ed hanno descritto 3 generi e 14 specie nuove: *Tetropiopsis somaliensis* Villiers n. sp., *Brunoeme rufolimbata* Villiers n. gen. n. sp., *Linopteridius africanus* Villiers n. sp. (il genere era prima d'ora noto solo del Madagascar), *Thapsyrus martellii* Williers n. gen. n. sp., *Thapsyrus quentini* Villiers n. sp., *Derolus* (*Derolus*) *somaliensis* Villiers n. sp., *Hololeprus sammichelii* Villiers n. sp., *Mimononymoides somaliensis* Breuning n. gen. n. sp., *Hyllisia somaliensis* Breuning n. sp., *Idactus somaliensis* Breuning n. sp., *Lasiopezus brunoi* Breuning n. sp., *Crossotus somaliensis* Breuning n. sp., *Sophronica bituberosoides* Breuning n. sp. e *Jordanoleiopus* (*Polymitoleiopus*) *monoxenoides* Breuning n. sp.

Dr. STEPHAN BREUNING
Dr. ANDRÉ VILLIERS
Muséum National d'Histoire Naturelle
Entomologie Générale et Appliquée
45 bis, Rue de Buffon
75 Paris V (France)

Monitore zool. ital. (N. S.) Suppl. IV: 247-294, 1972