

ENTOMOLOGIAE  
SYSTEMATICAЕ  
EMENDATAЕ ET AUCTAE.

---

TOM. I. PARS II

82. PRIONUS. *Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla cylindrica, integra.*

*Labium brevissimum, membranaceum.*

*Antennae setaceae.*

*longimanus* 1. P. thorace spinis mobilibus, elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longis.

Prionus longimanus. Oliv. Inf. 60. tab. 3. fig. 12.  
tab. 4. fig. 12.

Cerambyx longimanus. Linn. Syst. nat. 2. 621.  
Mus. Lud. Ulr. 64.

Degeer Inf. 5. 102. 6.

Sloan. Jamaic. 2. 209.

Grew. Mus. 161. tab. 13.

Roef. Inf. 2. Scarab. 2. tab. 1. fig. 2.

Aub. Miscell. tab. 64. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

*fuliginosus* 2. P. thorace crenato marginato unidentato ater  
elytris apice crenato dentatis, thorace canaliculato.

Habitat in America Mus. Britann.

Statura & summa affinitas P. lineati uti suadent antennae, pedes & gibber sterni. Differt

---

Prioni corpus magnum, oblongum, depresso,  
glabrum, tardum, capite magno, transverso, plano,  
inferto, oculis transversis, reniformibus, marginali-  
bus, antennis distantibus, elongatis, supra mandibu-  
las insertis, thorace plano, marginato: margine sae-  
pius dentato, scutello rotundato, elytris rigidis, for-  
nicatis, immarginatis, longitudine abdominalis, pedi-  
bus longiusculis, cursoriis, tarsis quadriarticulatis,  
colore obtuso.

tamen dente thoracis magis versus posteriora inserto & corpore atro, immaculato sola linea thoracis dorsali impressa, villosa, alba. Pedes & antennae mox nigrae, mox rufae.

3. P. thorace marginato unidentato rufo, mandibulis inflexis acutis, sterno spinoso.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Caput atrum, canaliculatum. Mandibulae magnae, inflexae, os obtegentes, acutae, atrae. Antennae piceae, corpore breviores: articulis ultimis valde ferratis. Thorax utrinque in medio obtuse dentatus, glaber, rufus, nitidus. Elytra obtusa, nigra. Pectus rufum sterno spina erecta, acuta. Pedes rufi.

4. P. thorace marginato crenato unidentato niger *lineatus*.  
albo vittatus elytris apice crenato dentatis.

*Cerambyx lineatus*. Linn. Syst. nat. 2. 624. 14.

Sloan. Jam. 209. tab. 237. fig. 34.

Brown Jam. 430. tab. 43. fig. 7.

Herbst Arch. tab. 32. fig. 1.

Habitat in America Mus. Britann.

Mandibulae breves, inermes. Thorax niger lineis tribus villosis, albis. Elytra nigra vitta media lata & parva marginali albis. Sternum antice gibbere elevato, obtuso, postice bifidum. Pedes ferruginei.

5. P. thorace marginato crenato unidentato cyaneo *nitidus*.  
aeneus elytris cupreis.

*Prionus nitidus*. Oliv. Inf. 66. tab. 12. fig. 48.

Habitat in Brasilia Mus. Dr. Hunter.

Antennae longae, cyaneae. Caput canaliculatum, viridiaeneum. Thorax planus: valde marginatus, crenatus denteque medio porrecto, acuto, arcuato, obscure aeneus. Elytra punctata, rufo

cuprea, obtusa. Pectus cyaneum. Abdomen viridi, aeneum, nitidum. Pedes cyanei.

*Faber.*

6. P. thorace marginato utrinque unidentato, elytris piecis, antennis mediocribus.

*Cerambyx Faber.* Linn. Syst. nat. 2. 622. 6.  
Fn. Sv. 646.

Frish. Ins. 13. 22. tab. 17.

Schaeff. Icon. tab. 72. fig. 3. tab. 111. fig. 1.  
Habitat in Europa rarius.

Mas. thorace magis laevi marginè crenato absque dente.

*scabricornis* 7. P. thorace submarginato unidentato subvillosus nigricans elytris fuscis: lineis duabus elevatis, antennis mediocribus:

*Prionus scabricornis.* Scopol. Carniol. 174.

*Cerambyx scabricornis.* Oliv. Ins. 66. tab. fig.

*Cerambyx scabricornis.* Fyssl. Ins. Helv. 13. 241.  
tab. 1. fig. 3.

Leptura nigra thorace subcylindrico. Geoff. Ins. 1. 210. 6.

Habitat in Europa australiori Mus. Dom. Olivier.  
Reliquis angustior. Thorax vix marginatus, subvillosus, in altero sexu sere inermis.

*depsarius.*

8. P. thorace submarginato unidentato pubescente, corpore nigricante, antennis brevibus rubris.

*Cerambyx depsarius.* Linn. Syst. nat. 2. 624. 12.  
Schaeff. Icon. tab. 67. fig. 3.

Habitat in Suecia Mus. Dom. Zschuck.  
Minor angustiorque P. coriaro.

*mucronatus*

9. P. thorace marginato bidentato, elytris mucronatis rufis.

Habitat in America Dom. Drury.

Corpus P. cervicorni paullo minus, Frons retusa antennis brevibus, compressis. Thoracis dorsum

bituberculatum. Elytra rufescentia, holosericea,  
acuminata.

10. P. thorace bidentato: dentibus arcuatis niger, *arcuatus*.  
elytris obtusis testaceis.

Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.

Antennae compressae, mediocres, nigrae. Thorax niger utrinque dentibus duobus validis, retrorsum arcuatis. Elytra testacea, basi obscuriora. Abdomen subtus ferrugineo holosericeum. Pedes picei, antici nigri.

11. P. thorace marginato tridentato niger elytris *maculatus*.  
cinereo maculatis.

Prionus maculatus. Oliv. Inf. 66. tab. 4. fig. 14.

Habitat in Senegalia Mus. Regis Galliae.

Major P. coriario. Mandibulae exsertae, dentatae. Antennae longitudine corporis nigrae. Thorax acute tridentatus. Elytra cinereo fere variegata.

12. P. thorace marginato utrinque tridentato, mandibulis porrectis extus unispinosis, antennis brevibus.

Prionus cervicornis. Oliv. Inf. 56. tab. 2. fig. 8.

Cerambyx cervicornis. Linn. Syst. nat. 2. 6.

22. 3. Mus. Lud. Ulr. 65.

Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 6. 265-94.

Merian Surin. tab. 48.

Roes. Inf. 2. scarab. 2. tab. 1. fig. 8.

Brown Jamaic. tab. 44. fig. 8.

Aubent. Miscell. tab. 90. fig. 3.

Habitat in Americae ligno bombaciis.

Larva edulis in deliciis.

Mandibulae magnae, intus dentatae, extus versus apicem spina unica, valida, acuta.

13. P. thorace utrinque tridentato ater nitidus antennis brevibus: articulis ultimis apice spinosis. *spicornis*.

Habitat — — Mus. Britann.

Medius. Mandibulae exsertae, forcipatae, nigrae medio interiori dente valido, acuto. Antennae mediocres, piceae, basi nigrae: articulis spina apicis valida, acuta longitudine articuli sequentis. Oculi maximi, aeneo nitiduli. Thorax angustus, acute unidentatus, obscure ferrugineus. Elytra apice parum ad suturam acuminata.

*buphtalmus* 14. P. thorace utrinque tridentato ater nitidus antennis brevibus: articulis ultimis apice spinosis.

*Hussarus Ceylonensis*. Voet. Scarab. 2. tab. 3, fig. 11.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Mandibulae exsertae, breves, arcuatae, medio interiori unidentatae, acutae. Antennae breves articulis obconicis: ultimis unispinosis. Oculi maximi fronte inter oculos sulcata. Thorax ater, nitidus antice dentibus duobus validis, acutis tertioque minori, potius margine postico tantum prominulo. Elytra glabra, atra, nitida, omnino inermia. Corpus nigrum pectore rufo. Basis abdominis acuta prominet.

*coriarius*. 15. P. thorace marginato tridentato, corpore piceo, antennis brevibus.

*Prionus coriarius*. Oliv. Inf. 66. tab. 1. fig. 1.

*Prionus*. Geoff. Inf. 1. 198. tab. 3. fig. 9.

*Cerambyx coriarius*. Linna. Syst. nat. 2. 622. 7.

Fn. Sv. 647.

*Cerambyx Prionus*. Degeer Inf. 5. 59<sup>1</sup>. tab. 3. fig. 5.

Roel. Inf. 2. Scarab. 2. tab. 1. fig. 1. 2.

Schaeff. Elem. tab. 102.

Icon. tab. 67. fig. 3. tab. 9. fig. 1.

Frisch Inf. 13. tab. 9.

Habitat in Europae Betulis putridis.

Cerambyx imbriconis. Linn. Syst. nat. 2. 624. 5.  
mera hujus varietas.

Lucanus tridentatus. Linn. Syst. nat. 2. 560. 3.  
hujus specimen mutilatum videtur.

Ova magna, oblonga, flavescentia.

16. P. thorace utrinque bidentato, corpore nigro, *giganteus*.  
elytris ferrugineis, anteninis brevibus.

Cerambyx giganteus. Linn. Mant. J. 531.

Oliv. Inf. 66. tab. 6. fig. 21.

Aubent. Miscell. 1. tab. 64. fig. 2.

Habitat Cajennae.

17. P. thorace marginato tridentato obscurus pectore *cylindricus*  
abdomineque ferrugineis, antennis brevibus.

Cerambyx unicolor. Drury Inf. I. tab. 37. fig. 1.

Habitat in America boreali Dom. Blackburn. D.G. 99-13-13

Antennae compressae. Caput & thorax nigra.

Elytra picea. Pectus & abdomen ferruginea.

Corpus magis cylindricum quam in reliquis.

18. P. thorace marginato utrinque quadridentato, *armillatus*  
elytris ferrugineis nigro marginatis.

Prionus armillatus. Oliv. Inf. 66. tab. 5. fig. 17.

Cerambyx armillatus. Linn. Syst. nat. 2. 622. 4.

Petiv. Gazoph. 525. tab. 15. fig. 6.

Habitat in India.

Maximus. Frons retusa. Mandibulae emarginatae.

Thorax lateribus rufescens. Elytra apice acuminata.

19. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis *Luzonum*.  
porrectis unidentatis apice bifidis, pedibus anticus elongatis.

Petit. Gazoph. tab. 74. fig. 1.

Habitat in Insulis Luzonum Mus. Britann.

- Antennae mediocres, nigrae: articulo 2. 3. 4. 5.**  
**subtus aculeatis. Mandibulae prominentes, basi**  
**unidentatae apiceque bifidae. Thorax glaber,**  
**niger margine spinis duodecim ciliato. Elytra**  
**mucronata, pallide ferruginea, basi subpunctata.**  
**Pedes antici scabri, subtus aculeati.**
- ferripes.* 20. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis  
 porrectis apice tridentatis, pedibus spinoso  
 ferratis.  
 Habitat in Africa aequinoctiali D. Banks.  
 Caput nigrum ore intus barbato. Mandibulae  
 validae, basi unidentatae, apice tridentatae. An-  
 tennae mediocres: articulo secundo subtus sca-  
 bro. Thorax ater, scaber margine spinis duo-  
 decim. Elytra subferruginea. Pedes omnes  
 valde ferrati.
- damicornis.* 21. P. thorace marginato denticulato, mandibulis  
 porrectis bidentatis, antennis brevibus.  
*Ceraunbyx damicornis.* Linn. Mant. 1. 532.  
 Degeer Ins. 5. 97. 2.  
 Drury Ins. 1. tab. 38, fig. 1.  
 Habitat in America.  
 Larva Americanis edulis.
- bifasciatus.* 22. P. thorace marginato denticulato, corpore nigro,  
 elytris rubris: fasciis duabus atris, antennis  
 brevibus. Linn. Syst. nat. 2. 624. 16.  
 Gronov. Zooph. 532. tab. 14. fig. 4.  
 Habitat in America.  
 Fascia elytrorum altera in medio, altera postica,  
 terminalis.
- Thomae.* 23. P. thorace marginato crenulato, corpore nigro,  
 elytris glabris ferrugineis: margine luteo.  
*Cerambyx Thomae.* Acta Soc. Berol. 4. tab. 7.  
 fig. 9.  
 Habitat in Insula St. Thomae America.

Elytra apice rotundata.

24. P. thorace marginato crenato albo bilineato, ely- *bilineatus*.  
tris ferrugineis: atomis albis margineque  
luteo.

Habitat in America Dom. v. Rohr.

Affinis praecedenti, a quo tamen differt thora-  
cis dorso lineis duabus albis, elytris atomis  
albis irroratis apice subspinosis.

25. P. thorace marginato crenato, capite submandi-*spinibarbis*.  
bulis spinoso scabro, mandibulis tridentatis.

*Cerambyx spinibarbis*, Linn. Syst. nat. 2. 624. 4.

Mus. Lud. Ulr. 67.

Merian Surinam. 24. tab. 24.

Habitat in America meridionali.

Mandibulae magnae; crassae, intus tridentatae,  
apiceque emarginatae.

26. P. thoracis lateribus scabris multidentatis: dente *palmatus*.  
posteriori palmato, antennis brevibus.

Habitat in Guinea Mus. Dom. Banks.

Statura & magnitudo P. spinibarbis. Caput ca-  
naliculatum, nigrum. Antennae breves, com-  
pressae, obscure piceae. Thoracis dorsum pla-  
num, laeve, nitidum, lateribus scabris: mar-  
gine multidentato; dente tertio ante apicem  
majori, palmato. Elytra laevia, picea; ad su-  
turam apice mucronata. Pedes intus ferrati.

27. P. thorace marginato crenato, mandibulis por-*maxillosus*.  
rectis intus hirsutis quadridentatis.

*Prionus maxillosus*, Oliv. Ins. 66. tab. I. fig. 3.

*Cerambyx maxillosus*, Drury Ins. I. tab. 38.

fig. 3.

Habitat in America Mus. Britann.

Minor P. melanopo, totus ater, nitens. Man-  
dibulae porrectae, acutae, intus hirsutae,

apice tridentatae basique unidentatae. Elytra  
apice mucronata.

*canalicula-* 28. P. thorace marginato crenato: canali dorsali  
*tus.* albo villoso, antennis brevibus.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dr. Hunter.  
Antennae breves, compressae, nigrae. Caput  
canaliculatum, nigrum, immaculatum. Tho-  
racis dorsum canali albo villoso. Scutellum  
albo villosum. Elytra subscabra. Pedes nigri.  
*cinnamo-*  
*meus.* 29. P. thorace marginato denticulato, mandibulis  
porrectis tridentatis.

*Cerambyx cinnamomeus.* Linn. Syst. nat. 2.  
623. 10. Mus. Lud. Ulr. 66.  
Oliv. Inf. 66. tab. 5. fig. 18.  
Drury Inf. 1. tab. 40. fig. 2.  
Salz. Inf. tab. 5. fig. 2.  
Merian Surinam tab. 24.  
Habitat in America meridionali.  
Duplo minor P. cervicorni.

*melanopus.* 30. P. thorace marginato dentato, mandibulis por-  
rectis multidentatis, elytris mucronatis.

*Cerambyx melanopus.* Linn. Syst. nat. 2. 623. 8.  
*Cerambyx crenulatus.* Drury Inf. 1. tab. 38.  
fig. 2.

Merian Surinam. tab. 24. fig. 1.  
Habitat in America meridionali.  
Affinis P. maxilloso.

*spinosus.* 31. P. thorace multidentato nigro. elytris uniden-  
tatis testaceis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.  
Caput canaliculatum. Antennae breves, com-  
pressae, nigrae. Thorax vix marginatus, subtus  
cinereo hirtus dorso canaliculato.

*barbatus.* 32. P. thorace marginato integro, mandibulis ferru-  
gineo hirsutissimis, antennis mediocribus.

Habitat in America meridionali Mus. Dom. Banks.  
 Antennae scabrae: articulo ultimo compresso,  
 laevi. Caput atrum mandibulis porrectis la-  
 biisque ferrugineo hirsutissimis. Elytra picea.  
 Abdomen villoso album. Pedes nigri.

33. P. thorace submarginato mutico testaceus, anten- *peclinicora*  
 nis brevibus peclinatis. Oliv. Inf. 66. tab. nis.

Habitat in Senegal Mus. Geoffroy.

Reliquis minor & thorax minus marginatus,  
 muticus, totus testaceus. Antennae corpore  
 breviores, valde peclinatae. Mandibulae ex-  
 fertae, in medio unidentatae.

83. CERAMBYX. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla obtusa, unidentata.*

*Labium bifidum.*

*Antennae setaceae.*

1. C. thorace spinoso viridis nitens antennis medio- *moschatus*.  
 cribus cyaneis.

Cerambyx moschatus. Linn. Syst. nat. 2. 627.

34. Fn. Sv. 652.

Cerambyx moschatus. Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 7.

Cerambyx odoratus. Degeer Inf. 5. 64. 2.

Geoff. Inf. 1. 103. 5.

Cerambycis corpus oblongum, angustum, depre-  
 siuscum, glabrum, immarginatum, tardum, capite  
 ovato, inserto, oculis parvis, rotundatis, lateralibus,  
 antennis elongatis, inter oculos insertis, thorace  
 rotundato, plano, inaequali, utrinque spinoso, scu-  
 tello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine  
 abdominalis, pedibus longiusculis, cursoriis, femori-  
 bus compressis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

Geoff. Inf. 1. 103. 5.  
 Frish. Inf. 13. tab. 11.  
 Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 7. tab. 55. fig. 1.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 14.  
 Habitat in Europae Salice.

*virens.* 2. *C.* thorace rotundato spinoso, corpore viridi, femoribus rufis.

*Cerambyx virens.* Linn. Syst. nat. 2. 627. 33.

Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 78.

Drury Inf. 1. tab. 40. fig. 1.

Brown Jamaic. tab. 43. fig. 8.

Habitat Larva in truncis Amyris balsamiferae.  
 Imagō Eugeniam Jambos spirat. Dr. Schwarz.

Variat antennis corpore longioribus & brevioribus, femoribus dentatis & muticis.

*nitens.* 3. *C.* thorace rotundato subspinoso viridi nitens femoribus clavatis: clava anticorum rufa.

*Cerambyx nitens.* Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 107.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 15.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.  
 Antennae corpore duplo longiores, nigrae. Thorax subspinosis. Corpus totum viride, nitens. Pedes nigri femoribus omnibus clavatis, clava quatuor anteriorum ferruginea. Tibiae posticae compresiae.

*afer.* 4. *C.* thorace rotundato spinoso, corpore viridi, antennis pedibusque rufis.

*Cerambyx afer.* Linn. Mant. 532.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 4.

Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 141.

Habitat in Africa Dr. Solander.

Duplo minor *C. virente.* Frons retusa. Antennae corpore vix longiores, rufae. Thorax spinosus, rugosus. Elytra attenuata, viridia sutura nitida.

diore. Pedes omnes rufi femoribus quatuor anticus clavatis.

5. C. thorace spinoso viridi, elytris violaceis basi *festivus*.  
viridibus. femoribus ferrugineis unidentatis.

Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 44. tab. 18. fig. 44.

Habitat ad fluvium Gaboon Africæ Mus. Dom.  
Banks.

Antennae mediocres, nigrae primo articulo rufo.

Labium superius subrufum. Thorax utrinque spinis duabus obtusis: posteriori majori. Femora unidentata, ferruginea. Tibiae fuscae.

6. C. thorace spinoso viridis nitens thorace elytris-  
que nigro lineatis. *vittatus*.

Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 10.

Voet, Coleopt. 2. tab. 10. fig. 41.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax spinosus,  
inaequalis lineis duabus dorsalibus, atris. Elytra  
obtusa, viridia lineis duabus longitudinalibus,  
atris. Femora inermia, rufa. Tibiae nigrae.

7. C. thorace spinoso niger: vitta atra. *velutinus*.

Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 41.

Voet Coleopt. 2. tab. 10. fig. 40.

Habitat in America Dr. Schulz.

Antennae mediocres. Corpus nigrum. Elytra ob-  
tusa, nigra vitta dorsali velutina, atra. Tibiae  
posticae compressae, apice spinosae.

8. C. thorace spinoso holofericeo ater elytris sutura *sericeus*,  
vittaque viridibus, femoribus rufis.

Cerambyx sericeus. Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 37.

Habitat in Brasilia Mus. Dr. Olivier.

Antennae mediocres, nigrae. Caput & thorax,  
atra, velutina, viridi nitido maculata. Pedes  
atri femoribus rufis, posticis tantum ad dimi-  
diuum. Tibiae posticae compressae.

*futuralis.*

9. C. thorace spinoso ater elytris futura vittaque media aureis.

Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 40.

Voet. Coleopt. 2. tab. 10. fig. 42. 43.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

Antennae mediocres, nigrae. Corpus atrum quasi velutinum abdome subtilis coerulescente, nitido. Elytra atra futura dorsali vitta que media, quae postice coeunt, aureis. Pedes nigri femoribus clavatis, postici semoribus tibiisque compressis.

*elegans.*

10. C. thorace spinoso capiteque viridi aeneis nitidis, elytris obscuris, antennis longis pedibusque rufis.

*Cerambyx elegans.* Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 35.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Mus. Dom. Olivier.

Statura omnino C. aser. Antennae corpore duplo longiores, rufae. Caput & thorax viridi, aenea, nitida. Elytra obscura. Corpus pubescens, rufo aureum. Pedes rufi posticis compressis.

*latipes.*

11. C. thorace spinoso depresso virescens elytris cupreis, tibiis compresso dilatatis.

*Cerambyx latipes.* Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 116.

*Cerambyx latipes* thorace spinoso viridi aeneo, antennis medioribus, elytris obscure purpureis, tibiis posticis latissimis compressis. Degeer Inf. 7. 655. 60. tab. 49. fig. 3.

Fyfl. Arch. 7. 1. 169. 12. tab. 45. fig. 11.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Statura C. moschati. Antennae mediocres, virescentes. Elytra cuprea margin parum virescente.

12. C. thorace subspinoso cyaneo viridis antennis longipes,  
longioribus, femoribus clavatis.

Saperda longipes Mant. Inf. 1. 148. 16.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 3.

Cerambyx fusiformis. Degeer Inf. 7. 657. 62.  
tab. 49. fig. 7.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Antennae corpore duplo longiores, cyaneae, apice  
obscure. Pedes elongati, cyanei femoribus  
clavatis. Thorax & elytra magis viridia.

13. C. thorace spinoso ater elytris maculis tribus *interruptus*  
linearibus albis, antennis brevibus.

Cerambyx interruptus. Oliv. Inf. 67. tab. 17.  
fig. 133.

Habitat — — Mus. Dr. Olivier.

Antennae corpore breviores. Corpus atrum.  
Elytra macula linearis baseos duabusque in me-  
dio transversis, albis. Pedes postici longiores  
tibiis compressis.

14. C. thorace spinoso rugoso niger elytris rotun- *Cerdo.*  
datis, antennis longis.

Cerambyx Cerdo. Linn. Syst. nat. 2. 629. 39.

Cerambyx Cerdo. Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 65.

Geoff. Inf. 1. 201. 2. 25-69

Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europa.

15. C. thorace spinoso rugoso niger elytris subspi- *Heros.*  
nosis piceis, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 200. 1.

Frisch. Inf. 1. 13. tab. 8.

Drury Inf. 1. tab. 49. fig. 1.

Voet. Coleopt. 2. tab. 5. fig. 9.

Ross. Fn. Etr. 1. 141. 358.

Habitat in Europae Quercu.

*spinicornis.* 16. C. thorace subspinoso niger, elytris viridibus apice spinosis.

Cerambyx torridus. Oliv. Inf. 67. tab. 14.  
fig. 95.

Habitat in Sierra Leon Africæ Mus. D. Banks.  
Antennæ longæ, nigrae articulo 3. 4. 5. 6.  
apice spinosis. Thorax niger utrinque tuberculis tribus: lateralibus obtusis. Elytra viridia, nitida, apice spina acuta armata. Pedes nigri femoribus clavatis, subferrugineis.

ater.

17. C. thorace subspinoso ater antennis mediocribus rufo nigroque annulatis.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 32.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Olivier.  
Praecedentibus paullo minor. Antennæ mediores articulis basi rufis, apice nigris. Corpus atrum pectore cinereo, nitido. Pedes nigri femoribus basi rufescentibus, postici elongati.

Batus.

18. C. thorace rugoso subspinoso, elytris apice spinosis, antennis longis uncinato aculeatis.

Cerambyx Batus. Linn. Syst. nat. 2. 615. 20.  
Mus. Lud. Ulr. 69.

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 32.

Mus. Petrop. 652. 154.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

C. Heros paullo minor, fuscus.

ferrugineus. 19. C. thorace acute spinoso rugoso niger elytris ferrugineis, antennis longis.

Cerambyx ferrugineus. Linn. Syst. nat. 2. 626.  
25. Mus. Lud. Ulr. 70.

Oliv. Inf. 67. tab. 18. fig. 134.

Cerambyx gigas. Mant. Inf. 1. 132. 20.

Habitat in India orientali Dom. de Schlanbusch.  
Corpus totum nigrum elytris ferrugineis.

20. *C. thorace spinoso, coleoptris fascia maculisque alpinus.*  
quatuor atris, antennis longis.

*Cerambyx alpinus.* Linn. Syst. nat. 2. 628. 35.

Fn. Sv. 654.

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 58.

Geoff. Inf. 1. 202. 4.

Scheuhz. Itin. 1. tab. 1. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. d.

Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 5.

Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 38.

Habitat in Europae montosis.

21. *C. thorace spinoso fuscus: linea longitudinali scalaris.*  
alba, antennis longis.

Habitat in America meridionali Domi Banks.

Antennae corpore triplo longiores. Caput fuscum orbita oculorum lineaque dorsali albis.

Thorax acute spinosus, fuscus linea dorsali alba.

Elytra fusca puncto medio suturaque dentata albis. Pedes fusci.

22. *C. thorace spinoso viridi aenesci elytris testaceis,* antennis brevibus.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. D. Hunter.

Antennae breves, serratae, nigrae. Thorax inaequalis, immaculatus.

23. *C. thorace bispinoso rugoso ater antennis longioribus ferrugineis.* *Morio.*

Habitat Cajennae Dr. Hunter.

Antennae corpore duplo longiores articulis cylindricis, ferrugineis 1. 2. totis, 3. 4. 5. basi nigris. Thorax rugosus utriunque spinis duabus: posteriore majore. Elytra laevia, basi impressa, apice truncata.

24. *C. thorace spinoso niger elytris sanguineis: macula nigra.* Linn. Syst. nat. 2. 631. 50. *Kaehleri.*

Geoff. Inf. 1. 204. 6.

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 1. tab. 153. fig. 4.

Herbst Arch. 9. tab. 25. fig. 6.

Habitat in Europa australiori.

Thorax variat immaculatus & macula laterali rufa. Elytra apice emarginata.

*Lundii.*

25. C. thorace spinoso sanguineus antennis elytrorum apicibus ab domine pedibusque nigris. Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund. Statura & magnitudo praecedentis. Antennae breves, nigrae. Caput sanguineum mandibulis nigris. Thorax gibbus, spinosus, sanguineus, immaculatus. Scutellum atrum. Elytra laevia, sanguinea, apice late atra. Pectus sanguineum. Abdomen nigrum tuberculo acuto, rufo inter pedes secundi paris. Pedes atri semoribus subclavatis.

*Desfontai-* 26. E. thorace spinoso sanguineo nigro maculato ater elytris sanguineis basi apiceque atris, antennis longissimis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura omnino C. Kaehler. Caput atrum antennis longissimis. Thorax spinosus, sanguineus maculis baseos medioque interdum lineis nigris. Elytra laevia macula baseos parva, apicis magna atris. Corpus atrum immaculatum.

*succinctus.* 27. C. thorace bispinoso rugoso, elytris fascia flava, antennis longioribus compressis. Linn. Syst. nat. 2. 627. 32. Mus. Lud. Ulr. 72.

Cerambyx fusco castaneus. Degeer Inf. 5. 113.

14. tab. 14. fig. 5.

Oliv. Inf. 68. tab. 7. fig. 43.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 2.

Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 17.

Habitat in America, Brasilia.

28. C. thorace subspinoso rugoso ferrugineus ely-*striatus*,  
tris flavo striatis, antennis longis. Oliv. Inf.  
67. tab. 10. fig. 71.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Antennae cylindricae, corpore duplo longiores,  
ferrugineae, apice nigrae. Caput ferrugineum  
. punctis tribus verticalibus nigris. Thorax ru-  
gosus utrinque spinis duabus, fere aequalibus,  
ferrugineis, nigro punctatus. Scutellum apice  
nigrum. Elytra laevia, ferruginea striis qua-  
tuor flavis, quae apicem haud attingunt &  
quinta futurali, abbreviata. Femora apice  
nigra.

29. C. thorace bispinoso rufo, elytris laevibus ni-*rufipes*.  
gris, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 3. tab. 13. fig. 89.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Antennae corpore longiores, flavescentes arti-  
culorum apicibus ferrugineis. Thorax bispino-  
sus spina posteriore validiore. Elytra glabra,  
nitida puncto magno baseos impresso. Pedes  
flavescentes femoribus apice nigris. Abdomen  
nigrum.

30. C. thorace bispinoso rugoso flavus nigro puncta-*dimidiatus*.  
tus elytris nigris basi flavis, antennis me-  
diocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 96.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Antennae flavae. Caput flavum punctis tribus  
verticalibus, flavis. Thorax spinis duabus po-  
steriore majore flavus, nigro punctatus. Scu-  
tellum flavum, apice nigrum. Elytra glabra,  
nitida, atra, basi ad futuram flava. Corpus  
flavum abdome dimidiato, atro. Pedes flavi.

- bicolor.* 31. C. thorace bispinoso tuberculatoque ferrugineus elytris ultra dimidium abdomineque atris.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 61.  
 Voet Coleopt. 2. tab. 8. fig. 24.  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Antennae mediocres, basi ferrugineae, in medio flavae, apice fuscae. Caput ferrugineum gula prominente, acuta. Elytra basi ferruginea pnncto magnō impresso, apice atra. Pedes ferruginei.
- depressus.* 32. C. thorace multispinoso depresso niger cinereo variegatus elytris acuminatis, antennis longis.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 30.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 5.  
 Voet Coleopt. tab. 13. fig. 55. 56.  
 Habitat in Americae Insulis Dom. Banks.  
 Caput nigrum maculis impressis, cinereo villosis.  
 Thorax utrinque spinis quatuor ant quinque brevibus, approximatis villis cinereis variegatus. Elytra striata, acuminata, nigra maculis cinereis & in his puncta atra. Pedes atri.
- fasciatus.* 33. C. thorace spinoso cyaneus elytris fascia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 4.  
 Pall. Inf. tab. F. fig. 4.  
 Voet. Colecpt. 2. tab. 11. fig. 49.  
 Herbst Arch. 5. tab. 25. fig. 3.  
 Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.  
 Antennae compressiae, cyaneae articulis quatuor penultimis flavis, ultimo cyaneo. Pedes cyanei, postici compressi.
- barbicornis.* 34. C. thorace spinoso, antennarum quatuor primis articulis nigro barbatis, corpore testaceo nigro variegato. Linn. Syst. nat. 2. 625. 18.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 48.

Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 37.

Habitat in India orientali.

35. C. thorace spinoso, elytris punctis fasciisque nebulosus.  
nigris, antennis longioribus. Linn. Syst. nat.

2. 627. 29. Fn. Sv. 650.

Oliv. Inf. 66. tab. 7. fig. 47.

Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 9.

Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 4.

Geoff. Inf. 1. 204. 7.

Degeer Inf. 5. 71. 8.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. c.

Habitat in Abietum truncis.

36. C. thorace spinoso fulvo villoso, elytris nigris: obscurus.  
macula postica villosa fulva, antennis medio-  
cribus.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Statura & magnitudo C. nebulosi. Antennae  
longitudine corporis: articulis baseos ferrugi-  
neis. Caput & thorax fulvo villosa, immacu-  
lata. Elytra subscabra, nigra macula postica  
villoso fulva. Pedes nigri tibis flavescentibus.

37. C. thorace spinoso fusco, elytris laevibus: fas- griseus.  
ciis griseis nigro punctatis, antennis lon-  
gissimis.

Habitat in Germania D. de Loewenskiold.

Nimis affinis C. nebuloso at major. Antennae  
corpoce triplo longiores: articulis basi cinereis,  
apice nigris. Caput & thorax fusca, vix macu-  
lata. Elytra obscura fascia baseos, media api-  
cisque cinereis, nigro punctatis. Sutura punctata.  
Corpus cinereum. Femora nigro punctata.  
Tibiae apice nigrae.

38. C. thorace spinoso griseus elytris lineis eleva- costatus.  
tis nigro punctatis apice fuscis, antennis lon-  
gissimis.

Habitat in Germania Dom. de Loewenskiold.  
 Statura & summa affinitas praecedentis. Antennae corpore duplo longiores, nigrae articulis basi albidis. Caput & thorax grisea thorace unispinoso. Elytra punctata lineis elevatis quatuor nigro punctatis, quae tamen apicem haud attingunt, basi grisea, apice fusca. Pedes grisei.

- fasciculatus.* 39. C. thorace spinoso, elytris integris: punctis tribus hispidis, antennis medicoribus hirtis. Panz. Naturf. 24. 26. 34. tab. 1. fig. 44.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Caput & thorax fusca. Elytra basi pallidiora, apice omnino integra. Pedes grisei.

- hispidus.* 40. C. thorace spinoso, elytris basi albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis. Linn. Syst. nat. 2. 627. 30. Fn. Sv. 651.

Geoff. Inf. 1. 206. 9.

Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 77.

Schaeff. Icon. tab. 176. fig. 5.

Frisch. Inf. 13. tab. 16.

Degeer Inf. 5. 71. 9. tab. 3. fig. 17.

Habitat in Europa boreali.

- pilosus.* 41. C. thorace bispinoso, elytris griseis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis.

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 60.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Praecedente minor. Elytra punctis tribus elevatis hispidis grisea basi parum pallidiora, apice unidentata.

- balteatus.* 42. C. thorace subspinoso brunneus elytris fascia fusca.

Cerambyx balteatus. Linn. Syst. nat. 2. 627. 31.

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 124.

Habitat in Lusitania.

Statura & magnitudo praecedentium. Antennae breves. Thorax spina obtusa sive potius angulo prominente. Elytra fascia lata, fusca.

43. C. thorace inermi rugosissimo niger antennis *rugicollis*. mediocribus pedibusque piceis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Antennae compressae, piceae. Elytra nigra, apice obtusa & fere truncata. Pedes picei.

44. C. thorace mutico rufus elytris testaceis: macula nigra, antennis brevibus.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Medius. Antennae villosae, rufae, corpore breviores. Caput & thorax villosa, rufa, immaculata. Thorax inaequalis, tuberculatus, at haud spinosus. Elytra punctata, testacea macula magna ante medium nigro violacea. Pedes testacei.

45. C. thorace subspinoso rufus elytris testaceis *splendidas*. basi atro cyaneis, antennis brevibus.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura & magnitudo omnino C. 2 maculati.

Antennae breves, basi rufae, medio testaceae, apice fuscae. Caput punctatum, rufum, immaculatum. Thorax rotundatus, punctatus, rufus utrinque spina brevi, obtusa. Elytra striis tribus elevatis laevibus: testacea basi late atro cyanea. Corpus villosum, rufum abdomine subtus dente prominulo canali thoracis correspondente. Pedes rufi.

46. C. thorace inermi: dorso plano, corpore fusco *longicornis* griseo que vario, antennis longissimis.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Antennae corpore triplo longiores, nigrae articulis basi cinerascentibus. Caput cinereum basi lineaque laterali nigris. Thorax omnino iner-

mis dorso plano & fere impresso, fusco cinereoque varius. Elytra punctato striata. Corpus cinereum.

*marginalis* 47. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine omni nigro,

Habitat ad Cap Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, piceae. Caput fuscum.

Thorax ovatus, fuscus margine antico & postico nigris. Elytra laevia, subtestacea sutura margineque tenuissime nigris. Pedes nigricantes.

*brevicornis* 48. C. thorace inermi viridi, elytris obscuris, antennis brevibus nigris.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 22.

Habitat in Sierra Leon Africæ Mus. D. Banks.

Caput viride antennis brevibus, compressis; nigris. Thorax punctatus, viridis, nitens. Elytra laevia, viridia, obscura. Pedes nigri femoribus clavatis, anticus quatuor rufis, posticis viridibus.

*invencus*. 49. C. thorace inermi rugoso, elytris acuminatis nigris lanuginoso canescens, antennis longissimis. Linn. Syst. nat. 2. 631. 53.

Habitat in America.

Antennæ corpore sesquilociores. Thorax valde rugosus.

*holosericus*. 50. C. thorace inermi rugoso griseus elytris unidentatis holosericeis fusco cinereoque micantibus, antennis medicoribus.

Oliv. Inf. 62. tab. 17. fig. 127.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Caput griseum. Thorax inermis, rugosissimus, obscurus. Elytra unispinosa, holosericea, fusco cinereoque micantia, nitida. Corpus subtus micans.

51. *C. thorace inermi subrugoso cinereus immaculatus antennis longissimis.*  
*Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.*  
*Statura elongata praecedentium. Antennae corpore duplo longiores, cinerascentes. Caput magnum, prominens, cinereum. Elytra apice obtusa & fere emarginata. Corpus cinereum.*
52. *C. thorace inermi elongato cylindrico niger ferrugineo irroratus antennis longissimis.*  
*Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 73.*  
*Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.*  
*Caput fuscum antennis corpore duplo longioribus. Thorax elongatus, cylindricus, antice parum angustatus, nigricans. Scutellum ferrugineum. Elytra nigra, ferrugineo irrorata. Pedes fusi tibiis quatuor anticis apice unidentatis. Digi antici subtus villosi.*

84. LAMIA. *Palpi quatuor filiformes.*  
*Maxilla cornea, bifida.*  
*Labium corneum, bifidum.*  
*Antennae setaceae.*

1. *L. thorace acute spinoso rugoso, elytris cinereis: gigas.*  
*macula marginali nigra, basi bituberculatis scabris, antennis longis.*

*Oliv. Inf. 67. tab. 23. fig. 91.*

---

Lamiae corpus cylindricum, rotundatum, glabrum, immarginatum, tardum, capite magno, obtuso, declivi, inter antennas canaliculato, oculis magnis, rotundatis, lateralibus, prominulis, antennis elongatis, approximatis, inter oculos insertis, thorace cylindrico, spinoso, inaequali, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus validis, curvoriis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

Habitat in Guinea Mus. Dom. Banks.

Magna. Antennae corpore duplo longiores, pallide testaceae. Caput magnum, obscurum mandibularum margine laterali excavato. Thorax rotundatus, rugosus spina utrinque valida, erecta, acuta. Elytra grisea macula magna laterali nigra, basi punctis elevatis scabra tuberculisque duobus magnis oblongis, obtusis, apice acuminata. Corpus fuscum. Tibiae secundi paris unidentatae.

**Tribulus.** 2. L. thorace quadrispinoso, scutello elytrisque spinosis, antennis longioribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 100.

Habitat ad fluvium Gaboon Africæ Dr. Solander.

Antennae corpore longiores, fuscae articulis basi cinereis. Caput fusco cinereoque varium. Thorax rotundatus spinis quatuor erectis: lateralibus acutioribus. Puncta duo cinerea ad basin spinarum intermedianarum. Scutellum parvum, rotundatum denticulis duobus, brevibus, erectis. Elytra fusco cinereoque variegata, basi versus marginem exteriorem gibbere bispinoso armata, versus futuram spinae due, validae, erectae, acutae. In medio elytri spina sensim elevata, recumbens, acuta. Apex acuminatus denticulo brevi, acuto. Pedes fusco nigroque variegati. Tibiae intermediae apice tubculo parvo notantur.

**fronticornis** 3. L. thorace spinoso, frontis cornu porrecto apice emarginato recurvo, antennis longis.

**Cerambyx** 2. punctatus. Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 2.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae longae, fuscae articulis apice nigris.  
 Caput fuscum mandibulis atris, nitidis. Frontis cornu porrectum, crassum, fuscum, supra planum, hirtum, apice late emarginatum apicibus recurvis, atris. Thorax spinosus, subrugosus, fuscus, supra immaculatus, subtus vero utrinque linea lata, alba. Elytra fusca, glabra basi punctis aliquot elevatis scabra, ante medium maculae duae ocellares, atrae, exteriori minori & pone hanc macula major, albida. Abdomen & pedes fusca.

4. L. thorace elytrisque spinosis, femoribus anticis *pedicornis*.  
 cornutis.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 119.

Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.

Caput griseum antennis villosis, mediocribus.  
 Thorax rotundatus, griseus spinis sex brevibus,  
 dorsalibus, erectis. Scutellum inerme. Elytra  
 grisea macula marginali lunata fasciaque media  
 cinerea. Spinae plurimae, breves, erectae, atrae  
 ad basin. Pedes grisei, femoribus anticis cornu  
 elongato, arcuato, acuto.

5. L. thorace quinquespinoso, elytris fasciculato *hystrix*.  
 pilosis, antennis mediocribus ferratis.

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 110.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae pilosae, apice valde ferratae, testacea articulis apice fuscis. Caput pilosum, griseum. Thorax spinis quinque erectis,  
 validis, atris: intermedia paullo minori.  
 Praeterea tubercula duo elevata, atra ante spina  
 intermedium. Elytra fasciculato pilosa,  
 carneo fuscoque variegata. Corpus parvum,  
 cinereum.

*crista.*

6. *L. thorace acute spinoso grisea elytris basi tuberculo compresso tridentato.*

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 101.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae corpore paullo longiores, cinereae articulis apice nigris. Thorax utrinque spina acuta armatus & sub spina punctum fulvum. Elytra antice grisea tuberculo magno, compresso, tridentato, postice pallida striga parva, obliqua, nigra. Femora clavata, nigra: clava grisea. Tibiae griseae, apice nigrae.

*ambulator.*

7. *L. thorace antice utrinque bispinoso, corpore nebuloso.*

Petiv. Gazoph. tab. 37. fig. 6.

Habitat in Insulis Luzonum Mus. Britann.

Antennae teste Petiverio mediocres. Thorax castaneo cinereoque nebulosus, antice spinis duabus brevibus una supra alteram armatus. Elytra cinereo castaneoque nebulosa.

*textor.*

8. *L. thorace spinoso, elytris convexis atris, antennis mediocribus.*

*Cerambyx textor.* Linn. Syst. nat. 2. 629. 41.

Fn. Sv. 656.

Geoff. Inf. 1. 201. 3.

Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 39.

Degeer Inf. 5. 64. 3.

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 1.

Habitat in truncis arborum Europae.

*vaginator.*

9. *L. thorace spinoso rugoso nigra elytris emarginatis ferrugineis, antennis mediocribus.*

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Antennae compresiae, ferrugineae. Thorax rugosus, acute spinosus, niger. Scutellum cinereo villosum. Elytra laevia, ferruginea; basi gibba, apice emarginata. Subtus cinereo villosa.

**xo.** *L. thorace spinoso nigra elytris vitta semicirculari punctoque marginali cinereis, antennis longis.*

Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 68.

Habitat — — Mus. Dom. Olivier.

Corpus magnum, obscure nigrum. Antennae corpore duplo longiores. Thorax acute spinosus utrinque linea obliqua, obsolete ferruginea. Elytra vitta lata cinerea, quae ad basin incipit, in medio ad suturam excurrit & apicem texit. Punctum parvum in medio marginis exterioris. Pedes nigricantes.

**xi.** *L. thorace spinoso nigra antice fasciis postice pulchra.*  
punctis viridibus, elytris basi mucronatis.

*Cerambyx pulchra.* Drury Inf. 1. tab. 32.  
fig. 6.

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 6.

Habitat in Africa Dom. Drury.

Pulcherrima, nitida. Antennae corpore paullo longiores, nigrae. Caput nigrum striis tribus viridibus, quarum laterales oculos ambient. Thorax obtuse spinosus strigis tribus viridibus, quarum intermedia curvata, & in curvatura striga parva, abbreviata ejusdem coloris. Elytra punctata basi denticulis duobus elevatis, truncatis mucronata, antice fasciis duabus, postice punctis numerosis sparsis viridi nitentibus. Subtus nigro viridiisque variegata.

**x2.** *L. thorace spinoso viridi fasciato, elytris viridi regalis.*  
irroratis maculisque tribus fulvis.

Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 24.

Brown. Illustr. tab. 50. fig. 1.

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

Antennae corpore longiores, nigrae. Caput atrum, viridi lineatum maculaque suboculari fulva. Thorax ater fasciis tribus impressis, viridibus. Elytra substriata, nigra atomis numerosissimis viridibus & praeterea maculis tribus fere marginalibus, fulvis. Subtus viridis abdome utrinque linea punctorum fulvorum.

*undata.*

13. L. thorace mutico cinerea thorace fascia elytris duabus undatis atris.

Oliv. Inf. 671. tab. 4. fig. 26.

Habitat — — —

Magnitudo L. regalis. Antennae corpore longiores, nigrae. Thorax muticus, griseus fascia media, atra. Elytra grisea fasciis duabus undatis, atris.

*irrorata.*

14. L. thorace spinoso fusco ferrugineo que vario, elytris nigris ferrugineo irroratis, antennis mediocribus.

Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 18.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Corpus medium. Antennae mediocres, cinerascentes. Caput fusco ferrugineo que varium mandibulis atris, nitidis. Thorax spinosus, fuscus, ferrugineo varius. Scutellum ferrugineum. Elytra fusca, ferrugineo irrorata, apice acuminata. Corpus & pedes variegata.

- nigricornis.* 15. L. thorace mutico grisea elytris dorso planis, antennis brevibus nigris.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Corpus griseum, supra testaceo mixtum. Elytra dorso plana punctis aliquot marginalibus baseos atris, impressis, apice obtusa & fere truncata.

*aedilis.*

16. L. thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longis.

Cerambyx aedilis. Mant. Inf. 1. 130. 1. Linn.

Syst. nat. 2. 628. 37. Fn. Sv. 653.

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 59.

Degeer Inf. 5. 66. 5. tab. 4. fig. 1. 2.

Frisch. Inf. 13. tab. 12.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 27.

Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 7.

Habitat in Truncis arborum Europae borealis.

17. L. thorace spinoso tuberculatoque cinerea elytris fuscis variis punctis elevatis nigris scabris, antennis longis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino L. aedilis at minor. Antennae

corporis longiores, cinereo nigroque variae.

Thorax spinosus dorsoque quadrituberculato.

Elytra cinereo fuscisque varia lineis quatuor

elevatis postice coeuntibus, quae tamen apicem

haud attingunt punctisque numerosis, elevatis,

atris irrorata. Corpus cinereum atomis nigris,

numerosis.

18. L. thorace spinoso tuberculatoque, corpore nigro cinereoque vario, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Cer. nebulosus* D. 4-71.

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 16.

Ross. Fn. Etr. 1. 142. 360.

Habitat in Europa australiori Mus. D. Zschuck.

Antennae cinereo nigroque annulatae. Caput

fuscum. Thorax spinosus dorsoque trituberculato.

Elytra rotundata. Corpus subitus nigrum.

Femora omnia clavata, nigricantia.

Tibiae atrae cinereo annulatae. Tarsi cinerei.

19. L. thorace spinoso tuberculatoque, elytris porosiss., antennis longis articulo quinto unidentato. Linn. Syst. nat. 2. 625. 22. *araneiformis.*

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 34.

- — —
- Drury Inf. 2. tab. 35. fig. 4.  
 Sloan. Jamaic. 2. tab. 237. fig. 24.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 33. 34.  
 Habitat in America meridionali.
- punctata.* 20. L. thorace spinoso fusca albo punctata.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 42.  
 Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.  
 Statura & magnitudo omnino L. aedilis. Antennae mediocres, nigrae. Caput nigrum punctis duobus supra labium duobusque verticalibus, albis. Thorax spinosus tuberculatusque punctis duobus majoribus utrinque ad marginem quatuorque parvis dorsalibus albis. Elytra nigra punctis albis sparsis.
- nodosa.* 21. L. thorace spinoso, elytris cinereis nigro maculatis, antennis longissimis: articulo tertio apice nodoso.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 103.  
 Habitat in Marylandia Mus. Britann.  
 Antennae corpore quadruplo longiores : articulo tertio gibbere rotundato, obtuso, prominente. Elytra plana, rotundata, cinerea maculis aliquot oblongis, nigris, basi punctata.
- cancriformis.* 22. L. thorace multidentato: dorso plano, elytris tibiisque anticis unidentatis.  
 Cerambyx pustulatus. Drury Inf. 2. tab. 35. fig. 1.  
 Habitat in Jamaica.  
 Antennae longiores articulo primo apice unidentato. Thorax cinereus dorso valde explanato, margine dentibus quinque vel sex minoribus, in duabus seriebus digestis. Elytra cinerea, punctis elevatis fuscis irrorata, apice unidentata. Femora clavata tibiis anticis unidentatis.

23. L. thorace spinoso tuberculatoque, elytris pun-tuberculata.  
 Etatis spinosisque, antennis longis.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 114.  
 Habitat in Jamaica Mus. Dr. Hunter.  
 Corpus griseum elytris fascia angulata alba.  
 Antennae fuscae articulis apice cinereis. Mandibulae atrae. Thorax tuberculis plurimis, elevatis, obtusis. Elytra punctata spinisque plurimis, elevatis, acutis, atris. Pedes nigri tibiis annulo albo.
24. L. thorace acute dentato: dorso bicarinato, hebraea,  
 elytris cinereis fuscō striatis maculatisque.  
 Cerambyx hebraeus. Mant. Inf. 1. 131. 7.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 106.  
 Habitat in America meridionali Dr. Hunter.  
 Antennae breves, nigrae. Thorax cinereus utrinque spina porrecta, valida, acuta, basi anteriori unidentata, dorso lineis duabus elevatis, atris, glabris. Elytra rotundata, cinerea sutura striisque tribus fuscis & inter has striae maculae plurimae, difformes ejusdem coloris. Pedes cinerei.
25. L. thorace acnte spinoso cinerea elytris spino-horrida,  
 sis, antennis longis.  
 Cerambyx horridus. Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 29.  
 Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.  
 Magnitudo & statura L. Scorpio. Antennae longiores, cinerascentes articulis apice nigris. Thorax cinerascens spina valida, subarcuata, acuta. Elytra spinosa, grisea.
26. L. thorace quadrispinoso, elytris tuberculato Scorpio,  
 granulatis, tibiis anticis apice dilatatis.  
 Cerambyx Scorpio Mant. Inf. 1. 131. 8.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 19.  
 Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

- Antennae breves, cinereae articulis apice nigris.**  
**Mandibulae atrae. Thorax cinereus spinis**  
**quatuor dorsalibus, elevatis, apice atris. Elytra**  
**cinerea tuberculis variis, elevatis, obtusis, granis**  
**glabris, atris, nitidis adspersis. Pedes breves,**  
**cinerei tibiis quatuor anticis apice dilatatis.**
- glaуca.** 27. L. thorace quinque spinoso glauca: elytris  
 muricatis latere fasciaque nigris, antennis  
 longis.
- Cerambyx glaucus. Mant. Inf. 1. 131. 9, Linn.  
 Syst. nat. 2. 626. 28.
- Degeer Inf. 5. 7. 13. tab. 14. fig. 4.
- Habitat in America.
- Elytra apice unidentata.
- bidentata.** 28. L. thorace subspinoso, elytris bidentatis scabris  
 cinereo-fuscis.
- Cerambyx bidentatus. Mant. Inf. 1. 131. 10.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig 62.
- Habitat in America Dom. von Rohr.
- Antennae longae, griseae articulis apice fuscis.  
 Thorax inaequalis utrinque spina obtusa. Elytra  
 bidentata, punctis elevatis, acutis scabra.  
 Femora clavata. Color cinereo fuscoque nebulosus.
- scabra.** 29. L. thorace spinoso trituberculatoque, elytris  
 basi scabris apice bidentatis, antennis lon-
- gissimis.
- Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 128.
- Habitat — — Mus. Britann.
- Antennae longissimae, basi testaceae, apice cine-
- reae. Mandibulae atrae. Thorax cinereus utrin-
- que spina parva acuta & praeterea tuberculis  
 tribus dorsalibus, elevatis. Elytra testacea basi  
 punctis elevatis, glabris. Corpus cinereum.  
 Femora clavata.

30. L. thorace tuberculato, elytris punctatis cinereis *praemorsa.*  
 apice bidentatis fuscis, antennis longis.  
 Habitat in Insula Guadeloupe de Badier.  
 Parva in hac familia. Antennae corpore duplo  
 longiores, cinereae articulis apice fuscis : primo  
 elongato. Caput cinereum. Thorax punctatus,  
 cinereus tuberculis dorsalibus tribus maculis-  
 que utrinque duabus baseos nigris. Elytra  
 punctata, cinerea punctisque aliquot elevatis,  
 nigris scabra, apice bidentata: dente exteriori  
 majori, fusco. Pedes cinerei femoribus cla-  
 vatis.
31. L. thorace spinoso cinereo villosa elytris biden- *spinifera.*  
 tatis testaceis, antennis longis.  
 Habitat in America meridionali. D. Pflug.  
 Media. Antennae obscure cinerascentes, corpore  
 longiores. Caput & thorax villosi cinerea tho-  
 race acute spinoso. Scutellum subflavescens.  
 Elytra laevia, testacea, apice acute bidentata.  
 Corpus villosi cinereum.
32. L. thorace mutico grisea elytris basi tuberculis *grisator.*  
 duobus apice spinosis, antennis brevibus vil-  
 losis.  
 Habitat Tranquebariae Dom. de Schlanbysch.  
 Elytra grisea basi tuberculis duobus elevatis,  
 compressis, apice pallidiora spinis aliquot eleva-  
 tis, brevibus suturaque elevata, ferrata. Abdo-  
 men & pedes grisea.
33. L. thorace spinoso tuberculatoque grisea ely- *aedificator.*  
 tris basi bituberculatis, antennis mediocribus.  
 Habitat in India orientali Mus. D. Lund.  
 Media. Antennae pilosae articulo primo elon-  
 gato, crassiori. Caput canaliculatum, cinereum  
 labio rotundato, flavescente. Thorax utrinque  
 spinosus tuberculisque duobus. Elytra apice

truncata, pubescentia, grisea basi angulo pa-  
rum elevato, compresso, tuberculoque medio  
parvo, obtuso. Pedes grisei.

*amputator.* 34. L. thorace spinoso, elytris cinereis nigro irro-  
tatis maculisque numerosis testaceis.

Habitat in Americae Insulis ramos etiam cras-  
siores abscindere dicitur. Mus. Banks.

Media. Antennae longae, cinereae. Thorax  
ruga media elevata cinereus. Elytra cinerea  
punctis parvis, subelevatis, atris irrorata macu-  
lisque numerosis, testaceis adspersa. Corpus  
cinereum.

*fornicator.* 35. L. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis  
mediocribus.

Habitat in Insula Barbados Dom. Drury.

"Antennae nigricantes articulo ultimo acuto.

Thorax inaequalis. Elytra obtusa, nigra basi  
punctis majoribus, inaequalibus adspersa. Sub-  
tus tomento flavo testa.

*spinner.* 36. L. thorace spinoso elytrisque basi daedaleis  
apice griseis, antennis mediocribus.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Affinis certe praecedenti. Antennae nigrae, apice  
cinereae. Caput atrum. Thorax utrinque acute  
spiniferus: dorso sinibus daedaleis exarato.  
Elytra basi nigra punctis majoribus daedaleis  
exarata, apice tomentosa, grisea. Corpus griseo  
nigrum.

*guttulator.* 37. L. thorace spinoso, elytris testaceis albo irro-  
tatis: basi punctis elevatis glabris.

Oliv. Inf. 67. tab. 13. fig. 92.

Habitat in Africa Mus. Britann.

Caput testaceum linea longitudinali nigra, gla-  
bra. Thorax testaceus ruga media transversali,  
elevata. Elytra obtusa, testacea atomis flavican-

tibus irrorata basi punctis aliquot elevatis, gla-  
bris, rubris.

38. L. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, ely- *nebulosa*.  
tris fusco ferrugineo que variis: macula margi-  
nali cinerea, antennis mediocribus.

Oliv. Ins. 67. tab. 3. fig. 15.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 4.

Habitat in Germania Mus. Dom. Banks.

Antennae nigrae articulis basi cinereis. Caput & thorax ferruginea, nigro lineata. Elytra punctata, ferrugineo fuscoque varia macula magna cinerea in medio marginis exterioris.

Pedes fusti.

39. L. thorace spinoso obscura elytris fascia postica *repandator*.  
repanda albida: basi punctis elevatis atris.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Statura & magnitudo praecedentium. Antennae corpore longiores, fuscae. Caput & thorax obscura, immaculata. Elytra obscura basi punctis plurius glabris, elevatis, atris anguloque parum elevato. In medio fascia postice repanda, albida. Abdomen albidum.

40. L. thorace spinoso lineato, elytris fuscis: linea *variolator*.  
semicirculari alba.

Habitat in Indiis.

Antennae corpore longiores. Thorax fuscus linea dorsali lateralique albis. Elytra obtusa, fusca linea alba, quae ab angulo humerali incepit, in medio cum sutura coit & versus apicem ad marginem exteriorem excurrit.

41. L. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo ma- *sutor*.  
culatis, scutello luteo, antennis longissimis.

Cerambyx sutor. Linn. Syst. nat. 2. 628. 38.

Fn. Sv. 655.

Oliv. Ins. 67. tab. 3. fig. 20.

Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 1.

Degeer Inf. 5. 65. 4.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 4.

Habitat in Europae sylvis.

*sartor.*

42. L. thorace spinoso niger scutello flavo, elytris immaculatis, antennis longissimis.

Habitat Dresdae in Aesculo Hippocastano Mus. Dom. Zschuck.

Affinis praecedenti at major. Frons inter antennas valde canaliculata.

*dentator.*

43. L. thorace spinoso fulso cinereoque varia.

Habitat in Carolina.

Statura & magnitudo L. Sutor. Antennae corpore triplo longiores, ferrugineae, basi nigrae. Corpus totum fusco cinereoque varium. Tibiae intermediae compresiae versus apicem dente parvo dorsali.

- reticulator.* 44. L. thorace spinoso nigra thorace elytrisque fulvis, thorace nigro lineato, elytris reticulatis.

Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 85.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Caput atrum, immaculatum. Antennae mediocres, ferrugineae primo articulo toto nigro, secundo basi apiceque clavato, villoso, nigro. Thorax supra fulvus lineis duabus dorsalibus, nigris. Elytra fulva, nigro reticulata, apice emarginata. Corpus nigrum.

*scalator.*

45. L. thorace acute spinoso atra elytris strigis numerosis interruptis albis, antennis mediocribus.

Habitat in Louisiana Mus. Dom. Boe.

Magnitudo & statura L. reticulator. Antennae mediocres, atrae. Caput atrum fascia supra clypeum orbitaque oculorum albis. Thorax ater lateribus lineisque duabus latis albis.

*Elytra atra, nitida margine suturaque albis,  
e quibus exeunt ramos plurimos strigas con-  
stituentes, interruptas. Corpus cinereo villo-  
sum. Pedes nigri.*

46. *L. thorace subspinoso obscure cinerea fusco ma-  
culata elytris apice rufis. molator.*

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 99.

Habitat Cajennae Dr. Hunter.

Antennae mediocres, fuscae. Caput cinereum  
fronte rufa. Thorax obscure cinereus punctis  
plurimis fuscis, margine antico posticoque  
rufis. Elytra laevia, obscura maculis punctis-  
que plurimis fuscis, apice obtusa, rufa. Abdo-  
men rufescens.

47. *L. thorace spinoso, elytris cinereo fusco glau-  
coque nebulosis, antennis longissimis rufis. titillator.*

Oliv. Inf. 61. tab. 15. fig. 109.

Habitat in Carolina Mus. Britann.

Antennae rubrae articulo primo fusco. Thorax  
antice tuberculis duobus minutissimis. Elytra  
punctata, cinerea maculis fuscis glaucisque  
inordinatis, sparsis. Tibiae rufae, secundi paris  
gibbere parvo notatae.

48. *L. thorace spinoso, elytris cinereo pulverulen-  
tis: vittis duabus flavis nigro marginatis. vittator.*

*Cerambyx incanus. Forst. nov. sp. Cent. I. 38.*

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 104.

Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 6.

Habitat ad littora sinus Campechiani Mus. Bri-  
tann.

Antennae mediocres, cinereo fuscoque varie-  
gatae. Caput cinereo pulverulentum lineis  
duabus glabris, atris. Thorax cinereus lineis  
tribus longitudinalibus, atris. Elytra cinerea  
vittis duabus flavis, marginibus elevatis atris.

Maculae aliquot sparsae, atrae ad basin elytrorum.

*oculator.* 49. L. thorace spinoso nigra elytris maculis quatuor flavis subocellaribus, antennis longis.

*Cerambyx oculatus.* Degeer Inf. 7. 654. tab. 49. fig. 1.

Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 11.

Voet Coleopt. 2. tab. 7. fig. 21.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Thorax antice posticeque strigis duabus tenuifimis, flavis, impressis. Elytra substriata maculis quatuor flavis, annulo albo cinctis, quarum prima baseos rotundata, major, secunda ad marginem exteriorem, tertia in medio, quarta versus apicem orbicularis.

*capensis.* 50. L. thorace bispinoso nigra elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus.

*Cerambyx capensis.* Linn. Syst. nat. 2. 628. 32.

Oliv. Inf. 67. tab. 8. fig. 51.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 3.

Petiv. Gazoph. tab. 3. fig. 8.

Voet. Scarab. 2. tab. 8. fig. 25.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

*hottentotta.* 51. L. thorace spinoso rufo, elytris nigris: fascia maculisque duabus marginalibus sanguineis.

*Cerambyx hottentotta.* Brown. Illustr. 118. tab. 49. fig. 1.

Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 27.

Voet. Scarab. 2. tab. 8. fig. 26.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Yeats.

Antennae mediocres. Thorax scaber, obscure rufus. Elytra aeneo tincta. Pedes nigri.

*ferrugator.* 52. L. thorace spinoso obscure ferruginea elytris obscure virescentibus: striga interrupta sanguinea, antennis longis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Spengler.

Antennae nigrae. Thorax subrugosus utrinque denticulo parvo. Elytra punctata, obscura, viridi nitidula, ante medium striga interrupta, sanguinea. Margo exterior apice sanguineus.

Corpus ferrugineum. Pedes ferruginei tarsis nigris tibiisque intermediis extus subdentatis.

53. L. thorace spinoso, elytris flavis nigro fasciatis *humeralis*.  
antice mucronatis.

Habitat — — — Dom. Drury.

Antennae corpore longiores, nigrae. Caput flavum lineis quatuor nigris. Thorax flavus fasciis tribus nigris, basi utrinque emarginatus. Elytra flava fasciis variis, passim confluentibus, nigris, basi mucronata. Sternum porrectum, apice bidentatum.

54. L. thorace bispinoso nigra elytris fasciis quinque rubris, antennis mediocribus. *fasciata*.

Habitat in Guínea Dr. Isert.

Statura omnino praecedentium. Antennae nigrae. Thorax scaber, niger spinis utrinque duabus, brevibus. Elytra basi scabra, nigra fasciis tribus tenuioribus, rufis. Corpus nigrum.

55. L. thorace subspinoso atra elytris fasciis tribus *trifasciata*.  
flavis, antennis mediocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 121.

Herbst Arch. tab. 45. fig. 10.

Habitat ad Sierra Leon Africæ Dr. Solander.

Thorax ater tuberculo tantum obsoleto utrinque notatus. Elytra abdomine subbreviora, atra fasciis tribus latis flavis. Pedes atri tibiis intermediis apice tuberculatis.

56. L. thorace spinoso postice sinuato, elytris flavis: *bifasciata*.  
fasciis duabus maculaque rhombea cyaneis.

Habitat in Jamaica Mus. Britann.

Antennae corpore paullo longiores, atrae. Caput flavum orbita oculorum cyanea. Thorax flavus postice fascia cyanea sinibusque duobus erofus. Scutellum basi apiceque cyaneum. Pedes lutei femoribus cyaneis.

*nobilis.*

57. L. thorace spinoso atro: margine flavo, elytris atris: fasciis tribus flavis punctisque duobus albis.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Antennae mediocres, atrae. Caput atrum macula frontali duabusque pone oculos flavis. Thorax holofericeus, ater margine flavo, basi albo. Spina versus basin atra. Elytra holofericea, atra fascia baseos interrupta, media sinuata, apicis abbreviata. Puncta duo alba inter fasciam 2. 3.

*aethiops.*

58. L. thorace spinoso atra elytris fasciis duabus puncto que apicis luteis, antennis mediocribus. Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 2. Df. 7-655-49. 2. <sup>versicolor</sup>.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Britann.

Antennae nigrae. Caput canaliculatum. Thorax subrugosus. Elytra holofericea, atra fasciis duabus flavis, quae tamen futuram haud attingunt puncto que parvo apicis luteis. Pedes compressi, atri.

Punctum apicis interdum deest.

- variegator.* 59. L. thorace spinoso cinerea thorace elytrisque fusco variis, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 112.

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

Antennae fuscae. Caput, thorax, elytra fusca, cinnereo variegata coloribus mixtis, indistinctis ore nigro.

*circulio-*  
*noides.*

60. L. thorace mutico fusca thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris.

Cerambyx curculionoides. Linn. Syst. nat. 2.

63. 4. 48.

Oliv. Ins. 67. tab. 10. fig. 69.

Geoff. Ins. 1. 210. 5.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 1.

Habitat in Europa australiori.

61. L. thorace spinoso rugoso nigra ferrugineo irro- *lusca*.

rata elytris basi macula ocellari atra, anten-  
nis longissimis.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Antennae atrae. Caput nigrum punctis aliquot ferrugineis. Thorax subrugosus, niger utrinque linea punctorum ferrugineorum. Elytra obtusa & fere truncata, ferrugineo irrorata ma-  
culaque subocellari in ipsa basi. Pedes nigri  
tibiis intermediis dorso unidentatis.

62. L. thorace spinoso obscura elytris punctis duo- *notata*.  
bus approximatis atris.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae mediocres. Corpus supra fuscum,  
subtus nigrum. Thorax striga punctorum im-  
pressorum. Elytra punctata, fusca, pone me-  
dium ad futuram punctis duobus atris, approxi-  
matis.

63. L. thorace acute spinoso nigra elytris scabris *lugubris*.  
ferrugineo obsolete punctatis, antennis lon-  
gissimis.

Habitat in Italia Dom. de Schlanbusch.

Statura omnino L. funestae at triplo major.

Antennae corpore duplo longiores, nigrae.

Corpus scabrum, nigrum elytris punctis parvis,  
obsolete, ferrugineis. Pedes nigri tibiis qua-  
tuor anticis dente parvo apicis elevato, obtuso.

64. L. thorace spinoso fusca elytris scabris: macu- *tristis*.  
lis duabus atris, antennis mediocribus.

- Cerambyx tristis.* Linn. Syst. nat. 2. 629. 42.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 62.  
 Herbst Arch. tab. 25. fig. 7,  
 Habitat in Ligno-cupresi Galliae australioris.  
 Variat sexu antennis longitudine corporis &  
 duplo longioribus.
- funebris.* 65. L. thorace spinoso fusca elytris laevibus: macu-  
 lis duabus atris, antennis brevibus.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 63.  
 Panz. Naturf. 24. 26. 36. tab. 1. fig. 36.  
 Ross. Fn. Etr. 1. 145. 366.  
 Habitat in Galliae Sambuco Dr. Brousonet.  
 Duplo minor praecedente. Elytra haud scabra.
- punctator.* 66. L. thorace spinoso atra elytris albo punctatis,  
 antennis longis.  
*Cerambyx farinosus.* Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 4.  
*Cerambyx punctator.* Oliv. Inf. 67. tab. 7.  
 fig. 49.  
*Cerambyx Chinensis.* Forst. nov. spec. Cent.  
 1. 39. *fig. 5-109. Cer. chinensis*  
 Habitat in China Dr. Fothergill.  
 Antennae nigrae articulis basi pallidis. Elytra  
 basi scabra. Pedes atri.
- erispa.* 67. L. thorace spinoso, elytris lineis tribus eleva-  
 tis ferrulatis, corpore cinereo, antennis me-  
 diocribus.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 18.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.  
 Thorax inaequalis, acute spinosus. Elytra  
 lineis tribus acute ferrulatis.
- fasciculata.* 68. L. thorace spinoso hirtoque, elytris punctis pi-  
 loso cristatis.  
*Lamia fasciculata.* Oliv. Inf. 67. tab. 17.  
 fig. 131.  
 Habitat Cajennae Mus. Dr. Olivier.

**Media.** Antennae mediocres, nigrae articulo primo villoso, flavo. Thorax acute spinosus pilis densis pallentibus tectus. Elytra fusca puncto uno altero vole albido, linea suturali elevata, atra, praeterea cristae tres e pilis elevatis suscis ad basin, quarum exterior brevissima. Versus apicem duo paria cristarum approximatum. Pedes variegati.

69. L. thorace spinoso cinerea elytris subfasciatis, rotator. antennis mediocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 126.

Habitat in India Mus. Dom. Banks.

Antennarum articuli cinerei, apice fuscii. Caput sulcatum, cinereum palpis nigris. Elytra cinerea, fusco subfasciata.

70. L. thorace spinoso nigra elytris bicarinatis albo lineatis, pedibus ferrugineis, antennis brevibus. *Glycyrrhizae.*

Cerambyx ovatus. Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 9.

Cerambyx Glycyrrhizae. Oliv. Inf. 67. tab. 16.

fig. 115.

Pallas Iter. 2. 723. 60.

Habitat in Sibiria Mus. Dom. Banks.

Caput atrum litora baseos albida. Antennae breves, nigrae articulo primo ferrugineo, apice nigro. Thorax lineis tribus albis. Sutura alba. Pedes ferruginei, apice albi.

71. L. thorace spinoso nigra coleoptris cruce media cruciata.

Cerambyx cruciatum. Pall. Icon. tab. F. fig. 5.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Antennae breves, nigrae. Caput nigrum. Thorax niger linea dorsali alba. Coleoptera nigra sutura lata fasciaque media, abbreviata albis. Pedes nigri.

- fuliginator.* 72. L. thorace subspinoso nigra elytris cinerascentibus, antennis brevibus.  
*Cerambyx fuliginator.* Linn. Syst. nat. 2. 539. 43.  
 Geoff. Ins. 1. 205. 8.  
 Olivier Ins. 67. tab. 4. fig. 21.  
 Frish. Ins. 13. tab. 19.  
 Degeer Ins. 5. 70. 7.  
 Voet. Scarab. tab. 8. fig. 30.  
 Habitat in Europa australiori.  
 Variat aetate tota nigra.
- cineraria.* 73. L. thorace spinoso cinerascens antennis brevibus.  
 Pallas Icones tab. F. fig. 11.  
 Habitat in Russia meridionali Dom. Hybner.  
 Praecedente duplo minor & tota cinerascens.
- carinata.* 74. L. thorace spinoso nigra elytris piceis: carina laterali elevata albida, antennis brevibus.  
 Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae breves, crassiae, nigrae. Caput & thorax punctata lineaque media impressa, nigra.  
 Elytra obtusa, picea linea laterali elevata, villosa albida. Corpus subtus albidum.
- Coquus.* 75. L. thorace subspinoso hirsuta elytris obtusis fulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus. Linn. Syst. nat. 2. 630. 44.  
 Habitat in America boreali.  
 Spinae thoracis minutissimae.
- ruspator.* 76. L. thorace spinoso fusco: maculis duabus ferrugineis, elytris fuscis cinereo variegatis.  
 Oliv. Ins. 67. tab. 17. fig. 129.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.  
 Antennae mediocres, fuscae. Caput fuscum.  
 Scutellum ferrugineum. Elytra punctata obtusa, fusca, cinereo varia, qui color postice fasciam constituit. Corpus fuscum.

77. L. thorace spinoso quadripunctato, elytris ~~tornator~~  
rufis: maculis quatuor nigris, antennis bre-  
vibus.

Cerambyx tetraphthalmus, Forster Cent. I. 41.

Oliv. Inf. 67. tab. 8. fig. 52.

Herbst Arch. tab. 32. fig. 4.

Habitat in America boreali.

Antennae nigrae. Caput rufum puncto elevato  
atro ad basin antennarum. Thorax utrinque  
obtuse spinosus, rufus punctis quatuor dorsali-  
bus, nigris. Elytra obtusa puncto ad marginem  
exteriorēm baseos, duobus approximatis in  
medio, quartoque versus apicem. Subtus ni-  
gra, cinereo nitens.

78. L. thorace spinoso grisea elytris ferrugineo Bankii.  
irroratis fasciisque duabus cinereis.

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. III.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Parva. Antennae mediocres, fusco cinereoque  
variae. Thorax antice utrinque spinis duabus,  
anteriore brevissima, ferrugineo irroratus.  
Elytra fasciis duabus, altera ad basin fere  
obsoleta, altera in medio obliquas futuram hand  
attингente.

79. L. thorace inermi grisea elytris fasciis duabus saltator.  
macularibus abbreviatis strigaque postica pun-  
ctata niveis, antennis brevibus.

Habitat. — — — — —

Parva. Thorax linea dorsali alba. Elytra puncta-  
ta, obtusa fascia ante medium abbreviata, ni-  
vea e lineolis tribus: intermedia breviori  
punctoque interiore constans. Pone medium  
fascia altera itidem lineolis tribus exteriore  
minore punctoque interiore. Versus apicem  
striga obsoleta e punctis quatuor.

*hifrio.*

80. *L. thorace inermi flavescentis: punctis numerosis niveis sparsis, antennis brevibus.*

\* *Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.*

*Statura praecedentis. Antennae breves, griseae. Caput punctatum, flavescentis punctis obsoletis albidis. Thorax rotundatus, inermis, obscure flavescentis punctis plurimis niveis. distinctis. Elytra punctata, flavescentia punctis numerosis, niveis. Corpus flavescentis.*

*estator.*

81. *L. thorace spinoso cornuque brevi recumbente, corpore testaceo, antennis brevibus apice nigris.*

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 122.

*Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.*

*Corpus parvum, breve, villosum, testaceum. Caput magnum fronte plana. Thorax in medio dorsi cornu brevi, recumbente, lato, apice retuso. Elytra villosa, striata, immaculata.*

*pedestris.*

82. *L. thorace spinoso atra: vitta integra alba, antennis mediocribus.*

*Cerambyx pedestris. Linn. Syst. nat. 2. 631. 51.*

Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 23.

Ross. Fn. Etr. 1. 146. 368.

*Habitat in Europa australiori.*

*rufipes.*

83. *L. thorace spinoso nigra elytrorum sutura alba, antennarum basi pedibusque rufis.*

*Habitat in Hungaria Dom. Hybner.*

*Statura & magnitudo praecedentis. Antennae compresiae, nigrae primo articulo rufo. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra laevia, atra sutura alba. Pedes rufi.*

*morio.*

84. *L. thorace spinoso nigra elytris unicoloribus, antennis brevibus.*

Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 67.

Herbst Arch. tab. 25. fig. 10.

Scopoli Ent. carniol. 169.

Habitat in Germania australi Mus. Dom. Zschuck.

L. pedestri paullo major & elytra unicolora, mox nigra, mox testacea. Antennae nigrae articulo primo interdum testaceo. Pedes mox nigri, mox testacei.

85. L. thorace spinoso atra elytris marginibus lineata. neisque duabus utrinque coeuntibus albis.

Cerambyx Scopoli. Herbst Arch. tab. 25. fig. 11.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura & magnitudo L. pedestris. Caput & thorax atra linea dorsali alba. Elytra atra margine, sutura lineisque duabus, antice postice que coeuntibus albis. Pedes nigri.

86. L. thorace spinoso fusca: vittis tribus integris molitor. v? albis, antennis mediocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 84.

Ross. Fn. Etrusc. 1. 147. 369.

Habitat in India Mus. Britann.

Corpus supra fuscum vittis tribus albis, a capite ad apicem elytrorum ductis; intermedia in thorace subdidyma per suturam elytrorum excurrit. Lineola parva ad basin elytrorum intervittas. Thorax tuberculo laterali notatus.

87. L. thorace mutico grisea coleoptris basi bituberculatis maculisque duabus communibus albis, antennis brevibus. tuberculata.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 120.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae cinereae. Coleoptera tuberculis duabus baseos elevatis, compressis juxta suturam. Maculae praeterea duas magnae, communes, albidae, altera ad basin, alteraversus apicem.

- nucator.* 88. L. thorace mutico lineato cinereo villosa an-  
tennis-pedibusque testaceis.  
Oliv. Inf. 67, tab. 14, fig. 102.  
Habitat in Otaheite Mus. Dom. Banks.  
Antennae mediocres. Thorax utrinque linea  
pallida. Elytra punctata, obtusa.
- Rubus.* 89. L. thorace spinoso bimaculato, elytris basi sca-  
bris basi apiceque mucronatis.  
Cerambyx Rubus. Linn. Syst. nat. 2. 625. 21.  
Oliv. Inf. 67, tab. 7, fig. 57.  
Degeer Inf. 5. 106. 7, tab. 13, fig. 16.  
Habitat in India.
- 8 maculata.* 90. L. thorace spinoso bimaculato, elytris albo ma-  
culatis basi scabris mucronatis apice biden-  
tatis.  
Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.  
Affinis certe praecedenti, cuius varietatem olim  
creddi. Corpus paullo minus. Antennae cor-  
pore longiores, scabrae, nigrae. Thorax inae-  
qualis, acute spinosus maculis duabus dorsali-  
bus, lunatis, flavescentibus, impressis. Scutel-  
lum albidum. Elytra cinerea basi punctis ele-  
vatis nigris scabra anguloque mucronata, apice  
bidentata. In medio maculae quatuor albae,  
secunda majori lunata, quarta minima, orbicu-  
lata. Latera alba.
- spicornis.* 91. L. thorace spinoso rugoso, elytris truncatis gri-  
feis, antennis compressis: articulis apice spi-  
nosis.  
Oliv. Inf. 67, tab. 5, fig. 33.  
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.  
Antennae mediocres, compressae: articulis apice  
exteriori acute spinosis. Caput nigrum. Thorax  
valde rugosus, griseus. Elytra laevia, apice  
truncata, subspinosa.

92. L. thorace spinoso subtestacea elytris punctis scabrior.  
baseos atris scabris.

Oliv. Ins. 67. tab. 3. fig. 14. a. b.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres articulis apice nigris. Elytra apice subemarginata, ad futuram acuminata.

Subtus & pedes concolora.

93. L. thorace spinoso tuberculatoque cinerea elytris scabris: maculis duabus lateralibus atris. *Spengleri.*

Habitat in America meridionali D. Spengler.

Antennae longae, cinereae articulis apice fuscis.

Thorax utrinque obtuse spinosus tuberculisque tribus dorsalibus. Elytrorum macula posterior strigam emitit. Elytra apice acuminata.

94. L. thorace bispinoso tuberculatoque, elytris fuscator. apice tridentatis griseis: fascia cinerea.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lind.

Media. Antennae corpore vix breviores, griseae.

Thorax inaequalis, griseus utrinque spinis duabus: anteriore majori, recurva, supra spinas tuberculum magnum, obtusum. Elytra grisea sive cinerea punctis numerosis ferrugineis irroratis. Pone medium fascia sinuata cinerea, distincta, apice bidentata. Pedes grisei.

95. L. thorace acute spinoso grisea elytris apice bidens. bidentatis.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae longae, fuscae. Pedes inermes.

96. L. thorace mutico cinereo nigro punctato, elytris pallide testaceis apice bidentatis cinereis nigro maculatis. *Cantor.*

Habitat in China Dom. de Schlanbusch.

Antennae mediocres, atrae. Caput cinereum punctis duobus lineolaque baseos nigris. Scu-

telum nigrum margine cinereo. Elytra pallido testacea, basi punctata, apice bidentata, cinerea, nigro maculata. Corpus & pedes nigra, cinereo villosa.

- Solandri.* 97. L. thorace subspinoso nigra elytris bidentatis fuscis cinero irroratis.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 118.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax subrugosus, niger, utrinque spinula antica, acuta. Scutellum nigrum. Elytra punctata, nigra, cinereo irrorata, basi punctata, humeri gibbo, apice bidentata. Pedes nigri plantis fuscis.

- cornutus.* 98. L. thorace obtuse spinoso, mandibulis basi cornutis, antennis longissimis.

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 132.

Habitat in America Mus. Britann.

Antennae nigrae. Caput canaliculatum, nigrum mandibulis porrectis, acutis, basi tuberculo elevato, valido, corniformi. Thorax niger, immaculatus. Elytra punctata, nigra, flavo maculata, basi mucrone parvo, inflexo armata, apice rotundata, inermia.

- leprosa.* 99. L. thorace spinoso, elytris basi variolosis cinereis: macula laterali nigra, antennis longis.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennae obscure rufae. Thorax dorso inaequali. Elytra basi punctis majoribus concavatis impressa, postice laevia, cinerea, puncto parvo in medio, macula magna laterali & puncto parvo apicis nigris. Macula nigra utrinque ad basin abdominis. Pedes cinerei.

85. STENOCORUS. *Palpi quatuor.*  
*antici filiformes.*  
*postici clavati.*  
*Antennae setaceae.*

1. S. thorace subspinoso cyaneus elytris basi flavis. *cyaneus.*

*Cerambyx palliatus.* Forst. nov. sp. Cent. I. 40.

Habitat in India.

Antennae breves, cyaneae articulis clavatis.

Thorax antice angustatus, postice subspinosus.

2. S. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis *lamed.*

lividis: taenia obscura longitudinali sinuata.

*Cerambyx lamed.* Linn. Syst. nat. 2. 630. 46.

Fn. Sv. 649.

Geoff. Inf. I. 226. 6.

Habitat in Europae floribus.

3. S. thorace spinoso, elytris bidentatis griseis: ma- *garganicus*  
*cula flava, antennis longissimis.*

Oliv. Inf. 67. tab. 13. fig. 105.

Drury Inf. I. tab. 37. fig. 6.

Degeer Inf. 5. tab. 14. fig. 3.

Habitat in Marylandia Muf. Britann.

Antennae fuscae. Elytra in medio lunula albida.

4. S. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis *festivus.*  
*viridibus: linea laterali lutea.*

*Cerambyx festivus.* Linn. Syst. nat. 2. 623. XI.

Stenocori corpus subcylindricum, glabrum, im-  
marginatum, tardum, capite rotundato, oculis magnis,  
reniformibus, lateralibus, antennis elongatis: articu-  
lis apice saepius spinosis, in sinu oculorum insertis,  
thorace rotundato, scutello rotundato, elytris rigidis,  
fornicatis, longitudine abdominalis, apice saepius bi-  
dentatis, pedibus cursoriis, tarsis quadriarticulatis,  
colore vario.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 113.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 5.

Voet. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 66.

Herbst Arch. tab. 25. fig. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 6.

Degeer Inf. 5. 100. 4. tab. 13. fig. 14.

Habitat in America.

*marylandi-* 5. S. thorace depresso tuberculato mutico, elytris bidentatis fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus.

*Callidium marylandicum*. Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Marylandia Mus. Britann.

Antennae subaculeatae. Corpus totum cinereo fuscoque variegatum.

*spinicornis*. 6. S. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis, corpore variegato.

*Cerambyx spinicornis*. Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 130

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 4.

Voet. Coleopt. 2. tab. 24. fig. 131.

Habitat in America.

Corpus cinerascens punctis elevatis fuscis.

*bidens*. 7. S. thorace inermi subtuberculato, antennarum articulis bispinosis, corpore testaceo.

*Cerambyx bidens*. Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 125.

Habitat in America meridionali D. de Paykull.

Statura omnino praecedentis, at minor & corpus minus variegatum.

*semipuncta*- 8. S. thorace spinoso inaequali, elytris bidentatis tuis. basi punctatis apice glabris.

Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 19.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

**Caput atrum palpis posticis ferrugineis.** Antennae mediocres, fuscae articulis intermediis, apice spinosis. Thorax tomentosus, ater, tuberculatus. Elytra basi nigro flavoque variegata, punctata, apice atra, glabra, nitida macula flava. Pedes fuscii.

9. S. thorace mutico inaequali, elytris apice bidentatis albo irroratis, antennis longis aculeatis.

**Cerambyx irroratus.** Linn. Syst. nat. 2. 633. 62.

Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 145.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 3.

Habitat in America.

10. S. thorace mutico cinereo: linea glabra fusca, *glabratus*.  
elytris bidentatis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.

Rohr.

Antennae mediocres, fuscae articulis tribus spinosis. Thorax griseus linea dorsali glabra, fusca.  
Elytra griseo fuscoque varia.

11. S. thorace spinoso piceus elytris punctis sparsis *farinosus*.  
farinosis, antennis longis.

**Cerambyx farinosus.** Mast. Inf. 1. 134. 135.

Linn. Syst. nat. 2. 626. 24.

Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 46.

Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 4<sup>2</sup>. *yohu ad Sam. quadrator pertinet.*

Degeer Inf. 5. 108. 9. tab. 13. fig. 17.

Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 12.

Habitat in Radice Argemonae mexicanae.

Larva albicans capite caudaque nigris,

12. S. thorace spinoso ferrugineo, elytris acumina-*6maculatus*  
tis: maculis tribus flavis.

**Cerambyx sexmaculatus.** Oliv. Inf. 67. tab. 15.

fig. 108.

Habitat Cajennae Mus. D. Olivier.

Magnitudo omnino & Statura S. 4 maculata.  
 Antennae mediocres, villosae, ferrugineae.  
Thorax ferrugineus utrinque spina parva, nigra.  
Elytra maculis tribus magnis, oblongis, flavis,  
apice spina nigra.

*5 maculatus* 13. S. thorace subspinoso rufo: maculis quatuor flavis, elytris bidentatis rufis: punctis duobus lineaque apicis albis, antennis longissimis.

Habitat in Insula Guadeloupe Dr. Isert.

Statura omnino 4 maculatae. Antennae ferrugineae. Caput ferrugineum orbita oculorum cinerea. Thorax scaber linea laterali maculatae quatuor dorsalibus, pallidis. Scutellum albidum. Elytra ferruginea macula ante medium albida, in medio geminata, flava, glabra, apicebidentata linea longitudinali albida. Corpus subtus albidum.

*4 maculatus* 14. S. thorace spinoso scabro, elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris.

*Cerambyx quadrimaculatus*. Linn. Syst. nat. 2. 27.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 144.

Sloan. Jamaic. 2. tab. 237. fig. 21.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 3.

Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 65.

Habitat in America meridionali.

Femora quatuor postica apice spinosa.

*maculosus*. 15. S. thorace spinoso fuscus elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris, antennis medioribus nigris.

*Cerambyx maculosus*. Oliv. Inf. 67. tab. 1 fig.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Olivier.

Praecedente minor. Caput fuscum labio ferrugineo. Thorax spinosus, fuscus, immaculatus.

Elytra pallidiora maculis duorum parium. Pedes nigri femoribus rufis.

16. S. thorace mutico nigro: macula utrinque rufa, *geminatus*,  
elytris nigris: maculis duorum parium gla-  
bris, antennis longissimis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Antennæ nigrae. Caput rufum fronte puncto  
nigro. Maculae elytrorum, altera ad basin,  
altera in medio. Elytra apice truncata, cinereo  
nitidula. Pedes nigri femoribus rufis, posticis  
quatuor apice spinosis.

17. S. thorace mutico pallidus elytris unispinosus: *pallens*,  
punctis tribus nigris, antennis longis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr.

Isert.

Medius. Antennæ longae, pallide testacea.

Thorax rufus. Elytra pallide testacea punctis  
tribus nigris, parvis. Pedes pallidi.

18. S. thorace mutico antice attenuato ferrugineus *strepens*,  
elytris pallidis.

Cerambyx strepens. Oliv. Inf. 67. tab. fig.

Habitat in Galloprovincia noctu volitans cum  
strepitu Mus. Dom. Olivier.

Statura S. 4. maculati. Antennæ compressæ,  
mediocres, ferrugineæ. Caput canaliculatum.  
Elytra laevia, pallide flavescens, immaculata.  
Corpus ferrugineum.

19. S. thorace mutico atro, elytris bidendatis basi *fasciatus*.  
testaceis apice atris: fascia pallida.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 98.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.

Antennæ mediocres, nigrae. Caput flavum basi  
lineisque tribus atris: lateralibus sub oculis.  
Thorax supra ater, subtus flavescens. Elytra  
basi punctata, testacea, truncata fascia ante  
apicem pallida. Abdomen testaceum macula  
utrinque baseos flava apiceque atrum.

*circum-  
flexus.*

20. *S. thorace mutico ferrugineus elytris unidentatis testaceis: punctis duobus strigaque undata fuscis.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae mediocres, ferrugineae. Elytra testacea punctis duobus oblique positis versus basin, in medio striga angulata margines haud attingens & apice dente unico, elongato, acuto fuscis. Pedes ferruginei.

*nanus.*

21. *S. thorace rotundato mutico griseus pedibus testaceis.*

Habitat — — Mus. Dom. Lund.

Parvus. Antennae mediocres, villosae, cinereae.

Caput & thorax grisea, immaculata. Elytra grisea lineis duabus longitudinalibus, abbreviatis, nigris. Pedes testacei femoribus incrassatis.

*annulatus.* 22. *S. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longis: annulis tribus albis.*

*Cerambyx annulatus.* Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 117.

*Cerambyx hirtipes.* Degeer Inf. 5. 16. 19. tab. 14. fig. 10.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Antennae ferrugineae fascia alba in articulo tertio, quinto & penultimo. Caput fuscum lineis duabus albis. Thorax griseus lineis quatuor albis. Elytra grisea, apice fusca margine albo, truncata, unidentata. Pedes fusti, cinereo annulati.

*macula-* 23. *S. thorace subspinoso quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis.*

Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 86.

Habitat in America Mus. Dom. Banks.

**Antennae longiores, ferrugineae. Thorax utrinque tuberculis duobus lateralibus. Elytra obsolete bidentata, ferruginea macula glabra, solitaria, flava ad basin, dein macula orbiculata, cinerea. In medio maculae due approximatae, glabrae, flavae, & tandem linea cinerea, apice bifida ab apice elytri fere ad medium ducta.**

**24. S. thorace spinoso ferruginea elytris acuminatis testaceis: lineolis tribus glabris flavis.**

Oliv. Inf. 69. tab. 2, fig. 17.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Caput ferrugineum. Antennae corpore longiores. nigrae primo articulo ferrugineo. Elytra apice unispinosa, testacea lineola baseos duabusque in medio approximatis: exteriori longiori, flavis, glabris. Pedes nigri femoribus flavis: posticis quatuor apice spina valida, nigra.

**25. S. thorace subspinoso, elytris bidentatis cinereo varius. fusco flavoque variis: angulo baseos compresso.**

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Parvus, cinereus. Antennae corpore longiores, cinereae articulis apice fuscis. Thorax nigro lineatus punctisque flavescentibus. Elytra angulo baseos elevato, compresso & apice emarginato bidentata.

**26. S. thorace spinoso ater elytris apice unispinosis basi testaceis, antennis longis.**

Cerambyx pubescens. Oliv. Inf. 67. tab. 18.  
fig. 135.

Habitat Cajennae.

Minor. Antennae corpore longiores, nigrae articulis spinosis. Thorax spinosus, tuberculata.

tus, ater, nitidus. Scutellum griseum. Femora rufa.

- villosum.* 27. S. thorace mutico obscurus cinereo villosum elytris bidentatis.

Habitat in Carolina.

Medius, tenuis, obscurus, villis rarioribus tectus.

- Druryi.* 28. S. thorace subspinoso, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo fasciatis, antennis brevibus.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennae corpore breviores, piceae. Thorax utrinque spina parva armatus & dorso lineis quibusdam elevatis, transversis. Elytra apice truncata, bidentata, spina exteriori majori, ferruginea fasciis tribus cinereis, ad futuram connatis. Pectus ferrugineum maculis utrinque duabus majoribus, albis. Abdomen utrinque punctis tribus albis.

- undatus.* 29. S. thorace spinoso cinereus elytris bidentatis: fasciis duabus undatis nigris.

Habitat in America Dom. Drury.

Caput cinereum oculis nigris. Antennae mediocres, villosae, nigrae articulis apice cinereis. Thorax cinereus maculis aliquot dorsibus, glabris, nigris. Elytra punctata: cinerea fasciis duabus valde undatis, nigris, posteriore crassiore.

- ruficollis.* 30. S. thorace spinoso ferrugineo fusca elytris bidentatis pallidioribus, antennis longis.

Oliv. Inf. 69. tab. 2. fig. 16.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae corpore longiores, fuscae.

Caput & thorax obscura, ferrugineo pubescens. Elytra laevia, multo pallidiora, apice bidentata.

## 86. CALOPUS. *Palpi quatuor.*

*antici clavati.*

*postici filiformes.*

*Maxilla bifida,*

*Labium membranaceum,*  
*bifidum.*

*Antennae filiformes.*

### 1. Calopus.

*Cerambyx serraticornis thorace mutico subovali,*  
*corpo lurido fusco; antennis compressis an-*  
*tice serratis mediocribus.* Linn. Syst. nat. 2.

634. 65. Fn. Sv. 665.

*serraticor-*  
*nis.*

Degeer Inf. 5. 79. 16.

Habitat in Europa boreali.

Animalculum elongatum, cylindricum, obscurum.

## 87. RHAGIUM. *Palpi quatuor capitati.*

*Maxilla unidentata.*

*Labium membranaceum,*  
*bifidum.*

*Antennae setaceae.*

### 1. R. thorace spinoso griseum elytris nebulosis te-mordax,

staceo subfasciatis.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 2.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Rhagii corpus oblongum, glabrum, immarginatum,  
tardum, capite magno, ovato, prominulo, oculis ro-  
tundatis, lateralibus, prominulis, antennis elongatis,  
approximatis, inter oculos insertis, thorace angusto,  
cylindrico, utrinque spinoso, scutello rotundato, ely-  
tris rigidis, fornicatis, thorace multo latioribus, lon-  
gitudine abdominis, pedibus cursoriis, tarsis quadri-  
articulatis, colore vario.

*Corpus majus R. inquisitore haud nigrum sed griseo villosum.*

*inquisitor.* 2. *R. thorace spinoso nigrum elytris nebulosis testaceo subfasciatis.*

*Cerambyx inquisitor.* Linn. Syst. nat. 2. 630.

49. Fn. Sv. 659.

Geoff. Inf. 1. 223. 2.

Frish. Inf. 13. tab. 14.

Oliv. Inf. 69. tab. 2. fig. 12.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 10.

Degeer Inf. 5. 126. 2. tab. 4. fig. 1.

Habitat in Europae truncis arborum.

Larva hexapoda, nuda, alba, capite collarique cornelis fuscis, dorso canaliculato Stroem. Act. Hafniensia 1.

*indagator.* 3. *R. thorace spinoso cinereum elytris lineis tribus elevatis: atomis fasciisque duabus nigris.*

Degeer Inf. 5. tab. 4. fig. 7.

Habitat in Germania Dr. Schulz.

Antennae nigrae, in medio piceae. Caput planum, cinereo villosum. Thorax cinereo villosus. Elytra cinerea atomis fasciisque duabus nigris. Pedes nigri.

*cursor.*

4. *R. thorace spinoso, elytris rufis: futura lineaque nigris.*

*Cerambyx cursor.* Linn. Syst. nat. 2. 630. 45.

Fn. Sv. 658.

Degeer Inf. 5. 127. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 7.

Habitat in Europa boreali.

Margo exterior rufus.

5. R. thorace spinoso nigrum elytris subferrugineo cinctum.  
neis: fascia flava, femoribus posticis unidentatis.

Habitat in Austria Dom. Saldoner.

Antennae mediocres, ferrugineae, apice compressae. Thoracis lobus anticus distinctus. Scutellum pube flavescens. Elytra punctata. Corpus subtus pube aurea. Pedes ferruginei femoribus quatuor posticis intus ante apicem unidentatis.

6. R. thorace spinoso nigrum antennarum basi ferruginea. *Noctis.*

Cerambyx Noctis. Linn. Syst. nat. 2. 630. 48.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 2.

Habitat in Europa boreali.

Nimis affinis R. Cursor. Differt tantum colore toto nigro.

Variat sexu elytris nigris & testaceis.

7. R. thorace spinoso, elytris fasciis duabus oblique fasciatum quis flavis.

Leptura mordax. Degeer Inf. 5. 124. 1, tab. 4. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 8.

Oliv. Inf. 69. tab. 1. fig. 6.

Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 1.

Icon. tab. 8. fig. 1. 3.

Herbst Arch. 170. tab. 45. fig. 12.

Geoff. Inf. 1. 222. 1.

Habitat in Europa boreali.

Antennae ferrugineae primo articulo nigro. Caput canaliculatum. Thorax subcanaliculatus.

Elytrorum fasciae margines haud attingunt.  
Pedes nigri femorum basi tibiisque rufis.

- clathratum.* 8. R. thorace subspinoso rigrum elytris flavo subreticulatis, pedibus rufis.

Habitat in Austria D. Schneider.

Statura omnino R. Noctis at minor. Caput & thorax atra. Elytra nigra in medio flavo subtillisime reticulata. Pedes omnes rubri.

- ornatum.* 9. R. thorace spinoso nigrum elytris fascia lata flava.

Habitat in Pensylvania Mus. Dom. Banks.

Antennae subferrugineae. Caput nigrum oculis testaceis. Thorax niger spina utrinque acuta, recurva. Elytrorum margo exterior subferrugineus. Pedes ferruginei femoribus basi nigris.

- minutum.* 10. R. thorace spinoso, elytris elevato striatis cinereis nigro undatis.

Oliv. Inf. 69. tab. I. fig. 3.

Habitat Kiliae.

Corpus R. inquisitore triplo minus.

- muticum.* 11. R. thorace mutico rufo nigro binaculato, elytris fuscis rufo striatis apice bidentatis.

Habitat in Suecia Mus. Dom. Lund.

Parvum. Caput cinereum antennis longitdine corporis, fuscis, basi albo annulatis. Thorax omnino muticus, rufus maculis duabus dorsilibus, nigris. Elytra subpunctata, fusca, rufo striata apiceque rufa emarginato bidentata: dente interiori brevissimo. Corpus cinereum. Pedes ferruginei.

**88. SAPERDA.** *Palpi quatuor filiformes.*  
*Maxilla membranacea,*  
*bifida.*

*Labium cordatum, trun-*  
*catum.*

*Antennae setaceae.*

**1. S. corpore griseo nigro punctato, antennis me- carcha-**  
**diocribus.** *rias.*

*Cerambyx carcharias.* Linn. Syst. nat. 2. 631.

52. Fn. Sv. 660. Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 22.

*Leptura cinerea.* Geoff. Inf. 1. 308. 1.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 152. fig. 4.

Degeer Inf. 5. 73. 10. tab. 3. fig. 19.

Habitat in Europae sylvis.

**2. S. coleoptris linea suturali dentata punctisque fla- scalaris.**  
 vis, antennis mediocribus.

*Cerambyx scalaris.* Linn. Syst. nat. 2. 632. 55.

Fn. Sv. 697. Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 7.

Frisl. Inf. 12. 29. tab. 3. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.

Degeer Inf. 5. 77. 14.

Habitat in Europae Populo.

**3. S. alba thorace coleoptrisque fuscis: vittis dua- candida.**  
 bus albis.

Habitat — — Mus. Dr. Hunter.

Saperdae corpus elongatum, cylindricum, glabrum,  
 immarginatum, agile, capite rotundato, transverso,  
 inserto, oculis lateralibus, reniformibus, antennis  
 elongatis, in oculorum sinu insertis, thorace brevi,  
 rotundato, inermi, scutello parvo, rotundato, elytris  
 rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus  
 brevibus, cursoriis, tarsis quadriarticulatis, colore  
 vario.

*detrita.*

- Elytra obtusa, laevia. ALATRINA 2. 83  
**4. S. nigra cinereo villosa thorace linea dorsali, elytris vitta albis, antennis brevibus.**

Habitat in Barbaria Dom. Desfontaines.

Magnitudo & statura S. scalaris. Antennae vix longitudine corporis, nigrae. Caput nigrum vitta oculorum alba. Thorax niger linea dorsali scutelloque albis. Elytra punctata, rotundata, nigra vitta lata, dorsali, alba, versus basi parum detrita. Corpus cinereo hirtum.

*irrorata.*

- 5. S. atra elytris albo punctatis, antennis longis.**

Habita in Africae plantis Dom. Vahl. Antennae nigrae articulis basi albis primo crassiori, unicolor, secundo piceo. Thorax linea laterali, interrupta, alba. Elytra laevia.

Variat elytris immaculatis forte aetate.

*modesta.*

- 6. S. nigra capite thorace anoque ferrugineis.**

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks. Caput & thorax immaculata. Elytra punctato striata, apice emarginata. Abdomen tomento cinereo nitidulum ano ferrugineo.

*atricornis.*

- 7. S. ferruginea antennis abdominisque apice supra nigris.**

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Affinis videtur praecedenti. Antennae nigrae longitudine fere corporis. Caput & thorax laevia, glabra, rufa, immaculata. Pectus rufum. Abdomen supra basi rufum, apice nigrum anno five ultimo segmento lineolis duabus albis. Subtus basi tomento argenteo villosum, apice rufum. Elytra punctato striata, obscuriora, apice emarginata. Alae ferrugineae, apice nigrae.

*oculata.*

- 8. S. thorace luteo: punctis duobus atris, elytris nigris.**

Cerambyx oculatus. Linn. Syst. nat. 2. 633.  
Fn. Sv. 664. Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 4.  
Schaeff. Icon. tab. 128. fig. 4.

Degeer Inf. 5. 74. 11. tab. 3. fig. 20.

Huffnag. Inf. tab. 13.

Habitat in Europae sylvis.

9. *S. ferruginea elytris bidentatis punctato striatis tricolor.*  
virescentibus, antennis mediocribus nigris.

Habitat in India orientali Mus. Dom. de Sehestedt.

Paullo minor *S. oculatae*. Antennae longitudine corporis, nigrae. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus basi punctis tribus parvis, obsoletis. Elytra striato punctata, virescentia, apice emarginata. Corpus rufum pedibus apice nigris.

10. *S. ferruginea griseo villosa scutello orbitaque hirta.*  
oculorum fulvis.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae fuscae longitudine corporis. Caput griseum maculis quatuor basenos flavescentibus. Elytra pilis griseis hirta, apice obtusa. Pedes grisei.

11. *S. testacea antennis pedibusque concoloribus, unicolor.*  
antennis longis.

Habitat in Insula Amsterdam Mus. Dom. Banks.

Antennae testaceae. Thorax punctatus, in quibusdam linea cinerea laterali. Scutellum griseum. Elytra uti & pedes testacea.

12. *S. cylindrica nigra pedibus luteis, antennis me- linearis.*  
diocribus.

Cerambyx linearis. Linn. Syst. nat. 2. 632. 58.

Fn. Sv. 663. Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 6.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 1.

Habitat in Europae Corylo;

*nigripes.*

13. *S. cylindrica nigra thoracis lineis duabus scutelloque cinereis, pedibus nigris.*

Habitat in Hungaria Dom. Smidt.

Statura omnino *S. cylindrica* at paullo major.

Antennae corporis fere longitudine, nigrae.

Elytra rotundata, punctata, immaculata. Pedes omnes nigri.

*cylindrica.* 14. *S. cylindrica nigra pedibus anticis luteis.*

Cerambyx cylindricus. Linn. Syst. nat. 2. 633.

59. Fn. Sv. 662. Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 111.

Roes. Inf. 2. Scarab. 2. tab. 3.

Geoff. Inf. 1. 208. 2.

Degeer Inf. 5. 75. 12.

Habitat in Pyri, Pruni ramis.

*tripunctata.* 15. *S. cylindrica atra thorace supra ferrugineo: punctis tribus nigris.*

Habitat in Virginia.

Statura & magnitudo omnino *S. cylindrica*.

Antennae mediocres, villosae, nigrae. Corpus totum atrum, immaculatum thorace solo supra ferrugineo punctis tribus atris, duobus in medio & tertio in medio baseos. Elytra punctato striata;

*melanoec-phala.* 16. *S. thorace rufo, corpore nigro, pedibus rufis.*

Habitat in Africa Dom. Vahl.

Antennae mediocres, nigrae. Caput, corpus, elytra nigra. Thorax & pedes rufi.

*pilicornis.* 17. *S. violacea antennarum articulo primo secundo- que clavato pilosis.*

Pall. Icon. tab. F. fig. 12.

Habitat in America meridionali Dom. Hybner.

Antennae corpore paullo longiores: articulo primo incurvo, clavato, hirto, secundo basi subferrugineo apice clavato, hirto, nigro, reli-

quis basi ferrugineis apice nigris. Pedes nigri.

18. S. capite thoraceque rufis, elytris cyaneis, *an-barbicornis.*  
tennis mediocribus ante apicem barbatis.

Habitat — —

Media. Caput rufum antennis nigris articulo nono fasciculato piloso. Elytra laevia. Corpus nigrum ano sternoque rufis.

19. S. thorace villoso rufa antennis pectore elytris- *erytroce-*  
*que nigris.* *phala.*

Cerambyx erytrocephalus. Schrank Austr. 270.  
Habitat in Germania Dom. Hybner.

Caput rufum mandibulis antennisque mediocri-  
bus, nigris. Thorax valde villosum margine an-  
tico posticoque nigris. Elytra glabra, nigra.  
Pectus nigricans. Abdomen rufum basi nigrum.  
Pedes rufi.

20. S. thorace villoso rufa antennis elytrisque fuscis. *ruficollis.*

Habitat in Virginia.

Magnitudo & statura omnino praecedentis at  
distincta. Caput rufum antennis mediocribus,  
nigris. Thorax villosum, rufus, immaculatus.  
Elytra villosa, fusca. Corpus rufum. Pedes  
rufi, tibiis fuscescentibus.

21. S. thorace subspinoso cyanea elytris fasciis dua- *fasciata.*  
bus flavis.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae. Corpus totum  
violaceum, subtus paullo cinereo nitidum.

22. S. viridis elytris maculis tribus flavis. *clavicornis.*

Habitat ad Cap. Bbn. spei Mus. Dom. Banks.

Caput viride antennis fuscis, corpore longioribus,  
extrosum subcrassioribus. Thorax viridis.  
Elytra laevia, viridia, maculis tribus flavis,

quarum prima totam basin occupat, reliquae  
duae marginales.

*latipes.*

23. *S. nigra femoribus clavatis apice violaceis, tibiis posticis compressis, antennis longis.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Prof. Leske.

Antennae corpore longiores articulo primo se-  
cundoque crassioribus, nigris, reliquis rufis  
apice nigris, ultimis totis nigris. Pedes antici-  
quatuor rufi femoribus clavatis: clava viola-  
cea, postici violacei femoribus clavatis, basi  
rubris tibiisque compressis.

*vittata.*

24. *S. grisea vittis tribus dentatis albis, antennis longis.*

*Cerambyx trilineatus.* Linn. Mant. 352.

Drury Inf. x. tab. 41. fig. 1.

Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 142.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennarum articolus primus & secundus sub-  
tus subtilissime barbatus. Caput nigrum linea  
laterali alba dorsalique duplicata, flava. Elytra  
apice unidentata, nigra, flavo irrorata margine  
exteriori futuraque albis.

*6punctata.* 25. *S. nigra elytris punctis tribus flavis.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.

Corpus parvum, nigrum, cyaneo nitidum. Anten-  
nae longitudine corporis. Elytra scabra, nigra  
punctis tribus flavis. Pedes cyanei femoribus  
omnibus clavatis.

*lateralis.*

26. *S. nigra thoracis lateribus elytrorumque vitta  
lateralis ferrugineis.*

Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.

Antennae nigrae longitudine corporis. Thorax  
lateribus ferrugineis, qui color in capite coit.  
Elytra nigra vitta lateralii ferruginea margine  
tamen ipso nigro. Pedes nigri.

27. S. thorace atro: puncto utrinque ferrugineo, *lyncea*.  
elytris griseis acuminatis.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum antennis fuscis longitudine corporis. Scutellum ferrugineum. Elytra grisea, basi punctato striata, apice acuminata, divergentia. Corpus atrum abdome utrinque punctis quatuor ferrugineis. Pedes fusti femoribus clavatis.

28. S. grisea scutello margine, elytris lineolis flavescentibus.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae fuscae, corpore paullo longiores. Elytra subvillosa, grisea lineolis aliquot brevissimis flavis, basi punctis impressis, apice vix acuminatis. Pedes fusti femoribus clavatis.

29. S. testacea elytrorum apicibus anque nigris. *analisis*.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae, interdum articulis apice testaceis. Caput testaceum, mox immaculatum, mox linea, mox punctis baseos nigris. Thorax itidem testaceus, mox immaculatus, mox punctis quatuor aut sex nigris. Elytra sulcata: sulcis striato punctatis, testacea, apice nigra. Corpus testaceum ano nigro.

30. S. thorace rotundato: punctis quatuor nigris *bidentata*.  
flava, elytris apice bidentatis nigris.

Habitat in Aquapim Guineae Dr. Isert.

Parva. Antennae longitudine corporis nigrae articulo tertio quartoque flavis. Caput flavum mandibulis punctoque frontali nigris. Thorax rotundatus punctis quatuor. Elytra punctato striata, flava, apice bidentata, nigra. Corpus & pedes flava.

*nigricornis.* 31. *S. fusca thorace lineato, scutello flavo, antennis longis.*

Cerambyx Cardui. Linn. Syst. nat. 2. 632. 56.

Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 5. <sup>villoso-iridescentia</sup>

Herbst Arch. tab. 26. fig. 2. <sup>5. 5. 16-</sup>

Habitat in Europae australioris Carduis.

Corpus fuscum, flavo irroratum lineis tribus flavis in thorace.

*futuralis.* 32. *S. cinerea thorace lineato, elytris fuscis unicoloribus, antennis mediocribus.*

Habitat Lipsiae Prof. Lefke.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax niger lineis tribus albidis, lateralibus abbreviatis. Elytra laevia, fusca, unicoloria. Corpus cinerascens.

*annulata.* 33. *S. thorace rotundato lineato virescens elytris acuminatis: futura alba.*

Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 16.

Ross. Fn. Etr. 1. 152. 379.

Habitat in Africæ plantis Dom. Prof. Vahl.

Antennae mediocres articulis basi albis apice nigris, primo toto nigro. Caput obscurum. Elytra glabra, virescentia, haud rotundata sed acuminata.

*lineata.* 34. *S. thorace rotundato subspinoso, antennarum articulis basi albis.*

Habitat in America meridionali Mus. Dom. Lund.

Media. Antennæ longitudine corporis, fuscae articulo primo secundoque unicoloribus, reliquis basi niveis. Caput & thorax fusca, ferrugineo villosa, thoracis spina laterali parva. Elytra & pedes fusca.

*trifinis.* 35. *S. thorace rotundato nigro albo lineato, elytris bidentatis testaceis albo lineatis.*

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

*Antennae breves, fuscae. Thorax spinis quatuor mediis obtusis, lateralibus majoribus acutis. Elytra laevia, acuta.*

37. *S. thorace flavo lineato, elytris punctis quatuor populnea.*  
flavis, antennis mediocribus.

*Cerambyx populneus.* Linn. Syst. nat. 2. 632.

57. Fn. Sv. 661. Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 208. 3.

Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 5.

Habitat in Americae, Europae Populetis.

Variat minor, & punctis minoribus albis.

38. *S. viridis thorace punctis duobus, elytris qua-tremula.*  
tuor nigris.

Schaeff. Icon. tab. 101. fig. 1.

Habitat Halae Dr. Schreber.

Antennae mediocres.

39. *S. viridis punctis nigris numerosis, antennis punctata-*  
mediocribus.

*Cerambyx punctatus.* Linn. Syst. nat. 2. 1067. 7.

Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 10.

Habitat in Europa australi.

Antennae & pedes nigrae.

40. *S. thorace villoso cinereo, elytris subattenuatis virescens.*  
viridibus.

Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 11.

Panz Naturf. 24. 28. 37. tab. 1. fig. 37.

Habitat in Italia Dr. Allioni, in Galliae Sam-  
buco Dom. Broussonet.

41. *S. fusca pedibus testaceis, antennis longissimis longicornis.*  
nigris; annulo albo.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

Antennarum articulus nonus albus. Elytra apice  
bidentata. Pedes testacei apice nigri.

- femorata.* 42. *S. thorace antice fusco postice testaceo, elytris fasciis tribus nigris testaceisque, antennis longissimis.*

Habitat — — Mus. Britann.

Media. Caput nigrum antennis longis flavis articulis apice subspinosis. Elytra obtusa fasciis tribus nigris testaceisque alternis: fascia prima nigra; puncto flavo. Pedes flavi femoribus incrassatis apice unidentatis.

- volvulus.* 43. *S. supra nigra thoracis elytrorumque margine cinereo.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae longae, nigrae: articulis ultimis basi pubescentibus. Caput nigrum. Thorax niger margine late cinerascente. Elytra margine late cinereo. Corpus cinereum pedibus nigris.

- ferruginea.* 44. *S. thorace subspinoso ferruginea antennis pedibusque nigris.*

Cerambyx cantharinus. Linn. Syst. nat. 2.

637. 82.

Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax utrinque parum prominens, ferrugineus. Pedes nigri femoribus clavatis.

- brunnea.* 45. *S. thorace subspinoso ferruginea antennis pedibusque concoloribus.*

Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.

Nimis affinis praecedenti at triplo minor.

- testacea.* 46. *S. nigra elytris testaceis.*

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Antennae mediocres, nigrae. Corpus totum nigrum solis elytris testaceis. Thorax rufo villosus.

- violacea.* 47. *S. corpore violaceo immaculato.*

Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 12.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax subpuscens. Elytra rugosa. Pedes nigri.

48. S. nigra elytris flavis apice nigris. *praeusta.*

Leptura praeusta. Linn. Syst. nat. 2. 641. 24.

Leptura nigra. Geoff. Ins. 1. 209. 4.

Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.

Habitat in Europa australiori.

49. S. nigra thoracis linea dorsali scutelloque ei- *ephippium,*  
nereis, femoribus ferrugineis.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Affinis certe S. lineola at paullo major. Antennae corporis longitudine nigrae. Caput nigrum luna cinerascente. Thorax niger linea dorsali scutelloque cinereis. Elytra obscura. Pedes nigri femoribus apice rufis.

50. S. picea antennis pedibusque ferrugineis. *picea.*

Habitat in America septentrionali D. Lund.

Parva tota obscure picea solis antennis pedibusque ferrugineis.

51. S. nigra hirta antennis longis. *hirta.*

Saperda Filum. Ross. Fn. Etr. 1. 152. 380.  
tab. 5. fig. 10.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & magnitudo omnino S. lineola at alia & distincta. Antennae corpore longiores, nigrae, pilosae.

52. S. thorace subspinoso nigra antennis elytris *scutellata.*  
pedibusque cinerascentibus, scutello albo.

Habitat in Germania Mus. Dom. de Sehestedt.

Paullo S. lineola major. Antennae corpore breviores, griseae articulis basi ferrugineis apice nigris: primo toto nigro. Caput nigrum. Thorax subspinosus, niger lineola ad scutellum brevi, albida. Scutellum album. Elytra laevia, cinerascentia. Tibiae obscure ferrugineas.

*lineola.*

58. *S. nigra thoracis linea dorsali femoribusque apice rufis.*

Herbst Arch. tab. 26. fig. 4.

Habitat in Italia Dom. Allioni.

Parva. Corpus cylindricum, nigrum. Antennae longitudine corporis. Femora omnia apice uti & tibiae anticae rubrae.

89. CALLIDIUM. *Palpi quatuor clavati.*

*Maxilla membranacea,*  
*bifida.*

*Labium bifidum: laci-*  
*niis tenuissimis.*

*Antennae setaceae.*

*obscurum.* 1. *C. thorace subvilloso fusco, elytris testaceo ci-*  
*nereoque variis, antennis mediocribus.*

Habitat in Terra Dumenii Mus. Dom. Banks.

Antennae pubescentes, fuscae. Elytra basi obscu-

riora. Pedes testacei.

✓ *bajulus.* 2. *C. thorace villoso: tuberculis duobus, corpore*  
*fusco.*

*Cerambyx bajulus.* Linn. Syst. nat. 2. 636. 76.  
Fn. Sv. 672.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 30.

Frish. Inf. 13. tab. 10.

Callidii corpus planiusculum, saepius pubescens, depressiusculum, immarginatum, tardum, capite ovato, obtuso, inserto, oculis lateralibus, reniformibus, antennis thorace longioribus in sinu oculorum iasertis, thorace piano margine rotundato prominulo, scutello parvo, triangulo, elytris rigidis, fornicatis longitudine abdominis, pedibus elongatis, cursoriis, femoribus saepius clavatis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 1. Elem. tab. 76.

fig. 4.

Habitat in Europae truncis.

Elytra in altero sexu pallida.

3. C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, *fennicum*. ✓  
antennis mediocribus.

*Cerambyx fennicus*. Linn. Syst. nat. 2. 636. 77.

Fn. Sv. 664.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 9.

*Leptura atra*. Geoff. Inf. 1. 219. 19.

2. Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 8.

Habitat in Europae truncis.

4. C. thorace subcylindrico spinoso rufo nigra ely- *ruficolle*.  
tris violaceis, antennis mediocribus piceis.

*Saperda ruficollis*. Mant. Inf. 1. 150. 36.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 27.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Caput nigrum antennis mediocribus piceis. Tho-  
rax hirtus, rufus. Pedes nigri femoribus sub-  
clavatis.

5. C. thorace tuberculato nigrum elytris violaceis. *ebulinum*,

*Cerambyx ebulinus*. Linn. Syst. nat. 627. 183.

Habitat in Africæ plantis Dom. Vahl.  
Antennæ mediocres, ferrugineæ articulo primo  
crassiori, nigro. Corpus nigrum. Elytra laevia,  
violacea, nitida. Femora clavata.

6. C. fuscum thorace elytrisque viridi aeneis, femori- *aeneum*.  
bus ferrugineis.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 46.

Habitat in India Mus. Dr. Hunter.

Antennæ nigrae. Thorax absque tuberculis pu-  
bescens, aenens. Elytra pubescentia, nitida.  
Corpus nigrum. Pedes nigri femoribus subcom-  
pressis, rufis geniculis tamen nigris.

- clavipes.* 7. *C. nigrum opacum femoribus omnibus clavatis,*  
antennis longioribus.  
Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 33.  
Herbst Arch. tab. 26. fig. 9. *Conus.*  
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.  
Femora omnia valde clavata.
- spinosum.* 8. *C. thorace spinoso nudo atrum antennis brevi-*  
*bust.*  
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
Magnitudo & statura omnino praecedentis. Antennae nigrae. Caput canaliculatum. Thorax planus, nudus, laevis, ater, immaculatus utrinque spina acuta. Elytra laevia, glabra, atra. Pedes nigri femoribus crassis, at haud clavatis.
- violaceum.* 9. *C. thorace subpubescente, corpore violaceo, an-*  
*tannis brevibus.*  
*Cerambyx violaceus.* Linn. Syst. nat. 2. 635.  
70. Fn. Sv. 667.  
Frish. Inf. 12. tab. 3.  
Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 2.  
Herbst Arch. tab. 26. fig. 10.  
Habitat in Europae Sylvis.
- femoratum.* 10. *C. thorace nudo, corpore atro opaco, femori-*  
*bus rubris, antennis mediocribus.*  
*Cerambyx femoratus.* Linn. Syst. nat. 2. 634. 69.  
Oliv. Inf. 70. tab. 7. fig. 77.  
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.  
Degeer Inf. 5. 93. 81.  
Habitat in Germaniae nemoribus.
- fulcratum.* 11. *C. thorace nudo nitido, corpore atro, femori-*  
*bus rufis, antennis mediocribus.*  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Statura & summa affinitas praecedentis. Dif-  
fert tamen paullo major thorace nitido ely-

trisque substriatis. Femora omnia compressa,  
rufa.

12. *C. pubescens cyaneum pedibus rufis: femori- amethysti-  
bus clava atra.*

Habitat in America boreali Prof. Helwig.

Corpus parvum, pubescens, cyaneum, nitidum.

Antennae breves, nigrae, basi rufae. Pedes  
ferruginei femoribus omnibus clavatis: clava  
magna atra.

13. *C. thorace pubescente atrum elytris fasciis due- 2 fasciatum  
bus rufis.*

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 42.

Habitat in America meridionali Dom. Banks.

Antennae mediocres articulis apice bispinosis.

Thorax bituberculatus. Pedes nigri femoribus  
subclavatis.

Variat. interdum loco fasciae posticæ macula  
marginali rubra.

14. *C. thorace verrucoso nigricante, elytris acumi- acumina-  
natis viridibus: sutura cyanea.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.

Caput fuscum. Antennae mediocres, fuscae ar-  
ticulis apice spinosis. Thorax rotundatus, niger  
tuberculis plurimis, elevatis. Elytra viridia,  
nitida sutura cyanea, apice acute acuminata.  
Pedes nigri femoribus clavatis: clava rubra.

15. *C. thorace verrucoso nigrum elytris testaceis: russicum.*  
macula media apiceque nigris.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 49.

Habitat in Russia Dom. Lee.

Caput nigrum antennis mediocribus. Pedes mu-  
tici, nigri.

16. *C. thorace glabro, corpore fusco aeneo, anten- variabile. ✓  
nis pedibusque fuscis.*

*Callidium ungaricum.* Herbst Arch. tab. 26.  
fig. 12.

*Cerambyx variabilis.* Linn. Syst. nat. 2. 635. 75.  
Fn. Sv. 669.

Degeer Ins. 5. 89. 25.

Oliv. Ins. 70. tab. 6. fig. 354.

Frisch. Ins. 12. tab. 6. fig. 3. 4.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.

Habitat in Europae nemoribus.

*sericeum.* 17. C. thorace holofericeo cinereo, elytris testaceis: punctis elevatis rubris, scutello niveo.  
*Callidium holofericeum.* Ross. Fn. Etr. 1. 153.  
382. tab. 1. fig. 6.  
Oliv. Ins. 70. tab. 3. fig. 38.  
Habitat in Barbaria Dom. Vahl.  
Antennae mediocres, sericeae. Corpus totum cinereo holofericeum elytris magis testaceis: punctis plurimis sparsis, elevatis, rufis.

*tenebrosum.* 18. C. thorace tuberculato obscure rufo: linea dorsali nigra, elytris depressis cinerascentibus: lineis duabus elevatis atris.  
Oliv. Ins. 67. tab. 18. fig. 139.  
Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.  
Corpus parvum, nigrum, cinereo subtus nitidulum. Antennae mediocres, nigrae. Thorax obscure rufus linea dorsali nigra. Elytra depressa, cinerascentia sutura lineisque duabus abbreviatis, atris. Pedes elongati atri femoribus subclavatis.

✓ *ruficatum.* 19. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis brevibus. Linn. Syst. nat. 2. 634. 67. Fn. Sv. 666.  
Oliv. Ins. 70. tab. 3. fig. 39.  
Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 6.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 29.

Sulz. Hist. Inf. tab. 13. fig. 1,

Habitat in Europae sylvis.

20. C. thorace rotundato nudo, elytris ferrugineis: *vittatum*.  
vitta media nigra, antennis corpore longioribus.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Statura & magnitudo praecedentis. Antennae corpore longiores, ferrugineae articulo secundo longiori, incurvo, apice subspinoso. Caput obscure ferrugineum. Thorax rotundatus, inermis, niger dorso obscure ferrugineo. Elytra plana, ferruginea: vitta nigra. Corpus obscurum. Femora clavata.

21. C. thorace nudo nigrum elytris striatis fuscis, *agrestis*.  
antennis brevibus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Duplo minus C. rustico & elytra striata, fusca.

22. C. thorace punctato, corpore atro, elytris lae- *stigma*.  
vibus: stigmate albo.

Cerambyx stigma. Linn. Syst. nat. 2. 625. 72.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 21.

Voet. Coleopt. 2. tab. 25. fig. 134. 135.

Degeer Inf. 5. 109. 22. tab. 14. fig. 13.

Habitat in America.

23. C. thorace hirto fuscum antennarum articulis *fugax*.  
basi rufis.

Callidium fugax. Oliv. Inf. 70. tab. fig.

Habitat in Gallo provincia Mus. Dom. Olivier.

Corpus parvum, totum hirtum, fuscum. Antennae corpore breviores articulis basi rufis,  
apice fuscis. Femora clavata. Tibiae testaceae.

24. C. thorace nudo, corpore fusco, antennis longis *pygmaeum*.  
flavescensibus.

Saperda minuta. Mant. Inf. 1. 150. 39.

Habitat in Italia, Anglia.

Antennae corpore longiores, flavae. Pedes femoribus clavatis.

- equeſtre.* 25. C. thorace mutico nudo atrum nitidum coleoptris fascia interrupta rubra.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Antennae compressae, nigrae; mediocres. Corpus glabrum, laeve, atrum elytris fascia media rufa, quae tamen futuram haud attingit.

- fulvicolle.* 26. C. thorace mutico fulvo nigrum antennis longissimis.

Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.

Parvum. Antennae corpore fere duplo longiores. Caput porrectum, in medio parum angustatum. Thorax rotundatus, laevis, rufus. Elytra obsolete scabra.

- hirtum.* 27. C. thorace rotundato hirto, elytris acuminatis palide testaceis.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 62.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae compressae, mediocres, nigrae, apice piceae. Thorax cinereo hirtus. Elytra glabra, pallide testacea, basi obscuriora, apice acuminata. Pedes nigri.

- pubescens.* 28. C. thorace rotundato pubescente testaceo, elytris virescentibus basi testaceis.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 75.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Olivier.

Statura & magnitudo omnino C. testacei. Antennae mediocres, testaceae. Caput nigricans. Thorax depresso, pubescens, testaceus. Corpus pubescens, testaceum pedibus nigris.

- barbatum.* 29. C. thorace rotundato subtus utrinque macula tomentosa ferruginea, antennis longis barbatis.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 41.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

Antennae corpore longiores, nigrae, tomento ferrugineo barbatae. Ad latera pectoris utrinque macula ocellaris e tomento ferrugineo. Corpus nigrum.

30. C. thorace rotundato pubescente, corpore *griseum*. obscure cinereo, antennis brevibus.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura omnino C. barbati paullo tamen minus.

Antennae testaceae, cinereo villosae, corpore breviores. Caput obscurum. Thorax rotundatus, vix tuberculatus, obscurus, cinereo pubescens. Elytra cinereo pubescentia, dilutiora. Pedes subtestacei.

31. C. thorace laevi obscure nigrum antennis longis pedibusque testaceis, femoribus compressis.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 44.

Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

Caput, thorax, elytra, corpus laevia, obscura, nigra. Abdomen testaceum. Pedes omnes testacei femoribus valde compressis.

32. C. thoracis dorso glabro atro: lineis quatuor *variegatum*. albis, elytris flavo irroratis.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 58.

Habitat in Nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae: articulis ultimis duobus ferrugineis. Caput nigrum: lineis duabus strigaque transversali albidis. Thorax lateribus flavo irroratis. Elytra lineolis tribus subelevatis atra atomis flavescentibus numerosissimis. Abdomen atrum utrinque punctis flavis. Pedes nigricantes femoribus elongatis, posticis annulo albo.

33. C. thorace lineis duabus elytris quatuor albis: *lineatum*. mediis coeuntibus abbreviatis.

Oliv. Inf. 70, tab. 4, fig. 50.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae breves, fuscae articulo primo ferrugineo. Caput nigrum lineis duabus albis. Labium albicans lineis tribus nigris. Ocoli sinu albicante impressi. Scutellum albidum. Elytra obtusa, ferruginea linea impressa, villoso alba ad marginem exteriorem, duabus in medio ante apicem coeuntibus, & quarta futurali. Abdomen albidum, medio nigrum. Pedes ferruginei geniculis nigris.

*fulcatum.* 34. C. thorace tomentoso cinereo, elytris albo nigroque striatis.

Oliv. Inf. 70, tab. 4, fig. 48.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae breves, fuscae. Caput cinereum linea frontis elevata, glabra, atra. Thorax villis cinereis tectus. Elytra sulcata lineis elevatis glabris, atris, sulcis quatuor villosis albis. Pedes grisei.

✓ *sanguineum* 35. C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, antennis mediocribus.

Cerambyx sanguineus. Linn. Syst. nat. 2. 1636. 80.

Oliv. Inf. 70, tab. 1, fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 220. 21.

Schaeff. Icon. tab. 64, fig. 1.

Habitat in Europae sylvis.

✓ *testaceum.* 36. C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus fuscis.

Cerambyx testaceus. Linn. Syst. nat. 2. 635. 75. Fn. Sv. 670. Geoff. Inf. 1. 218. 18.

Oliv. Inf. 70, tab. 1, fig. 11.

Schaeff. Icon. tab. 64, fig. 6.

Habitat in Europae sylvis.

Elytra paullo pallidiora.

37. C. thorace subtuberculato ferrugineo, elytris *pilicorne*.  
testaceis, antennis mediocribus villosis, femoribus clavatis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr.

Ifert.

Medium. Antennae mediocres, villosae, testaceae. Caput & thorax ferruginea. Elytra glabra, laevia, testacea. Pedes testacei femoribus valde clavatis.

38. C. thorace subtuberculato testaceum elytris *praetustum*. ✓  
apice violaceis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Forte mera varietas C. testacei. Antennae mediocres, apice fuscae. Femora clavata.

39. C. thorace tuberculato villosō nigrum elytris *ligneum*.  
rubris: macula apiceque violaceis.

Habitat — — — Dr. Schulz.

Corpus nigrum. Antennae mediocres. Thorax planus, villosus, niger tuberculis elevatis, glabris. Elytra rufa macula media apiceque violaceis. Pedes nigri femoribus compressis.

40. C. thorace rotundato pubescente ferrugineum, *flavipes*.  
pedibus testaceis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Parvum. Antennae corpore paullo longiores ferrugineae. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax rotundatus, cinereo pubescens, subtuberculatus, ferrugineus. Elytra paullo pallidiora. Pedes omnes testacei femoribus parum incrassatis.

41. C. thorace - subtuberculato nudo nigrum elytris *luridum*.  
laevibus testaceis.

Cerambyx luridus. Linn. Syst. nat. 2. 634. 68.

Oliv. Ins. 70. tab. 7. fig. 78. ✓

Habitat in Europae sylvis.

- ✓ *fuscum.* 42. C. thorace subtuberculato canaliculato nudo nigrum elytris striatis obscure testaceis, antennis mediocribus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Antennae fuscae. Pedes nigri femoribus brevibus, crassis, compressis.

- ✓ *maculatum.* 43. C. thorace villoso fuscum elytris maculis duabus ferrugineis, antennis longioribus.

Habitat in Insula Guadalupe Dom. de Badier. Corpus parvum, obscurum. Antennae corpore longiores, subferrugineae, basi fuscae. Caput & thorax villosa, fusca. Elytra fusca maculis duabus ferrugineis: altera ante medium, altera ante apicem, linearis. Pedes obscure ferruginei femoribus clavatis.

- triste.* 44. C. thorace subtuberculato nudo, elytris substriatis, corpore lurido immaculato.

*Callidium arvense.* Panz. Naturf. 24. 30. 21. tab. I. fig. 41.

Habitat in Saxoniae Quercu Dom. Hybner.

- raueum.* 45. C. thorace laevi obscure ferrugineo, elytris testaceis.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks. Antennae mediocres, ferrugineae. Caput & thorax plana, laevia, obscure ferruginea. Elytra glabra, laevia, testacea. Abdomen conicum, testaceum.

- ✓ *hafniense.* 46. C. thorace subvilloso nigro: lineis quatuor albis; intermediis abbreviatis, antennis brevibus.

*Cerambyx liciatus.* Linn. Syst. nat. 2. 636. 78. Oliv. Inf. 70. tab. I. fig. 8.

Panz Naturf. 24. tab. I. fig. 38.

Habitat Hafniae.

Affine praecedenti at thorax nitidus & elytra  
haud striata.

47. C. thorace laevi nitido, elytris violaceis, tibiis *rufipes*.  
rufis, antennis brevibus.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 66.

Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

Antennae fuscae basi ferrugineae. Caput & tho-  
rax laevia, violacea, nitida. Abdomen aeneum.  
Pedes violacei tibiis rufis. Femora postica cla-  
vata basi rufa.

48. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris stria- *striatum*. ✓  
tis, antennis brevibus.

*Cerambyx striatus*. Linn. Syst. nat. 2. 635.

73. Fn. Sv. 668.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 24.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 13.

Degeer Inf. 5. 90. 26.

Habitat in Europae sylvis.

49. C. thorace glabro flavescente, capite elytrisque *bicolor*.  
virescentibus, antennis mediocribus nigris.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

Praecedentibus paullo minus. Thorax planus,  
laevis, flavus. Elytra laevia, viridia. Pedes  
nigri.

50. C. thorace rotundato subspinoso villoso nigrum *lynceum*.  
elytris macula subdidyma fulva.

*Cerambyx lynceus*. Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 97.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Yeats.

Thorax utrinque spina parva armatus. Elytra  
versus basin macula magna fulva, interne di-  
dyma.

51. C. thorace tuberculato spinosoque rufum pectore *Salicis*. ✓  
elytrisque nigris.

*Rhagium etruscum.* Ross. Fn. Etr. v. 149. 373.

tab. 1. fig.

*Stenocorus ruficollis.* Herbst Arch. tab. 25.

fig. 13.

Habitat in Lipsiae salicibus Dom. Zschuck.

Antennae breves, rufae. Thorax tuberculis duobus dorsalibus spinaque utrinque acuta. Elytra vix striata, nigra. Abdomen & pedes rufa. Faemina elytris testaceis, immaculatis.

*eyaneum.* 52. C. thorace plano tuberculato villosum violaceum abdominis penultimo segmento ferrugineo, antennis mediocribus.

Habitat in Italia.

Corpus parvum, totum villosum. Antennae mediocres, nigrae. Thorax planus tuberculis tribus elevatis. Elytra laevia, violacea. Pedes nigri, femoribus clavatis.

*pustillum.* 53. C. thorace rotundato nigrum antennis tibiisque testaceis.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Antennae corpore longiores, testaceae. Pedes femoribus clavatis, nigris tibiis testaceis.

✓ 2 *macula-*  
*tum.* 54. C. thorace rotundato villoso fuscum elytris maculis duabus ferrugineis.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 61.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres. Corpus villosum, fuscum, obscurum. Macula altera elytrorum in medio, altera ad apicem. Femora subclavata.

*flavum.* 55. C. thorace subrotundo, corpore flavo, femoribus clavatis, antennis mediocribus.

Habitat in America Mus. Tottianum.

Antennae flavae. Oculi nigri. Femora omnia valde clavata.

56. C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis undatum. ✓  
 undatis duabus albis, antennis brevibus.  
*Cerambyx undatus.* Linn. Syst. nat. 2. 636. 79.  
 Fn. Sv. 675.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 36.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 19. fig 87.  
 Degeer Inf. 5. 91. 28.  
 Habitat in Europae truncis.
57. C. thorace rotundato, elytris lividis: fasciis colorum.  
 tribus fuscis, antennis brevibus.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 67.  
 Habitat in Carolina.  
 Thorax ferrugineo fuscus. Elytra truncata, li-  
 vida, fasciis tribus fuscis, quarum ultima vix  
 futuram attingit.
58. C. thorace rotundato rufo, elytris nigris basi varium.  
 rufis: fasciis duabus albis.  
 Oliv. Inf. 71. tab. 5. fig. 55.  
 Habitat in America boreali Dom. Yeats.  
 Antennae mediocres, nigrae. Caput rufum. Ely-  
 tra laevia basi rufa: fasciis duabus albis. Pe-  
 des nigri femoribus clavatis, rufis. Abdomen  
 atrum.
59. C. thorace rotundato flavo fasciato, elytris fasciis flexuosum.  
 septem flavis: anticis antrorsum posticis re-  
 trorsum arcuatis.  
 Leptura Robiniae Forst. Cent. 1. 43.  
 Leptura picta. Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 2.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 76.  
 Voet. Coleopt. tab. 91. fig. 91.  
 Habitat in Americae Robinia.  
 Antennae & pedes ferruginea. Caput nigrum  
 fasciis tribus flavis. Thorax niger etiam fasciis  
 tribus flavis, semicircularibus.

- minutum.* 60. *C. testaceum* elytris fascia abbreviata alba.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 56.  
 Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae mediocres: articulo primo testaceo,  
 reliquis basi albis, apice nigris. Caput testa-  
 ceum oculis fuscis. Elytra ante medium fascia  
 alba, quae futuram haud attingit. Pedes testa-  
 cei femoribus valde clavatis basi albis.
- florale.* 61. *C. thorace globoso* albo fasciato, elytris nigris:  
 fasciis quinque albis; secunda tertiaque lu-  
 natis.  
*Callidium fasciatum.* Herbst Arch. tab. 26. fig. 17.  
*Cerambyx floralis.* Pall. Iter. 2. 724. 63.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 53.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 19. fig. 93.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Corpus nigrum antennis ferrugineis. Thorax  
 niger fasciis duabus albis. Elytrorum fascia  
 prima baseos, quinta apicis.
- fulminans.* 62. *C. thorace globoso* maculato, elytris nigris:  
 fasciis undato angulatis albis.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 63.  
 Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.  
 Antennae breves, cinereae. Thorax cinereus:  
 maculis tribus atris; inter media majori. Scu-  
 tellum nigrum margine cinereo. Corpus  
 fuscum.
- atomarium.* 63. *C. thorace globoso* cinereo maculato, elytris  
 punctis strigaque postica flexuosa albidis.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Corpus magnum, nigrum. Antennae nigrae.  
 Caput nigrum lineis duabus albidis. Thorax  
 niger lineis duabus anticis, punctis duobus  
 dorsalibus lateribusque cinereis. Elytra nigra  
 basi punctis albidis & versus apicem striga

*undata albida.* Apex albicat. Subtus nigrum  
segmentorum margine albido. Pedes nigri.

64. C. thorace rotundato, elytris fasciis quatuor *arcuatum.* ✓  
flavis: prima interrupta, reliquis retrorsum  
arcuatis.

Leptura arcuata. Linn. Syst. nat. 2. 640. 21.

Fn. Sv. 696.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 16.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 14.

Geoff. Inf. 1. 2. 12. 10.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 6. tab. 107. fig. 2. 3.

Habitat in Europae hortis.

Callidium lunatum. Mant. Inf. 1. 155. 47. hu-  
jus mera varietas.

65. C. thorace rotundato nigro, elytris nigris: fasciis *arietis.* ✓  
flavis; secunda antrorsum arcuata, pedibus  
totis ferrugineis.

Leptura arietis. Linn. Syst. nat. 2. 640. 23.

Fn. Sv. 695.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 20.

Geoff. Inf. 1. 214. II.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 15.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 7. tab. 107. fig. 3.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 6.

Frish. Inf. 12. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europae hortis.

Thorax antice posticeque flavus, at in medio in-  
terruptus. Antennae & pedes omnes ferru-  
ginei. Fascia elytrorum secunda cum scutello  
ad suturam coit.

66. C. thorace rotundato nigro, elytris nigris: *Gazella.*  
fasciis flavis; secunda antrorsum arcuata; pedi-  
bus ferrugineis: femoribus nigris.

Habitat Kiliae.

Nimis affinis C. arietis & forte tnera varietas.  
Antennae basi ferrugineae, apice nigrae. Thorax niger in margine antico & postico haud interruptis flavis. Elytra simillima, at fascia secunda haud uti in C. arietis ad futuram antice dilatata cum scutello fere juncta. Femora nigra.

- ✓ *plebejum.* 67. C. thorace globoso immaculato, elytris nigris: strigis tribus punctoque humerali albis.  
Callidium pallidum. Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 72.  
Leptura rustica. Linn. Syst. nat. 2. 639. 17.  
Fn. Sv. 692.

Geoff. Inf. 1. 215. 12.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 7.

Habitat in Europae nemoribus.

Punctum humerale magnum striga arcuata inclusa. Pectus albo maculatum.

- ✓ *massiliense.* 68. C. thorace globoso immaculato, elytris nigris: strigis tribus albis; anteriore incurva.

Leptura Massiliensis. Linn. Syst. nat. 2. 640. 19.

Geoff. Inf. 1. 215. 12.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 70.

Habitat in Germania.

Affine C. plebejo at duplo minus. Caput, antennae, thorax nigra. Elytra nigra strigis tribus absque puncto humerali. Corporis latera albo maculata. Pedes nigri.

- mucronata-*  
*tum.* 69. C. thorace rotundato maculato, elytris mucronatis nigris: strigis tribus arcatis flavis basi ferrugineis.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 34.

Habitat in America Dr. Solander.

Caput fuscum lineis duabus flavis. Antennae breves, ferrugineae, apice fuscae. Thorax striga antica flava & utrinque macula ferruginea.

Scutellum fuscum margine flavo. Elytra basi ferruginea, dein fasciae tres flavae, quarum anterior antrorsum, posteriores retrorsum arcuatae.

70. C. thorace rotundato muricato, elytris mucronatis: *angulatum*.  
maculis tribus dorsalibus puncto que medio flavis.

Habitat — — Mus. Britann.

Medium. Caput fuscum maxillis antennisque testaceis. Thorax lineolis parvis, transversis, elevatis muricatus, obscure testaceus margine omni flavo. Elytra laevia, testacea maculis tribus dorsalibus, communibus, flavis & inter 1.  
2. in medio punctum parvum. Corpus rufescens  
maculis lateralibus albis.

71. C. thorace rotundato subspinoso, elytris bidentatis fuscis: strigis quatuor flavis, femoribus erythrocephalum. clavatis compressis.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 60.

Habitat in America Dr. Solander.

C. mucronato duplo minus. Caput, thorax, antennae obscure ferruginea. Thorax tuberculis aliquot dorsalibus, elevatis, acutis. Elytra nigra strigis quatuor rectis, flavis, apice bidentata. Pedes ferruginei femoribus clavatis, compressis.

72. C. thorace rotundato flavo fasciato, elytris nigris: fasciis quinque flavis, pedibus ferrugineis. *detritum*. J

Leptura detrita. Linn. Syst. nat. 2. 646. 20.

Fn. Sv. 694.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 9. tab. 64. fig. 3.

Geoff. Inf. 1. 216. 13.

Habitat in Europae hortis.

*✓ glaucum.*

73. C. thorace rotundato nigrum elytris glauceis basi nigro maculatis.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 68.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Corpus nigrum pube glaucescente.

*✓ fasciatum*

74. C. atrum thorace fasciis duabus, elytris quatuor flavis.

Habitat Mus. Britann.

Caput nigrum lineis duabus longitudinalibus albis. Thorax potius flavus fascia lata media nigra. Elytra glabra, laevia: fasciis quatuor 1. 2. ad suturam coeuntibus. Corpus atrum albo maculatum.

*trifascia-*

- tum.* 75. C. thorace globoso ferrugineo, elytris nigris: fasciis tribus albis; prima annulari.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 59.

Habitat in Lusitania Dr. Grey.

Caput atrum antennis rufis. Thorax rufus tomento cinereo. Abdomen subtus annulis albis.

*✓ Verbasci.*

76. C. thorace rotundato nigro trimaculato, elytris rotundatis subvirescentibus: fasciis tribus abbreviatis nigris; prima lunari.

Leptura verbasci. Linn. Syst. nat. 2. 640. 22.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 5. tab. 6. fig. 15.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 12.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 19.

Habitat in Europae australioris Verbasco.

*✓ ornatum.*

77. C. thorace rotundato: fascia nigra, elytris virescentibus: fasciis tribus integris nigris; prima annulari.

Callidium ornatum. Herbst Arch. tab. 26. fig. 16.

Stenocorus duplex Scop. Fl. Inf. tab. 20. fig. 5.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Pauillo minus. C. verbasci. Differt tantum fascia thoracis fasciisque elytrorum marginem suturamque attingentibus.

78. C. thorace rotundato virescens elytris punctis 4 punctatum quatuor.

Leptura Geoff. Inf. 213. 8.

Habitat in Gallia haud infrequens.

Medium. Caput fuscum antennis brevibus. Thorax pubescens, immaculatus. Elytra punctis quatuor 2. 1. 1. Corpus cinereo tomentosum.

79. C. thorace rotundato nigro maculato, elytris annulare. ✓ bidentatis subvirescentibus; fasciis tribus nigris; prima annulari.

Callidium annulare. Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 74.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks in India Mus. Dom. Lund.

Antennae breves, nigrae. Caput virescens ore nigro. Thorax macula dorsali ramosa nigra. Elytra virescentia basi annulo magno, in medio lunula & postice fascia nigra, apice bidentata. Pedes cinerei.

80. C. thorace rotundato ferrugineo, elytris cine- aegyptia- rascentibus: fasciis tribus fuscis; prima an- cum. nulari.

Habitat in Oriente Dom. Prof. Forskahl.

Duplo minus C. verbasci & thorax ferrugineus.

81. C. thorace rotundato, elytris fuscis: fasciis mysticum. ✓ apiceque cinereis basi rufis.

Leptura mystica. Linn. Syst. nat. 2. 639. 18.

Fn. Sv. 693.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 14.

Geoff. Inf. 1. 217. 15.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.

Voet Coleopt. 2. tab. 26. fig. 8.

Habitat in Europae hortis.

*virens.*

- Variat elytris apice spinosis basique minus rufis.  
**82. C. thorace rotundato virescens antennis nigris,**  
 pedibus testaceis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura & magnitudo praecedentium. Antennae  
 nigricantes. Corpus totum tomentosum, vi-  
 rescens.

- gibbosum.* **83. C. thorace rotundato nigrum elytris cinereo**  
 fasciatis basi bituberculatis apice acuminata.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 18.

Habitat in Italia Dom. Daldorf.

Antennae mediocres, subferrugineae. Elytra  
 fascia lata ante medium apiceque cinereis.  
 Tubercula duo baseos elevata, compressa &  
 apice margo exterior excurrit in spinam va-  
 lidam.

- unifascia-* **84. C. thorace rotundato brunneo, elytris nigris:**  
*tum.* **fascia media nivea basi brunneis.**

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 12.

Habitat in Gallo Provincia Dom. Olivier.

Parva. Antennae mediocres. Caput & thorax  
 brunnea. Elytra basi brunnea, in medio fascia  
 nivea, quae tamen suturam vixattingit, apice  
 nigra. Abdomen nigrum. Femora clavata.

- picipes.* **85. C. thorace globoſo atrum elytris striga obli-**  
 qua alba.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 43.

Habitat — — Mus. Dr. Hunter.

Antennae mediocres, piceae. Elytra laevia, in  
 medio striga abbreviata, obliqua, alba. Pedes  
 picei femoribus clavatis nigris.

- Alni.* **86. C. thorace rotundato nigrum elytris fasciis**  
 duabus albis, elytrorum basi antennis tibiis-  
 que ferrugineis.

**Leptura Alni.** Linn. Syst. nat. 2. 689. 19.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 7.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 21.

Scopol. Fn. Inf. tab. 20. fig. 3.

Habitat in Europa, Anglia.

Quadruplo minus C. mystico.

## 90. LEPTURA. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata, apice fetosa.

*Labium membranaceum,* bifidum.

*Autennae* setaceae.

1. *L. nigra* elytris rufis: puncto medio nigro. *unipunctata*

Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 9.

Habitat Dresdae Dom. Romanus.

Elytra sola rufa puncto medio nigro. Pedes nigri.

2. *L. atra* elytris rubris: apice suturaque media hastata. nigra.

Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 5.

Geoff. Inf. 1. 226. 6.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 11.

Habitat in Europa australiori.

Elytra in omnibus rubra & sutura a medio ad apicem nigra, versus apicem tamen color niger

Lepturae corpus oblongum, antice posticeque attenuatum, saepius tomentosum, immarginatum, tardum, capite exerto, ovato, oculis globosis, prominentibus, marginalibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis, thorace rotundato, angusto, antice angustiore, inermi, scutello parvo, triangulo, elytris rigidis, fornicatis, saepe emarginatis, longitudine abdominalis, pedibus longiusculis, cursoriis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

*angustatus.* Abdominis segmenta margine villis argenteis splendent.

*Mas minor* ab domine magis rufescente.

*2 punctata.* 3. *L. nigra villosa* elytris lividis: sutura punto medio apiceque nigris.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Corpus nigrum tomento cinereo villosum. Elytra livida, rarius testacea sutura, punto medio apiceque nigris. Elytra apice rotundata.

*tomentosa.* 4. *L. thorace villoso aureo*, elytris testaceis apice nigris. Geoff. Inf. 1. 227. 8.

Habitat in Gallia Mus. Dom. de Sehestedt.

Differet videtur a *L. melanura major*. Caput cum antennis nigrum. Thorax tomento aureo tectus. Elytra laevia, testacea, apice subemarginata, nigra. Corpus nigrum ab domine argento villoso, aro emarginato. Pedes atri.

*melanura.* 5. *L. nigra* elytris rubescensibus lividis: sutura apiceque nigris. Linn. Syst. nat. 2. 637. 2.

Fn. Sv. 671. Geoff. Inf. 1. 226. 7. tab. 4. fig. 1.

Petiv. Gazoph. tab. 30. fig. 5.

Degeer Inf. 5. 137. 14.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 4.

Habitat in Europae floribus frequens.

*laevis.* 6. *L. nigra* elytris pedibusque lividis, elytris sutura apiceque nigris.

Habitat Kiliae.

Affinis certe videtur praecedenti at alia & minor.

Antennae nigrae articulo primo apice livido.

Caput & thorax nigra, villosa. Corpus nigrum, argento nitidulum. Pedes lividi.

*livida.* 7. *L. nigra* elytris testaceis immaculatis, pedibus nigris.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 23.

Habitat in floribus Kiloniensibus Mus. D. Lund.

- Statura omnino L. melanurae. Elytra apice rotundata, haud emarginata. Pedes nigri.**
- 8. L. nigra elytris testaceis: vitta nigricante. *frigilata.***  
**Habitat in Suecia Dom. Com. de Souza.**  
**Parva. Caput, antennae, thorax, corpus nigra.**  
**Elytra subemarginata, testacea: taenia obfleta, nigra. Pedes nigri.**
- 9. L. atra elytris purpureis apice emarginatis nigris.**  
**Habitat Cajennae Dr. Hunter:**  
**Corpus atrum, immaculatum. Elytra subholosericea, purpurea, apice late emarginata, atra.**  
**Abdomen atrum segmentis basi argento nitentibus, apice bidentatum.**
- 10. L. nigra elytris sanguineis. Linn. Syst. nat. 2. *sanguinolenta.***  
**638. 4. Sv. 679.**  
**Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 13.**  
**Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9.**  
**Habitat in Europae floribus.**  
**Mas elytris testaceis apice nigris.**  
**Variat elytrorum margine nigro.**
- 11. L. thorace subspinoso, elytris fastigiatis, pectore *meridiana.* nitente.**  
**Cerambyx meridianus. Linn. Syst. nat. 2. 630.**  
**47. Fn. Sv. 648.**  
**Stenocorus meridianus. Mant. Inf. 1. 143. 1.**  
**Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 4. tab. 279. fig. 3.**  
**Habitat in Europae floribus.**  
**Mas nigricans, faemina testacea.**  
**Larva pedibus longissimis Raj.**
- 12. L. ferruginea antennis elytris pectoreque fuscis. *villica.***  
**Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 1.**  
**Habitat in Anglia Mus. Britann.**  
**Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus angulis.**

posticis acutis. Abdomen & pedes ferruginea.

*rubra.*

13. L. nigta thorace elytris tibiisque purpureis.  
Linn. Syst. nat. 2. 638. 3. Fn. Sv. 500.

Frish. Inf. 12. tab. 3. tab. 6. fig. 6.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 30.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 2.

Habitat in Europa.

*testacea.*

14. L. nigra elytris testaceis, tibiis rufis, thorace postice rotundato. Linn. Syst. nat. 2. 638. 5.  
Fn. Sv. 680.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 3.

Habitat in Europae floribus.

Mas praecedentis, saepius copula junctae inventiuntur.

*pubescens.* 15. L. nigra cinereo villosa: costa alarum basi testacea.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Affinis L. testacea. Corpus totum nigrum, cinereo villosum sola costa alarum basi testacea.

*virens.*

16. L. sericeo virescens antennis fusco viridique variis. Linn. Syst. nat. 2. 638. 7. Fn. Sv. 682.

Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 111.

Panz. Naturf. 24. 31. 42. tab. 1. fig. 42.

Degeer Inf. 5. 131. 6.

Habitat in Europae arboribus.

*smaragdula* 17. L. sericeo virescens antennis pedibusque nigris.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Diffr. manifeste a praecedente. Corpus duplo minus, sericeo virescens antennis pedibusque totis nigris.

*atra.*

18. L. corpore toto nigro. Geoff. Inf. 1. 228. 10.

Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Europae floribus.

Tota nigra. Abdomen serico albo nitet.

Variat pedibus nigris & testaceis.

29. *L. nigra humeris abdomineque ferrugineis. humeralis.*

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura L. 4. guttatae at duplo fere major. Pedes nigri.

30. *L. nigra elytris punto baseos lineaque media exclamaflavis. titionis.*

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Parva, Caput & thorax atra, nitida, immaculata.

Elytra truncata, nigra punto baseos lineaque media lunata flavis. Abdomen argento villosum. Pedes nigri.

31. *L. cinerea elytris testaceis: sutura nigra. futuralis.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Antennae testaceae, apice nigrae. Caput, thorax, abdomen cinereo villoso. Elytra laevia, testacea sutura sola atra. Pedes rufi geniculis nigris.

32. *L. nigra scutello albo. scutellata.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Corpus nigrum solo scutello albo aut fulvo.

Elytra apice emarginata. Abdomen serico albo nitet.

33. *L. ferruginea elytris testaceis. lurida.*

Habitat in sylvis Hercinia Dom. Helwig.

Praecedentibus minor. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra testacea. Corpus rufum femoribus apice nigris.

34. *L. nigra femoribus basi rufis. femorata.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput, thorax, elytra, corpus nigrantia, minime nitida. Pedes nigri femoribus basi rufis. Tibiae anticae etiam rufae.

Variat pedibus omnibus nigris femorum annulo tantum rufo.

- ruficornis.* 25. L. nigra antennis pedibusque rufis.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Corpus nigrum, pube flavescente sericeum. Antennae & pedes rufae femoribus posticis apice nigris.  
 Variat femoribus omnibus apice nigris.
- marginata.* 26. L. nigra elytrorum margine tibiisque posticis rufis.  
 Habitat in Norvegia Mus. Dom. Lund.  
 Corpus totum nigrum, obseurum solo margine elytrorum tibiisque posticis rufis.
- nigra.* 27. L. elytris attenuatis, corpore nigro nitido, abdome rubro. Linn. Syst. nat. 2. 639. 14.  
 Fn. Sv. 687.  
 Stenocorus niger nitidus abdomine rubro. Geoff. Inf. 1. 227. 9.  
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 7.  
 Degeer Inf. 5. 144. 24.  
 Habitat in Europae floribus.
- praeusta.* 28. L. aureo pubescens capite elytrorumque apicibus nigris.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Antennarum primus articulus ferrugineus. Thorax, elytra, pectus, abdomen tomento aureo tecta. Pedes rubri.
- ✓ 4 *guttata.* 29. L. fusca elytris nigris: punctis duabus baseos ferrugineis. *glinda*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Thorax cinereo pubescens. Femora basi ferruginea.
- rostrata.* 30. L. obscure aenea pedibus flavis.  
 Habitat in Ammi majus Africæ Dom. Vahl.  
 Caput obscure aeneum ore porrecto cylindrico.  
 Antennae obscurae basi flavescentes. Thorax

& elytra laevia, obscure aenea. Pedes omnes flavi.

31. L. lutea thorace lineis duabus, elytris fasciis luteicornis, quatuor nigris.

Habitat in Carolina Mus. Britann.

Caput cum antennis luteum. Thorax antice attenuatus. Pedes flavi femoribus posticis annulo nigro.

32. L. nigra elytris testaceis: maculis duabus nigris. 4 *maculata*.

Oliv. Ins. 73. tab. I, fig. 7.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino L. 8 maculatae, at duplo fere major. Corpus totum nigrum, minime nitidum elytris solis testaceis maculis duabus magnis nigris. Pedes nigri.

33. L. nigra elytris maculis duabus remotis ferrugineis. 4 *pustulata*.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Macula elytrorum altera ad basin, ubi adhuc puncta duo minuta, marginalia, altera versus apicem fere fasciam constituens. Abdomen auro sericeum.

34. L. nigra elytris lividis: maculis quatuor nigris. 8 *maculata*.

Linn. Syst. nat. 2. 633. Fn. Sv. 684.

Schaeff. Elem. tab. 118. 2. Icon tab. I, fig. 7.

Habitat in Europae floribus.

35. L. nigra elytris flavis: linea longitudinali arcuata interrogativa maculisque quatuor marginalibus nigris. Linn. *tioniis*. Fn. Sv. 685.

Habitat in Suecia Mus. Dom. de Souza.

Statura omnino praecedentis. Linea longitudinalis elytrorum ad suturam, maculae ad marginem exteriorem. Maculae 1. 3. interdum linea arcuata connexae.

*marginella.* 36. L. nigricans elytris futura maculis duabus, marginalibus apiceque flavis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & summa affinitas praecedentis. Caput & thorax nigra tomento cinereo rario tecta. Elytra glabra, nigra futura, maculis duabus marginalibus apiceque flavis. In apice punctum nigrum.

*maculata.* 37. L. nigra elytris testaceis: fasciis tribus dentatis nigris; anteriore subinterrupta. Linn. Syst. nat. 2. 638. 11. Fn. Sv. 686.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 9.

Degeer Ins. 5. 133. 9.

Habitat in Europae hortis.

*punctata.* 38. L. nigra thorace testaceo: puncto nigro, coleoptris testaceis: punctis septem.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Corpus parvum, tenue uti L. rostratae. Antennae nigrae. Caput nigrum macula magna, frontali, testacea. Thorax testaceus puncto medio-nigro. Coleoptra laevia puncto antico in medio, communi, tunc duobus paribus ultimisque apicis. Corpus nigrum abdomine testaceo. Pedes nigri.

*maculata* 39. L. nigra elytris flavis: maculis sex nigris.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Paullo major L. sex maculata. Corpus totum nigrum. Elytra laevia, glabra, flava maculis sex nigris. 1 ad scutellum 2 ad marginem exteriorem 3 ad marginem interiorem major, oblonga, 4 ad marginem exteriorem, 5 in medio & 6 ad apicem. Pedes nigri.

*attenuata.* 40. L. elytris attenuatis: fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis. Linn. Syst. nat. 2. 639. 13. Fn. Sv. 688.

Schaeff. Icon. tab. 39, fig. 6.

Habitat in Europæ floribus.

Abdomen rufum, apice nigrum. Variat tamen  
abdomine toto nigro.

41. L. nigra coleoptris attenuatis flavis: fasciis *calcarata*.  
quatuor nigris; anteriore punctata, secunda  
interrupta, tibiis posticis bidentatis.

Geoff. Inf. I. 226. I.

Habitat in Germania Dom. Smidt, in America.

Statura & magnitudo L. attenuatae. Antennæ  
nigrae articulis basi flavis. Thorax subspinosus.  
Coleoptra flava fascia anteriore e punctis quin-  
que: intermedio in futura, secunda in medio  
interrupta, ultimis duabus integris. Pedes qua-  
tuor antici flavi tarsis nigris, postici nigri ti-  
biis flavis, ante apicem interne bidentatis. Fe-  
mora postica basi flava.

42. L. nigra coleoptris testaceis: fasciis quatuor ni- *subspinosa*.  
gris; anteriore punctata, antennis pedibusque  
flavis.

Leptura armata. Herbst, Arch. tab. 26, fig. 24.

Habitat Kiliae.

Statura & magnitudo omnino praecedentis at  
omnino distincta. Antennæ flavae articulis  
apice parum nigris. Caput nigrum fascia fron-  
tali fulva. Thorax subspinosus, niger. Coleop-  
tra emarginata, testacea fasciis quatuor: pri-  
ma e punctis quinque, ultimis tribus integris.  
Pedes flavi femoribus posticis apice nigris.  
Corpus nigrum, auro nitidulum abdominis seg-  
mentis tribus flavis.

43. L. nigra elytris maculis duabus punctisque duo- *sinuata*.  
bus flavis.

Habitat Kiliae,

Statura & magnitudo omnino praecedentium.  
 Antennae nigrae articulis basi flavis. Elytra  
 laevia, nigra macula baseos magna, medio in-  
 teriori sinuata, flava, secunda in medio adhuc  
 majore, marginem exteriorem attingente, ad su-  
 turam dilatata. Puncta praeterea duo flava,  
 altera versus apicem maculae secundae, altera  
 in medio elytrorum versus apicem. Corpus  
 nigrum abdomine segmentis tribus flavis. Pe-  
 des flavi femoribus posticis apice nigris.

*4fasciata.* 44. L. nigra elytris testaceis: fasciis quatuor den-  
 tatis nigris. Linn. Syst. nat. 2. 639. 12. Fn.  
 Sv. 687.

Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 6.

Degeer Inf. 5. 132. 8. tab. 4. fig. 11.

Habitat in Europæ floribus.

*aurulenta.* 45. L. atra thoracis margine antico posticoque au-  
 reis, elytris testaceis: fasciis quatuor simpli-  
 cibus nigris.

Habitat Kiliae.

Nimis affinis L. 4 fasciatae paullo minor. Thorax  
 niger margine antico & postico villis aureis  
 ciliato. Elytra laevia, testacea fasciis quatuor  
 haud dentatis, atris, apice emarginata. Corpus  
 atrum abdominis segmentis margine albis. Pe-  
 des picei femoribus basi nigris.

*dubia;* 46. L. nigra subvillosa elytris testaceis nigro pun-  
 etatis, pedibus nigris.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Corpus totum nigrum, tomento fulvo nitidulum.  
 Elytra glabra, testacea antice punctis tribus  
 parvis: intermedio anteriore, in medio pun-  
 eto majusculo & versus apicem altero paullo  
 minore. Pedes nigri.

47. L. nigra elytris maculis tribus flavis. *sexguttata.*  
 Herbst Arch. tab. 26. fig. 25.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
 Elytrorum macula anterior baseos ad futuram,  
 reliquae duae in medio.
48. L. atra elytris fasciis tribus flavis: anteriore *trifasciata*.  
 interrupta.  
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 10.  
 Habitat in Suecia Dom. Lund.  
 Statura praecedentium. Antennae cinerascentes,  
 basi nigrae. Caput & thorax atra. Elytra ni-  
 gra fasciis tribus, anteriore e punctis duobus  
 constante, secunda dentem antrorsum emittente,  
 tertia lunata. Pedes nigri.
49. L. viridi coerulea elytris subfastigiatis. Linn. *sericea*.  
 Syst. nat. 2. 638. 8. Fn. Sv. 683.  
 Schaeff. Icon. tab. 84. fig. 1.  
 Habitat in Europae floribus.
50. L. thorace orbiculato, corpore toto atro nitido. *Morio*.  
 Habitat in Suecia Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Statura omnino L. collaris ideoque omnino a  
 L. atra distincta. Differt in primis thorace or-  
 biculato, gibbo.
51. L. thorace globoſo ab domine que rubris, elytris *collaris*.  
 nigris. Linn. Syst. nat. 2. 639. 16. Fn. Sv. 691.  
 Geoff. Inf. 1. 228. 11.  
 Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 9.  
 Degeer Inf. 5. 143. 22.  
 Habitat in Europae floribus.
52. L. thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdo- *virginea*.  
 mine rufo. Linn. Syst. n. 2. 639. 15. Fn. Sv. 690.  
 Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 24.  
 Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 8.  
 Degeer Inf. 5. 144. 23.  
 Habitat in Europae floribus.

91. NECYDALIS. *Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla unidentata.*

*Labium membranaceum, late emarginatum.*

*Antennae filiformes.*

*thalassina.* 1. N. thorace canaliculato, corpore viridi, pedibus nigris.

Habitat Kiliae.

Duplo major N. viridissima. Thorax utrinque gibbus, in medio canaliculatus. Corpus totum viridi aeneum, haud nitidum pedibus omnibus nigris.

*viridissima.* 2. N. thorace teretiusculo, corpore viridi, pedibus anticis testaceis.

*Cantharis viridissima.* Linn. Syst. nat. 2. 650. 23.

Fn. Sv. 717.

*Cicindela viridi coerulea.* Geoff. Inf. 1. 177. 14.

Degeer Inf. 5. 15. 4. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europae hortis frequens.

*coerulescens* 3. N. thorace teretiusculo, corpore coeruleo subopaco.

*Cantharis coerulea.* Linn. Syst. nat. 2. 650. 22.

Fn. Sv. 716.

*Telephorus villosus violaceo coeruleus, antennis pedibusque nigris.* Degeer Inf. 4. 76. 8.

Necydalis corpus oblongum, angustum, tomentosum, immarginatum, agile, capite ovato, inserto, oculis globosis, prominulis, marginalibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis, thorace rotundato: dorso inaequali, scutello brevi, rotundato, elytris rigidis, attenuatis, incumbentibus, longitudine abdominis, pedibus longioribus, tenuibus, femoribus posticis saepius clavatis, tarsis anticis quinque posticis quadriarticulatis, colore vario.

Habitat in Europa cum praecedente.

4. N. thorace inaequali, corpore virescenti obscuro, *virescens*.  
antennis pedibusque nigris.

Cantharis virescens thorace teretiusculo, corpore virescenti fusco, femoribus posticis clavatis. Linn. Syst. nat. 2. 650. 24.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino N. thalasinae at paullo minor.

Caput virescens, obscure nitidum antennis nigris. Thorax utrinque impressus. Elytra obscuriora lineis duabus elevatis: interiore abbreviata. Pedes nigri femoribus posticis in altero sexu clavatis; in altero simplicibus.

5. N. thorace ovato cyanea antennis pedibusque *cyanea*.  
nigris:

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino praecedentis. Caput cyaneum antennis nigris. Thorax ovatus, planus, vix utrinque impressus, laevis, cyaneus, nitidus. Elytra aequalia, laevia, cyanea, immaculata. Corpus cyaneum pedibus nigris, femoribus cyaneis.

6. N. thorace teretiusculo rufo, corpore fusco. *sanguinicolis.*  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput cum antennis fuscum. Thorax punctis duobus impressis. Elytra lineis tribus elevatis striata, fusca.

Variat femoribus posticis incrassatis.

7. N. thorace inaequali virescens elytris apice pe- *barbara*,  
dibusque flavescentibus.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura praecedentium. Differt tantum elytris apice flavescentibus. Pedes flavi femoribus posticis nigris, in altero sexu incrassatis.

- feladonia.* 8. N. thorace inaequali, corpore viridi nitidulo, elytris apice incrassatis coeruleis.  
Habitat Kiliae.
- Paullo minor* N. virescente. Caput viride ore atro, nitido. Antennae nigrae. Thorax inaequalis, viridis, nitidulus. Elytra virescentia lineis tribus elevatis, apice subcrassioribus, coeruleis. Corpus virescens. Pedes nigri femoribus viridibus.
- ruficollis.* 9. N. thorace teretiusculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi aeneis.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.
- Statura N. coeruleoventris.* Caput viride, nitidum antennis nigris. Thorax teretiusculus, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra viridia. Abdomen rufum. Pedes nigri.
- triflis.* 10. N. nigra thorace teretiusculo femorumque basi rufis.  
Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.  
Caput atrum. Elytra laevia, nigra. Corpus nigrum femoribus basi rufis.
- atra.* 11. N. elytris subulatis atra femoribus omnibus clavatis. Linn. Syst. nat. 2. 64. 65.  
Habitat in Europa Australiori.  
Segmentorum abdominis margo subtus ad latera albus. Alter sexus femoribus simplicibus.
- humeralis.* 12. N. elytris subulatis nigris basi flavis.  
Cantharis humeralis. Oliv. Inf. tab. fig.  
Cantharis nigra, elytris attenuatis antice flavis.  
Geoff. Inf. 1. 342. 2.  
Necydalis muralis. Forst. nov. sp. Cont. 1. 48. 48.  
Habitat in Anglia.  
Corpus nigrum. Elytra absque lineis aut margine elevatis. Pedes simplices nigri.
- ustulata.* 13. N. nigra elytris basi suturaque late testaceis.

Necydalis ustulata. Herbst Arch.

Habitat in Germaniae plantis.

Statura omnino praecedentis.

14. N. nigra thorace elytrisque testaceis: his apice melanura.  
nigris.

Habitat in Hispaniae plantis Dom. Vahl.

Corpus nigrum thorace elytrisque testaceis.

Elytra apice nigra.

15. N. capite thoraceque ferrugineis, elytris testa-*notata*.  
ceis apice nigris.

*Paullo. major. p. 9.*

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Statura & magnitudo omnino N. melanurae.

Caput ferrugineum. Antennae mihi defunt.

Thorax subangulatus, ferrugineus, immacula-  
tus. Elytra testacea apice nigra. Abdomen  
nigrum. Pedes ferruginei.

16. N. atra thorace anoque fulvis, elytris subcoeru-*fulvicollis*.  
lescentibus.

Habitat in Germania Mus. Dom. Lund.

Paullo major N. melanura. Caput atrum anten-  
nis nigris. Thorax sublaevis, rufus, nitidus,  
immaculatus. Corpus nigrum ano rufo. Pedes  
nigri.

17. N. elytris subulatis nigra femoribus omnibus *rufa*,  
clavatis, elytris antennisque rufis. Linn. Syst.  
nat. 2. 642. 6.

Leptura nigra elytris pedibusque rubescens  
lividis, coleoptris attenuatis. Geoff. Inf. 1.  
220. 22.

Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 8.

Habitat in Europa.

Elytra basi puncto nigro. Scutellum album.  
Thorax basi apiceque albus. Abdomen maculis  
lateralibus albis.

*praeculta.*

18. *N. patra* elytris testaceis apice nigris, femoribus omnibus clavatis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura omnino praecedentis, a quo tamen differt magnitudine minore, antennis nigris, thorace toto nigro, elytris apice nigris. Abdomen atrum maculis lateralibus supra albis. Pedes mox nigri, mox testacei.

*coerulea.*

19. *N. elytris subulatis coerulea* femoribus posticis clavatis arcuatis.

*Necydalis coerulea.* Linn. Syst. nat. 2. 642. 4.

*Cantharis viridi coerulea.* Geoff. Inf. 1. 342. 3.

*Necydalis ceramboides.* Forster nov. sp. Cent.

I. 47.

Sulz. Hist. Inf. 48. tab. 6. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.

Habitat in Oriente, Europa australiori.

Variat pedibus simplicibus.

*Podagra-  
riae.*

20. *N. elytris subulatis testaceis,* corpore nigro, femoribus posticis clavatis basi testaceis. Linn. Syst. nat. 2. 642. 9.

*Cantharis nigra,* elytris attenuatis fulvis, femoribus posticis globosis. Geoff. Inf. 1. 343. 4.

*Necydalis flavescens.* Degeer Inf. 5. 155. 4.

*Necydalis flavescens.* Linn. Syst. nat. 2. 642. 8. vix distincta videtur.

Habitat in Europae hortis.

*bicolor.*

21. *N. coerulescens* thoracis margine abdomine pedibusque testaceis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.

Antennae obscurae. Thorax rufus linea dorsali lata, coerulescente. Elytra vix striata, coerulescentia, immaculata. Abdomen testaceum. Pedes testacei femoribus posticis valde clavatis.

22. N. nigra elytris attenuatis virescentibus, femori- *flavipes.*  
bus posticis incrassatis arcuatis.

Habitat Kiliae.

Praecedentibus duplo minor. Caput nigrum, im-  
maculatum. Thorax utrinque impressus, viridi  
niger, nitidulus. Elytra virecentia, obscura  
linea elevata sesquialtera. Corpus nigrum.  
Pedes nigri tibiis anticis femoribusque posti-  
cjs clavatis, arcuatis.

23. N. nigra thorace elytris que testaceis, pedibus rufis. *testacea.*

Habitat in Germania.

Statura omnino praecedentium. Caput fuscum  
antennis nigris. Thorax planus, testaceus,  
immaculatus. Elytra attenuata, paullo palli-  
diora. Corpus nigrum pedibus rufis.

24. N. elytris subulatis glaucis, corpore nigro, abdo- *glaucescens*  
minis incisuris albis.

Necydalis glaucescens. Linn. Syst. nat. 2. 642. 7.

Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 6.

Habitat in Europa australi.

25. N. elytris subulatis testaceis, pedibus simplici- *simplex.*  
bus. Linn. Syst. nat. 2. 643. 10.

Habitat in Europa.

Forte varietas sexus N. Podagrariae.

26. N. elytris subulatis, abdomine pedibusque fla- *Quercus.*  
vescentibus.

Habitat in Daniae Quercu Mus. Dom. Lund.

Minuta. Antennae nigrae articulo primo flavo.

Caput nigrum ore flavo. Thorax niger, im-  
maculatus. Elytra fusca. Abdomen & pedes  
flava.

= = =

**92. MOLORCHUS.** *Palpi* quatuor inaequales, filiformes.

*Maxilla* membranacea, bifida.

*Labium* membraceum, bifidum.

*Antennae* setaceae.

*abbreviata.* I. M. elytris dimidiatis ferrugineis immaculatis, antennis brevibus

Necydalis major. Linn. Syst. nat. 2. 641. 1.

Leptura abbreviata. Mant. Inf. 1. 100. 35,

Musca cerambyx major. Schaeff. Monogr. 1753.  
fig. 12. Elem. tab. 33. fig. 2. Icon. tab. 10.  
fig. 10. 11.

Degeer Inf. 5. 148. 1. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Europae floribus.

Genus affine certe Lepturis maxilla bifida tamen distinctum. Palpi quatuor breves, inaequales, incurvi anteriores paullo longiores, quadriarticulati: articulo ultimo ovato, obtuso adhaerentes maxillae dorso, posteriores breviores: articulo ultimo ovato, obtuso adnatâ labii basi exteriori. Mandibula cornea, arcuata, edentula. Maxilla brevis, membranacea, bifida: laciniis

Molorchi corpus oblongum, angustatum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, declivi, inserto, oculis reniformibus, vix prominulis, marginalibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis, thorace rotundato, angusto: dorso canaliculato, elytris rigidis, fornicatis, abbreviatis, alis plicatis, ab domine incumbentibus, fere longitudine abdominis, ab domine elongato, margine utrinque reflexo, pedibus longiusculis, femoribus clavatis, tarsis quadriarticulatis, colore testaceo.

subaequalibus. Labium breve, membranaceum,  
bifidum: laciniis rotundatis.

2. M. elytris abbreviatis, abdomine atro: fasciis variegata.  
fulvis.

Leptura variegata. Mant. Inf. I. 108. 30.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae fuscae longitudine corporis. Caput  
atrum fronte flavescente. Thorax niger margine  
antico & postico lineaque dorsali fulvis. Seu-  
tellum fulvum. Elytra fusca, ad suturam grisea,  
apice nigra. Pectus atrum, fulvo maculatum.  
Abdomen atrum supra fascia baseos, pone hanc  
subtus fascia, versus apicem annulus totum ab-  
domen cingens; pone hunc fascia dorsalis &  
tandem anus puncto fulvo terminatus. Pedes  
ferruginei plantis fuscis.

3. M. elytris dimidiatis testaceis apice lineola alba, dimidiata.  
antennis longis.

Leptura dimidata. Mant. Inf. I. 100. 37.

Necydalis minor. Linn. Syst. nat. 2. 641. 2.

Fn. Sv. 837.

Musca cerambyx minor. Schaeff. Mon. 1753.

fig. 6. 7. Icon. tab. 95. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 51.

Degeer Inf. 5. 151. 2.

Habitat in Europae hortis.

4. M. elytris dimidiatis testaceis immaculatis, anten- umbellata-  
nis longis. rum.

Leptura unbellatarum. Mant. Inf. I. 100. 38.

Necydalis umbellatarum. Linn. Syst. nat. 2.

641. 3,

Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 1.

Habitat in Germaniae umbellatis.

Praecedente duplo minor.

93. SPONDYLIS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* conica, crassa,  
integra.

*Labium* corneum, bifidum.

*Antennae* moniliformes.

*buprestoides*, 1. Spondylis.

*Attelabus buprestoides*. Linn. Syst. nat. 2. 621. 3.

Frish. Inf. 13. 23. tab. 19.

Degeer Inf. 5. 34. 21. tab. 5. fig. 21.

Habitat in Europae sylvis.

94. SYNODENDRON. *Palpi* filiformes,  
inaequales.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* filiforme, corneum,  
apice palpigerum.

*Antennae* lamellatae.

*cylindri-*  
*cum.*

x. S. thorace antice truncato quinque dentato, capitis cornu erecto.

*Scarabaeus cylindricus*. Mant. Inf. 1. 6. 41.

Linn. Syst. nat. 2. 544. II. Fn. Sv. 380.

Oliv. Inf. 1. 3. 47. 54. tab. 9. fig. 80.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 2.

Voet. Scarab. tab. 20. fig. 131.

*Lucanus cylindricus* Laichart Inf. 4. 4.