

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förfärlingar, 1872. N:o 1.
Stockholm.

Coleoptera Caffrariæ, annis 1838—1845 a J. A.
WAHLBERG collecta. *Longicornia* descriptsit
OL. IM. FÅHRÆUS.

[Meddeladt den 10 Januari 1872.]

Div. 1. PRIONIDÆ (LACORD).

1. *Cacosceles* (NEWMAN) *Oedipus*: elongatus, nigro-piceus, subglaber, palpis, antennis, elytris tarsisque ferrugineis; capite subquadrato, supra convexo, postice lateribusque rugoso-granulato, fronte fovea longitudinali impressa, parcus punctata, mandibulis porrectis, falcatis, capite longioribus; antennis validis, serratis, medium elytrorum paullo excedentibus; thorace valde transverso, postice leviter angustato, lateribus obtuse tridentato, dorso inæquali, medio basin versus canaliculato parcusque punctato, alibi sat fortiter rugoso; elytris retrorsum subattenuatis, modice convexis, subtilius ruguloso-punctulatis, singulatim lineis tribus longitudinalibus tenuissimis elevatis, duabus scilicet discoidalibus, ante apicem conjunctis, lateraliter utrimque evanescente. Long. (mandib. excl.) 35, lat. (ad hum.) 13 millim. ♂

Cacosceles Oedipus NEWMAN. The Entom. Mag. V. p. 491 ♀. LACORD. Gen. Col. T. VIII, p. 64.

2. *Tithoes* (J. THOMSON) *confinis*: oblongus, nigropiceus, nitidus, inæqualiter griseo-tomentosus, capite intra apicem transversim impresso, fronte rugosa, longitudinaliter canalieulata; antennis medium elytrorum paullo excedentibus, scapo valde incrassato: thorace transverso, lateribus acute trispinoso, disco laevigato, ante medium utrimque callo elevato, limbo dense griseo-tomentoso; elytris thorace cum capite fere triplo longioribus, parum convexis, inæqualibus, basi interne subglabris distinctiusque ruguloso-punctatis, alibi tomento griseo variegatis; pedibus validis, griseo-pubescentibus. Long. (mandib. excl.) 48—60, lat. 18—23 millim.

Tithoes confinis CASTELNAU. Hist. nat. d. Ins. II, p. 395.

Obs. Species a *Priono maculato* FABR. ægre discriuenda, elytris tamen passim subfoveolatis, lineis elevatis oblitteratis, in-

dumento minus regulariter variegato, superficie dorsi nitidiore, nec non scapo antennarum femoribusque distinctius incrassatis discrepare videtur.

3. *Macrotoma* (AUD. SERVILLE) *natala*: elongata, picea, fronte sulcata, thorace inæquali, lateribus crebre spinosis, elytris bruneo-castaneis, confertim granuloso-punctatis, lineis 4 longitudinalibus elevatis; femoribus tibiisque nigris, temere spinosis. Long. 55—60, lat. 18—20 millim.

Macrotoma natala DEJ. Cat. J. THOMSON Essai d'une classif. d. Ceramb. p. 314.

Caput subdeflexum, latitudine parum longius, rugoso-punctatum, medio canalicula longitudinali, antice in foveam dilatata, insculptum, vertice convexo; oculi maximi, supra et subtus sat approximati, parum prominuli. Antennæ aut nigræ, aut extrorsum rufescentes; ♂ longitudine corporis, scapo subtus aspero, ♀ medium elytrorum paullo excedentes, scapo mutico. Thorax postice longitudine sua dimidio latior, antrorsum ♂ leviter, ♀ distincte angustatus, basi apiceque subtruncatus, supra ad latera rugoso-punctatus, dorso sub-lævigatus, nitidus, antice sulco longitudinali, medio plus minusve in foveam dilatato, exaratus, versus basin ♂ foveolis tribus, arcuatim dispositis, ♀ tantum unica impressus, ante medium dorsi utrimque tuberculo parvo instructus, marginibus lateralibus totis atque baseos versus angulos crebre spinosis, spina angulari baseos validiore. Scutellum sub-semiovale, subtiliter granuloso-punctatum; obsolete canaliculatum. Elytra thorace quintuplo longiora eodemque ♂ parum, ♀ distinctius latiora, pone humeros callosso-elevatos fere linearia, apice singulatim subrotundata, angulo suturali tenuissime mucronato; dorso parum convexa, creberrime granuloso-punctata vel coriacea, subopaca, lineis 4 longitudinalibus elevatis, una scilicet juxta suturam, integra, duabus in disco, ante apicem abbreviatis, quartaque ad latera, utrimque evanescente. Corpus subtus modice convexum, nitidum, pectore flavo-pubescente, postice medio late impresso et in impressione canaliculato. Pedes nitidissimi, ♂ elongati, ♀ breviores et angustiores, femoribus tibiisque supra et subtus creberrime spinulosis.

4. *Macrotoma coelaspis*: elongata, nigropicea, subnitida, fronte late sulcata, vertice canaliculato; thorace postice longitudine latiore, antrorsum angustato, dorso lævi, basi et ante medium impresso, lateribus scabris, marginibus lateralibus totis atque baseos juxta angulos spinosis, spinis angularibus baseos longitudinalibus; elytris fusco-ferrugineis, coriaceis, lineis longitudinalibus elevatis obsoletis, muerone anguli suturalis vix conspicuo; femoribus subtus tenuissime denticulatis. Long. 40—50, lat. 13—15 millim. ♀

Macrotoma coelaspis WHITE Longie. Brit. Mus. 1: p. 38.

5. *Macrotoma scabridorsis*: elongata, piceo-nigra, supra subopaca, capite thoraceque rugoso-serobiculatis, illo medio longitudinaliter sulcato, hoc impressionibus duabus dorsalibus transversis notato, lateribus suberenulatis, angulis baseos unispinosis; elytris coriaeis, lineis elevatis solitis oblitteratis, angulis suturalibus sat distincte mucronatis; femoribus tibiisque subtus obsolete denticulatis. Long. 28—35, lat. 11—13 millim.

Macrotoma scabridorsis WHITE Longie. Brit. Mus. 1:
p. 38.

Variat elytris ferrugineis, margine nigricante, femoribus que eastaneis.

6. *Macrotoma fuliginosa*: elongata nigro-picea, supra subopaca, capite thoraceque rugoso-serobiculatis, hoc lateribus irregulariter erenulatis, angulis posticis spinosis; elytris fusco-ferrugineis, coriaeis, costis 3 longitudinalibus, convexis, lineisque totidem elevatis. Long. 23—33, lat. 7—10 millim.

Macrotoma fuliginosa Mus. Berol. teste D. DONRN.

Caput latitudine fere brevius, rude rugoso-serobienlatum, fronte late impressa; oculi transversi, parum convexi. Antennæ ♂ longitudine corporis, ♀ medium elytrorum paullo excedentes, articulis tribus basalibus ♂ sebris, ♀ fortiter punctatis. Thorax postice longitudine sua dimidio latior, antrorum angustatus, apice truncatus, basi leviter bisinuatus, supra modice convexus, rugoso-serobiculatus, dorso medio interdum sublævigato, fovea ante scutellum foveolisque tribus obsoletioribus ante medium, triangulariter dispositis, insculptus, marginibus laterum parum distinctis, irregulariter denticulatis, angulis baseos spina acuta armatis. Scutellum semiovale, antice declive, postice rugosum. Elytra thorae quintuplo longiora eodemque ♂ parum, ♀ fere dimidio, latiora, sublinearia, apice singulatim leviter rotundata, angulo suturali distincte mucronato; dorso modice convexa, crebre, basin versus sat fortiter, granulata, coriacea, fusco-ferruginea, margine laterali piceo; costis tribus longitudinalibus et in illis lineis totidem elevatis, plus minusve distinctis, intermedia fere integra, reliquis utrimque abbreviatis, præedita. Corpus subtus convexum, peatore prosternoque coriaeis, opacis, dense flavo-lanuginosis; abdomine parce punctulato, nitido. Pedes ♀ mediocres, ♂ robustiores, femoribus tibiisque ♀ atque femoribus posterioribus ♂ remote punctatis, femoribus anticis tibiisque omnibus ♂ sat rude scabrosis; tibiis anticis hujus sexus apicem versus interne dense fulvo-lannginosis, tarsis latioribus, subtus densissime fulvo-spongiosis.

Variat antennis versus apicem palpisque ferrugineis.

7. *Aulacopus* (AUD. SERV.) *natalensis*: oblongus, sublinaris, supra glaber, nitidus, capite medio soleato; thorace transverso, antrorum angustato, supra crebre rugosopunctato, callis quatuor lævigatis in dorso, intermediis oblongis, fere marginem apicis

attingentibus, exterioribusⁱ medium dorsi parum excedentibus, extus hamatis, omnibus ad basin arcuatim conjunctis, foveolas duas pone medium, carinula separatas, includentibus; marginibus laterum crenulatis; elytris subdeplanatis, 4-costatis, costis lœvibus, distinctis, apicem versus evanescentibus, intersticiis reticulato-rugosis, obsolete lineolatis; pectore flavo-villoso. Long. 29, lat. 11 millim. ♂.

Aulacopus natalensis WHITE Longie. Brit. Mus. 1. p. 34.

8. *Mallodon* (AUD. SERV.) *Downesii*: oblongum, subdepressum, piceum vel castancum, supra glabrum, nitidum; capite remote at profunde punctato, fronte excavata; mandibulis intus valide dentatis; thorace transverso, rugoso-punctato, margine laterum crenulato, disco secundum latitudinem capitum quadrangulariter subelevato carinisque terminato, spatio interjacente ante medium plaga duas subtrigonas elevationes, lœvigatas, singulam petiolo, introrsum arcuato, cum margine baseos con junctam, lineamque medianam, tenuissimam, lœvem, includente, adjacente utrimque carinula brevi obliqua, distincta; elytris lœvissimis, lineis tamen tribus longitudinalibus elevatis nonnumquam plus minusve conspicuis. Long. (mandib. excl.) 40—48, lat. 16—19 millim.

Mallodon Downesii HOPE ann. a. Mag. nat. hist. XI. p. 366.

Mallodon lœvipenne WHITE Longie. Brit. Mus. 1: p. 45.

Mallodon miles DEJ. Cat. (teste WESTERM.).

Obs. *M. marilloso* FABR. primo intuitu simillimum, differt tamen præcipue mandibulis validius dentatis scapoque antennarum (in specie Fabriciana sat elongato atque fortiter arcuato) breviore, fere recto, obconico.

Div. 2. CERAMBYCIDÆ (LACORD.).

9. *Zamium* (PASCOE) *triviale*: oblongum, piceum, nitidum, griseo-pubescent, supra rugoso-punctatum; fronte canaliculata; thorace dorso inaequali. Long. 11—14, lat. $2\frac{1}{3}$ —4 millim.

Caput subtransversum, crebre rugoso-punctatum, fronte impressa, tenuiter canaliculata; oculi magni, fortiter granulati, interne emarginati. Antennæ medium elytrorum paullo excedentes, pilis longis griseis adspersæ, piceæ, apicem versus dilutiores, articulis basalibus scabris. Thorax latitudine media fere brevior, basin versus angustatus, antice posticeqne subtruncatus, ante medium rotundato-ampliatus, dorso longitudinaliter impressus, impressione utrimque ruga irregulari, antice abbreviata, glabra, terminata et ante sentellum rugulam brevissimam ejusmodi includente. Scutellum apice rotundatum, densius pubescens. Elytra linearia, basi thoracis duplo latiora, humeris

calloso-elevatis; postice conjunctim rotundata, thorace quadruplo longiora, dorso depressa, sat fortiter rugoso-punctata, lineis duabus longitudinalibus elevatis oblitteratis. Corpus subtus modice convexum, pectore crebre abdomineque parcus granulatis. Pedes breviusculi, dilutius piceo-ferruginea, pilis longis, griseis, adspersi.

10. *Zamium 4-signatum*: oblongum, nigro-piceum, nitidum, griseo-pubescentia fuscoque pilosum, supra rugoso-punctatum; thorace dorso fasciculoso-tuberculato, elytris singulatim testaceo-bipustulatis. Long. 15, lat. 4 millim.

Caput latitudine vix brevius, sat crebre rugoso-punctatum, fronte subimpressa; oculi majusculi, fortiter granulati, profunde emarginati. Antennae medium elytrorum nonnihil excedentes, concolores, pilis longis griseis adspersae, articulis basalibus scabris. Thorax latitudine media paullo brevior, basin versus angustatus, intra basin subconstrictus, ante medium rotundato-ampliatus, antice posticeque truncatus, dorso depresso, sat crebre rugoso-vel granulato-punctatus, griseo-villosus, margine antico tuberculisque quatuor in disco, duobus scilicet ante medium, totidemque posterius, magis distantibus et obsoletioribus, umbrino-fasciculosis. Scutellum breve, apice subrotundatum, dense albido-tomentosum. Elytra linearia, basi thoracis duplo latiora, humeris elevatis; postice conjunctim rotundata, thorace quadruplo longiora, parum convexa, sat fortiter rugoso punctata, pube grisea, pilis erectis fuscis immixta, adspersa, singulatim maculis duabus parvis, rotundis, flavo-testaceis, una in medio, altera ante apicem, notata. Corpus subtus modice convexum, pectore crebre abdomineque parcus tenuiusque granulato-punctatus. Pedes mediocres, concolores, griseo-pilos.

11. *Xystrocera* (AUD. SERV.) *dispar*: elongata, subtus fusco-ferruginea, griseo-pilosa; thorace supra viridi, plagiis variis testaceis; clytris granulato-punctatis, glabris, testaceis, vitta distoidali marginaque coeruleo-virescentibus. Long. 20—24, lat. 4½—5 millim.

♂ Caput longitudine duplo latius, ferrugineum, punctatum, tenuiter flavo-griseo-pubescentia, fronte transversim valde convexa, linea media longitudinali, tenui, insculpta; oculi lunati, modice convexi. Antennae corpore fere dimidiò longiores, sat validæ, articulis 4 basalibus scabris, piceo-nigris, reliquis fusco-ferrugineis. Thorax latitudine vix brevior, intra basin apicemque subconstrictus, antice fere truncatus, postice medio late rotundato-lobatus, subtus fusco-ferrugineus vel virescens, supra laetius viridis, crebre et subtiliter ruguloso-punctulatus, dorso depresso, tenuiter canaliculatus, plaga fureata impressa, a basi ultra medium extensa, testacea, flavo-griseo-tomentosa, adjacentibus lituris tribus parvis ejusmodi versus latera utrimque, plagæ dorsali proxima ovata, distinctiore. Scutellum subtriangulare, fusco-

virescens, griseo-pubescentes. Elytra thorace fere quadruplo longiora, antice medio thoracis haud latiora, retrosum sensim leviter attenuata, apice singulatim rotundata, dorso subdepressa, ubique sat crebre granuloso-punctata, dilute testacea, subopaca, vitta longitudinali in disco, jam integra, jam ante apicem abbreviata, margineque obscure viridibus, lineis tribus longitudinalibus dorsi elevatis plus minusve distinctis. Corpus subtus convexum, coriaceum, fusco-ferrugineum, flavo-griseo-pilosum. Pedes sat elongati, nigri aut picei, nitidi, parce griseo-pubescentes, femoribus pedunculatis, versus apicem clavatis; tibiis compressis; tarsis ferrugineis.

♀ differt antennis tenuioribus, corpore vix longioribus; thorace elytris distinete angustiore, dorso remotius graulato-punctato, signaturis testaceis non impressis, fere glabris. elytrisque linearibus.

Variat vertice infuscato antennisque totis ferrugineis.

12. *Xystrocera semilunaris*: oblonga, ferruginea, supra opaca, subtus nitida tenuiterque pubescens; thorace piceo, dorso lunula impressa, testacea; elytris dilutins ferrugineis, margine anguste infuscato. Long. 13, lat. 3 millim. ♂.

Caput longitudine duplo latius, rufo-ferrugineum, subtiliter punctatum, fronte transversim elevata, medio distinete sulcata; oculi mediocres, profunde emarginati. Antennæ corpore fere duplo longiores, subsetacea, ferruginea, basi obscuriores. Thorax subtransversus, antice fere truncatus, postice medio nonnihil rotundato-productus, lateribus subæqualiter rotundato-ampliatis, supra parum convexus, subtilissime coriaceus, fusco-piceus, indeterminate ferrugineo-variegatus, lateribus antice submetallicomicantibus; dorso leviter canaliculato, medio areu dilutiore, tenuiter pubescente, insculpto. Scutellum semi-ovale, impressum, ferrugineum. Elytra thorace vix quadruplo longiora ejusdemque medio non latiora, sublinearia, apice singulatim rotundata, dorso depressa, antice crebre, postice remotius granuloso-punctata, dilute testacea, margine laterali apiceque anguste infuscatis; lineis tribus dorsalibus elevatis, postice abbreviatis, plus minusve distinctis. Pedes quoad formationem ut in specie antecedente, tenuissime griseo-pubescentes, ferruginei, femoribus, præter basin, piceis.

13. *Coelodon* (AUD. SERV.) *rusticum*: elongatum, nigro-piceum, griseo-sericeo-pubescentes, fronte sulkata, thorace transversim pliato; elytris castaneis, nitidis, apice muticis. Long. 39, lat. 11 millim. ♀.

Caput longitudine haud latius, coriaceum, fronte profunde sulkata, ad basin antennarum utrimque tuberculo prædita; oculi fere divisi, fortiter granulati. Antennæ sat validæ, medium clytrorum paullo excedentes, articulis 3—5 subnodosis, 6—10 subcompressis, apice interne angulatis. Thorax latitudine baseos

fere longior, medio rotundato-ampliatus, intra apicem fortiter constrictus, dorso antice leviter rotundato-productus, basi utrimque sinuatus, supra transversim irregulariter plicatus, plicis dorsibus subglabris. Scutellum semi-ovale, subtiliter coriaceum, æqualiter pubescens. Elytra sublinearia, thorace fere quintuplo longiora illiusque basi fere duplo latiora, antice truncata, apice singulatim rotundata, dorso modice convexa, minus æqualiter et parum distincte coriacea, fusco-castanea nitida, pube flavo-griseo-sericea, subnebulosa, induta, lincis 3 longitudinalibus elevatis vix conspicuis. Corpus subtus convexum pedesque densius et æqualiter griseo-pubescentia, femoribus posticis segmentum tertium abdominis vix excedentibus.

14. *Plocæderus* (J. THOMS.) *pronus*: oblongus, supra niger, subtus piceus, epistome, palpis aptennisque fusco-ferrugineis, thorace supra transversim plicato, lateribus unispinosis; elytris tenuissime griseo-sericeis, apice bispinosis, antennarum articulis 3—5 aculeatis. Long. 19, lat. 5 $\frac{1}{2}$ millim. ♂.

Caput latitudine fere longius, vertice tenuiter granulato, fronte inter oculos distincte carinata, antice declivi et foveolata; oculi lunati, fortiter granulati, supra approximati. Antennæ corpore duplo longiores, apicem versus attenuatae, scapo subscabro, articulis 3—5 apice nodosis distinctiusque spinosis, 6—10 denticulatum productis. Thorax latitudine baseos vix brevior, antice truncatus, basi medio leviter rotundato-lobatus, supra transversim, crebre at minus regulariter, plicato-rugosus, lateribus spina valida acuta armatis. Scutellum breve, apice subrotundatum, medio impressum. Elytra linearia, basi thoracis fere duplo latiora latitudineque sua triplo longiora, apice conjunctim rotundata ibique spinulis duabus sat distinctis armata, dorso sat convexa, obsolete coriacea, æqualiter griseo-sericea. Corpus subtus modice convexum, subcoriaceum, tenuissime flavo-griseo-pubescentia. Pedes longiusculi, subsimplices, coriacei, griseo-pilosi, picei, femoribus basi et nonnumquam tibiis tarsisque plus minusve rufescens.

15. *Plocæderus frenatus*: oblongus, niger, supra tenuissime, subtus densius griseo-pubescentia, antennis fusco-ferrugineis, articulis 3—6 apice valide aculeatis; thorace supra irregulariter plicato, lateribus spinosis, antice callosis; elytris convexis, apice bispinosis. Long. 33—37, lat. 11—12 millim.

♂ *Pl. prono* in plurimis simillimus; praeter magnitudinem insigniorem, differt tantum antennis corpore triplo longioribus, apicem versus gracillimis, articulis 3—6 coriaceis, punctis sparsis impressis, 7—10 apice indistincte modo angulatis; thorace supra temere plicato, plicis partim gyriformibus, lateribus medio spina acutissima armatis atque ad marginem apicis distinctius callosis; corpore subtus densius villoso pedibusque indeterminate nigro-piceis vel picco-rufescens.

Femina discrepat antennis corpore parum longioribus, articulis 3—6 obsolete punctatis, exterioribus apice distinctius dentatis.

16. *Pachydissus* (NEWM.) *natalensis*: elongatus, piceo-niger, flavo-grisco-sericeus, fronte canaliculata, vertice glabro, subtiliter granuloso; thorace transversim, rude et irregulariter, plicato-rugoso, lateribus inermibus; elytris sublævibus, pube sericea plus minusve inæqualiter vestitis, sutura apice distincte mucronata. Long. 34, lat. 9½ millim.

Hammaticherus natalensis WHITE Longie. Brit. Mus. 1: p. 128.

17. *Tapinolachnus* (J. THOMS.) *Gyllenhalii*: oblongus, depresso-niger, subnitidus, pube griso-olivacea, sericeo-micante, obduc-tus, thorace supra transversim plicato, medio canaliculato; elytris dorso biplagiatis subdenudatis, apice tenuiter mucronatis. Long. 21—23, lat. 5—5½ millim. ♂.

Caput latitudine haud brevius, æqualiter griseo-tomentosum, fronte canaliculata; palpi ferruginei; oculi fortiter granulati, profundissime emarginati, supra approximati. Antennæ corpore fere duplo longiores, subsetaceæ, a basi ultra medium subtus dense griseo-albido-villosæ, articulis 3—5 apice nodosis. Thorax latitudine baseos haud brevior, antice posticeque subtruncatus, lateribus modice rotundatis, apice callosis; dorso inæqualis, longitudinaliter canaliculatus, transversim irregulariter, plus minusve distincte, plicato-rugosus, sericeo-pubescentis, medio subdenudatus. Scutellum breviter triangulare. Elytra linearia, thorace triplo longiora illiusque basi fere duplo latiora, apice conjunctim rotundata, angulo suturali tenuissime mucronato; dorso valde depressa, obsolete punctulata, griseo-holosericeo-pubescentia, fasciis duabus, invicem atque a basi apiceque æqualiter distantibus, subdenudatis. Corpus subtus et pedes nigra, tenuiter punctulata, æqualiter griseo-pubescentia.

Fem. ignota.

18. *Tapinolachnus furvus*: oblongus, depresso-niger, nitidus, griseo-pubescentis, fronte sulcata; thorace inæquali, dorso canaliculato; elytris remote punctulatis, apice muticis. Long. 15, lat. 3½ millim.

♂ Caput cum palpis oculisque ut in specie antecedente. Antennæ corpore duplo longiores, setacea, nudiusculæ, articulis 3—5 apice leviter nodosis. Thorax latitudine media haud longior, basi truneatus, apice medio levissime rotundato-productus, lateribus parum rotundato-ampliatis, antice callosis; supra inæqualis, medio longitudinaliter canaliculatus, utrimque transversim irregulariter plicato-rugosus. Scutellum breviter triangulare. Elytra linearia, thorace triplo longiora illiusque basi duplo latiora, apice conjunctim rotundata, dorso depressa, parce

punctulata, æqualiter pubescentia, callis humeralibus tantum denudatis. Corpus subtus et pedes ut in antecedente.

♀ differt antennis corpore haud longioribus thoraceque distinctius plicato.

Obs. Antennis utriusque sexus nudis elytrisque apice inermibus species a gen. *Tapinolachno* quidem discrepat, characteribus vero genericis ceterum, ut etiam habitu, congruentibus, non dubitavimus generi dicto eamdem adnumerare.

19. *Hesperophanes* (MULS.) *amicus*: elongatus, fusco-testaceus, flavo-griseo-pubescent, supra subopacus; oculis convexis, thorace sat rude rugoso-punctato, basin versus angustato; elytris paullo dilutioribus, antice sat fortiter, versus apicem sensim tenuius rugoso-punctatis, angulo suturali subprominulo. Long. 20—24, lat. $5\frac{2}{3}$ — $6\frac{1}{2}$ millim.

Hesperophanes amicus WHITE Longie. Brit. Mus. p. 304.

20. *Hesperophanes bimaculatus*: oblongus, piceo-niger, flavo-griseo-pilosus, thorace supra inæquali, medio longitudinaliter impresso; scutello dense albido-tomentoso; elytris postice simpliciter, basin versus rugoso-punctatis, singulatim maculis duabus, una in medio, altera ad apicem, testaceis. Long. 12, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.

Callidium bimaculatum FABR. Syst. El. II: p. 344. OLIV. Ent. IV: 70, 13, tab. V. f. 61. SCHÖNH. Syn. Ins. III: p. 456.

21. *Cordylomera* (AUD. SERV.) *Schönherrii*: elongata, linearis, subdepressa, flavo-testacea, capite thoraceque flavo-tomentosis, nigro-vittatis; elytris glabris, punctatis, lineis fasciisque compositis, nigro-violaceis; antennae pedibusque flavo nigroque variegatis. Long. 15, lat. $3\frac{2}{3}$ millim. ♂.

Caput latitudine baseos haud brevius, fronte transversim elevata verticeque flavo-tomentosis, medio vitta longitudinali nigra, in vertice glabra, nitida, notatis; epistome fusco-castaneum, glabrum; oculi lunati, prominuli, fortiter granulati. Antennæ corpore sesqui longiores vel ultra, subsetaceæ, articulis 1 & 2 nigris, 3—10 flavis, apice nigris, 3—6 apice nodosis spinaque acuta armatis. Thorax latitudine baseos paullo longior, basi apiceque constrictus, lateribus medio leviter rotundatis, vix vel obsolete tuberculatis; supra et subtus dense flavotomentosus, dorso depresso, sub-inæqualis, vittis tribus longitudinalibus, nigris, una in medio, subinterrupta, glabra, nitida, reliquis lateralibus, integris. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, apice acuminatum. Elytra parallela, thorace fere quadruplo longiora, at medio illius parum latiora, apice conjunctim rotundata, angulo suturali acuminatim producto; dorso depresso, ubique confertim subreticulato-punctata, flava, subopaca, vitta longitudinali, linearis, prope suturam, antice posticeque ad hanc dilatata, margine exteriore, striga obliqua, ab humeris ad vittam discoidalem ducta, plagaque pone medium, et marginem

lateralem et vittam discoidalem tangente, nigro-violaceis; lineis duabus longitudinalibus elevatis valde obsoletis. Corpus subtus parum convexum, obsolete coriaceum, fuscum, pallide sericeo-pubescentibus, lateribus pectoris flavescentibus. Pedes elongati, femoribus longissime petiolatis, apice abrupte clavatis, flavis, clava nigra, nitida; tibiis gracillimis, flavis, apice nigris; tarsis fuscis.

Aporus ¹⁾, nov. gen.

Palpi validiusculi, subæquales, articulo apicali securiformi. Oculi lunati, prominuli, fortiter granulati, supra sat distantes. Frons inter antennas sulcata, tuberculis antenniferis interne acuminatim elevatis. Antennæ ($\sigma^?$) 11-articulatae, corpore paullo breviores, filiformes, scapo valido, cylindrico, parum arcuato, articulo 3:o sequente fere sesqui longiore, 4—7 subæqualibus, 8—11 longitudine decrescentibus, 6—10 interne carinulatis, apice acutangulatim productis. Thorax latitudine longior, subcylindricus. Scutellum apice rotundatum. Elytra cylindrica. Corpus subtus modice convexum, segmento quinto abdominis apice leviter sinuato, lobo intercoxali prosterni latiusculo, apice infexo; coxis antieis globosis. Pedes mediocres, femoribus parum incrassatis, tenuiter carinulatis, posticis segmentum tertium abdominis vix superantibus, tarsis ejusdem paris articulo primo duobus sequentibus, simul sumtis, vix breviore ²⁾.

22. *Aporus cylindricus*: elongatus, linearis, ferrugineus, tomento griseo-albido vestitus, elytris vase punctatis, singulo plagiis duabus subdenudatis. Long. 15, lat. 4 millim.

Caput latitudine baseos nonnihil longius, convexum, coriaceum, griseo-tomentosum, intra basin coaretatum, fronte longitudinaliter sulcata, antice subcirculariter impressa. Antennæ concolores, griseo-pubescentes. Thorax latitudine baseos sesqui longior, medio modice rotundato-ampliatus, intra basin apicemque constrictus et transversim impressus, antice posticeque truncatus ac sat distincte marginatus, supra inæqualis, postice utrimque callosus, coriaceus, fusco-ferrugineus, tomento griseo-albido, variegatim condensato, vestitus. Scutellum dense albido-tomentosum. Elytra thorace triplo longiora, ejusdem medio vero parum latiora, parallela, basi truncata, apice singulatim subacuminata, æqualiter convexa, remote at distincte punctata, dilutius ferruginea, tomento griseo-albido vestita, singulatim maculis duabus iudeterminatis, inter se et a basi apiceque æque distantibus, denudatis, notata. Corpus subtus et pedes tenuiter coriacea, ferruginea, tomento griseo-albido æqualiter obducta.

¹⁾ ab ἀπόρος. indigetus.

²⁾ Genus hocce et duo proxime sequentia ad sect. A. *Cerambycidarum* LACORDAIREI (Gen. Col. T. VIII, p. 202) pertinent; in dubio vero est, ubi in serie generum rite collocanda.

Adiaphorus¹⁾, nov. gen.

Palpi exigui, subæquales, articulo ultimo subcylindrico. Mandibulae breviusculæ, arcuatæ, apice acuminatae, inermes. Antennæ ♀ longitudine corporis, ♂ paullo longiores, 11-articulatae, scapo elongato, obconico, arcuato, articulis 2—11 filiformibus, 2:o brevissimo, 3—5 longitudine crescentibus, 5—11 longitudine æqualibus. Frons depressa, tuberculis antenniferis parum elevatis. Oculi lunati, fortiter granulati. Thorax latitudine sesqui longior, cylindricus, lateribus leviter nodosis. Scutellum breve, apice rotundatum. Elytra parallela, depressa, thorace distincte latiora. Prosternum transversim impressum, lobo intercoxali apice inflexo, acetabulis coxarum subangulatis. Lobus intercoxalis abdominis triangularis, apice subrotundatus. Pedes mediocres, tarsis posticis articulo 1:o duobus sequentibus, simul sumtis, longitudine subæquali.

23. *Adiaphorus crinitus*: oblongus, testaccus, nitidus, inæqualiter pilosus; elytris parce punctatis, piceis, sutura testacea. Long. $7\frac{1}{2}$ —11, lat. $1\frac{2}{5}$ — $2\frac{1}{3}$ millim.

Caput latitudine baseos nonnihil longius, coriaceum, minus nitidum, tenuiter griseo-pubescentia parceque pilosum, fronte antice modice declivi; oculi maximi, profunde emarginati, supra mediocriter distantes. Antennæ concolores, tenuiter pubescentes, articulis 1—4 subtus parce pilosis. Thorax oblongus, cylindricus, medio vel pone medium leviter calloso-dilatatus, antice posticeque truncatus, supra inæqualis, ruguloso-punctatus, ferrugineus aut dilutius testaceus, pube cinereo-albida, pilis erectis parce immixta, vestitus, medio postice linea longitudinali laevi. Elytra linearia, thorace vix triplo longiora, at basi ejusdem conjunctim duplo latiora, apice singulatim rotundata, dorso depressa, remote punctata, picea, nitidissima, vitta suturali et nonnumquam plaga lateralí indeterminata testaceis ornata, apice densius griseo-pilosa, alibi pube tenui, pilis erectis immixta, adspersa, in disco linea longitudinali elevata, plus minusve distincta, prædicta. Corpus subtus vix sculpturatum, tenuiter flavo-griseo-pubescentia et pilosum. Pedes mediocres, flavo-griseo-pilosæ, testacei, tibiis tarsisque interdum obscurioribus, femoribus modice incrassatis.

Lygrus²⁾, nov. gen.

Palpi breviusculi, subæquales, articulo ultimo brevi, subcylindrico. Mandibulae exiguae, edentulæ, apice arcuatæ, acuminatae. Antennæ ad marginem oculorum interiorem insertæ, ♂ corpore duplo longiores, setaccæ, 11-articulatae, articulo 1:o obconico, 2:o illo di-midio breviore, 3—10 longitudine subæqualibus. Caput thorace pa-

¹⁾ ab ἄδιάφορος, indifferens.

²⁾ α λυγρός, miserabilis.

rum angustius, fronte inter antennas elevata, medio excavata et canaliculata, tuberculis antenniferis modice convexis, antice emarginatis. Oculi laterales, rotundati, fortiter granulati. Thorax subcylindricus, leviter rotundato-ampliatus. Scutellum breve, apice subrotundatum. Elytra sublinearia, depressa. Pedes mediocre, femoribus modice incrassatis, abdome brevioribus, tarsis ejusdem paris articulo 1:o reliquis, simul sumtis, longitudine æquali. Coxæ antice globosæ, fere contiguae, lobo prosterni angustissimo, acetabulis clausis.

24. *Lygrus apicalis*: oblongus, subtus piceo-ferrugineus, supra subopacus, tenuiter griseo-sericeus, thoracis lateribus fuscis, elytris apice flavis, dorsi lateribus indeterminate infuscatis. Long. 10, lat. 2 millim. ♂.

Caput subtiliter coriaceum, subtus piceum, supra dilutius testaceum. Antennæ testacea, scapo saturatiore. Thorax basi subtruncatus, apice leviter rotundatus, margine elevato; dorso subdepressus, disperse punctulatus, testaceus, lateribus prosterneque piceis. Elytra thorace triplo longiora, medio vero ejusdem parum latiora, apice singulatim rotundata, dorso depressa, sat crebre punctata, in disco linea longitudinali elevata prædicta, testacea, versus latera indeterminate infuscata, apice distincte flava. Pectus et abdomen fusco-ferruginea, disperse punctata, tenuissime griseo-pubescentia. Pedes toti flavo-testacei.

25. *Dorcasomus* (AUD. SERV.) *Delegorguei*: elongatus, parum convexus, cyaneus, nitidus, subtus tenuiter pubescens, supra glaber; fronte thoraceque medio impressis, hoc antice profunde constricto, lateribus medio tuberculo valido, conico, armatis; elytris sublævigatis, læte flavis, postice ad tertiam partem violaceis; antennis distincte serratis, medium elytrorum paullo excedentibus. Long. 27, lat. 8 millim. ♂.

Dorcasomus Delegorguei GUER. MENEV. Rev. Zool. 1845, p. 286.

26. *Psebium* (PASCOE) *Linnæi*: oblongum, crassiuseulum, flavescent, pilosum, thorace nigro-4-maculato; elytris brevissimis, apice atro-holosericeis; antennis pedibusque nigris, femoribus tibiisque posticis basi flavis. Long. 17, lat. 5 $\frac{1}{2}$ millim. ♀.

Caput crebre punctatum, fronte impressa, antice verticaliter declivi, litura pone oculos fusca; oculi lunati, tenuiter granulati, supra sat distantes. Antennæ corpore manifeste breviiores, validiusculæ, articulo 3:o sequente fere duplo longiore. Thorax latitudine baseos nonnihil brevior anticeque paullo angustior, basi apiceque levissime subsinuatus, intra basin apiceque transversim impressus, supra parum convexus, ubique sat fortiter rugoso-punctatus, dense pilosus, fusco-testaceus, dorso maculis quatuor rotundatis, nigris, notatus, duabus scilicet ad marginem apicis totidemque ad marginem baseos, his majoribus magisque distantibus. Scutellum antice declive, apice rotundatum et impressum, flavescent. Elytra latitudine communi

manifeste breviora, basi leviter emarginata ibique thorace dimidio latiora, postice dehiscentia, apice singulatim rotundata, dorso depressa, ubique disperse punctata, basi pilosa, alibi tenuius pubescentia, flava, in ipso apice macula rotunda atro-holoscericea ornata, callis humeralibus praeterea obsolete infuscatis. Corpus subitus subtiliter punctatum, sat dense pilosum, pectore crasso, convexo, flavo-tectaceo, abdomine fusco-ferrugineo, segmento basali amplo, letius flavo. Pedes nigri, punctati, 4 anteriores breviuseuli, postici illis duplo longiores, femoribus tibiisque hujus paris basi dimidiato-flavis.

27. *Compsomera* (WHITE) *elegantissima*: oblonga, supra opaca, subitus nitida, nigra vel nigro-cyanæa, capite thoraceque supra rufo-testaceis, nigro-plagiatis, hoc lateribus medio unituberculatis; elytris subtiliter granulatis, medio singulatim arcu longitudinali, aurantiaco, distincte punctato, ornatis; scutello toto pectoreque variegatim argenteo-sericeis; ano, antennis, femoribus apice, tibiis tarsisque rufo-testaceis. Long. 19—22, lat. 5—5½ millim.

Compsomera elegantissima WHITE Longie. Brit. Mus. p. 152 tab. IV f. 7.

Variat capite supra immaculato elytrisque juxta arcum aurantiacum extus lineola ejusdem coloris notatis.

Evgoa¹⁾,

nov. gen., ad trib. *Callichromidarum* referendum.

Gen. *Zonoptero* (LACORD. Gen. Col. T. IX. p. 9) characteribus genericis exakte convenit, exceptis antennis vix serratis, articulis 6—10 supra late subsulcatis, elytris depressis, femoribus posticis brevioribus, segmentum quartum abdominis haud excedentibus.

28. *Evgoa Dalmanii*: elongata, nigra, supra opaca, capite, thoracis dorso, antennis pedibusque rufis, elytris depressis, alutaceis, violaceo-tinctis. Long. 22—28, lat. 5—7½ millim.

Caput rugoso-punctatum, obscure rufum, fronte transversim elevata, parum excavata, medio longitudinaliter canaliculata; oculi profunde emarginati, subtiliter granulati, supra admodum distantes. Antennæ validæ, vix attenuatæ, medio elytrorum ♂ distincte, ♀ vix longiores, totæ rufo-testaceæ. Thorax transversus, intra marginem baseos apicisque profundissime constrictus ac transversim impressus, postice subtruncatus, antice late rotundato-productus, supra modice convexus, inæqualis, lateribus incrassatis; ubique sat crebre rugoso-punctatus, ater, dorso medio indeterminate rufescente. Scutellum regulariter triangulare, depresso, parce punctulatum. Elytra thorace plus quadruplo longiora illiusque medio ♂ vix, ♀ distincte latiora, linearia, basi subtruncata, apice singulatim rotundato, dorso de-

¹⁾ ex εν, benc, et γόος, luctus.

pressa, atra, plus minusve violaceo-tincta, lineis duabus longitudinalibus elevatis vix observandis. Corpus subtus coriaceum, nigrum, subnitidum, auro rufescente. Pedes sat robusti, punctulati, toti rufi, femoribus anterioribus sat distincte clavatis; tibiis omnibus sensim leviter dilatatis.

29. *Phyllocnema* (J. THOMS.) *latipes*: elongata, subtus coeruleo-virescens, nitida, capite thoraceque supra obscure viridibus, rugoso-punctatis, hoc lateribus unispinosis, basi transversim impressa; elytris subdepressis, purpureis, minus nitidis, coriaceis, antice rugulosis, lineis duabus longitudinalibus elevatis, ante apicem conjunctis, plus minusve distinctis; antennis corpore manifeste brevioribus; tibiis posticis apicem versus distinctissime foliaceo-dilatatis. Long. 22—29, lat. 6—8½ millim.

Cerambyx latipes DE GEER Mem. VII: p. 655, pl. 49 f. 3. SCHÖNH. Syn. Ins. III: p. 353.

Variat elytris obscure virescentibus, limbo æruginoso vel purpureo.

30. *Hypatium* (J. THOMS.) *Friesii*: elongatum, cyaneum aut violaceum, supra parum nitidum, antennarum articulo 1:o, femoribus anque rufis; thorace inæquali, lateribus acute spinosis; elytris subparallelis, coriaceis. Long. 25—26, lat. 6½—6¾ millim.

Caput rugulosum, fronte inter antennas transversim elevata, longitudinaliter impressa et canaliculata, epistome emarginato, tuberculis antenniferis mandibulisque supra punctulatis; oculi supra modice distantes. Antennæ ♂ longitudine corporis, ♀ quinta parte breviores, nigræ, articulo 1:o breviter obconico, rufo, basi infuscato. Thorax latitudine paullo brevior, medio modice ampliatus, intra apicem constrictus et transversim impressus, postice subtruncatus, antice leviter rotundato-productus, supra modice convexus, transversim irregulariter plicato-rugosus, ante basin utrimque calloso-elevatus, lateribus medio spina brevi, acuta, armatis anticeque distincte callosis. Scutellum triangulare, medio impressum. Elytra thorace quadruplo longiora et basi ejusdem fere duplo latiora, antice subtruncata, humeris calloso-elevatis; apice singulatim rotundata, dorso parum convexa, tenuiter coriacea, basin versus subrugulosa. Corpus subtus subtilissime coriaceum, nitidum, tenuissime sericeo-pubescent. Pedes elongati, nigri, femoribus rufis, basi apiceque plus minusve infuscatis, quatuor anterioribus distincte clavatis, posticis abdомine nonnihil brevioribus.

31. *Callichroma* (LATR.) *cuprea*: elongata, depressa, cuprea, elytris opacis, sutura corporeaque subtus albo-sericeis, antennis testaceis, articulis 3 vel 4 primis fuscis. Long. 15—21, lat. 3¾—5½ millim. ♀.

Caput rugoso-punctatum, fronte inter antennas transversim elevata, longitudinaliter parum excavata, medio canaliculata; oculi profundissime emarginati, supra sat distantes. Antennæ

longitudine corporis, articulo primo obconico secundoque nigris, tertio quartoque fusco-cupreis, hoc interdum ferrugineo, reliquis testaceis. Thorax longitudine haud latior, medio-criter rotundato-ampliatus, basi truncatus, intra basin constrictus, apice supra rotundato productus, dorso parum convexus, transversim crebre et irregulariter striolatus, cupreus, subnitidus, marginibus baseos apicisque virescentibus, lateribus medio tuberculo subconico munitis. Scutellum regulariter triangulare, rugulosum. Elytra thorace quadruplo longiora anticeque basi ejusdem duplo latiora, retrorsum leviter augustata, apice singulatim rotundata, dorso depressa, tenuiter coriacea, basin versus rugulosa, cuprea, humeris exceptis, opaca, margine laterali virescente, sutura anguste plus minusve distincte albo-sericea. Corpus subtus subtilissime coriaceum, laetius cupreum, nitidum, pube albo-sericeo-micante obductum. Pedes nigri, cupreо-tincti, femoribus tibiisque posticis compressis, illis abdomine parum longioribus.

32. *Philematium* (J. THOMS.) *albitarse*: elongatum, prasinum, nitidum, thorace transversim plicato, lateribus spinosis; elytris retrorsum attenuatis, coriaceis, antennis ♂ corpore sesqui longioribus, vel ultra, ♀ apicem elytrorum vix attingentibus, nigris; femoribus rufis, posticis abdomen nonnihil excedentibus, genibus. tibiis tarsisque nigris; tarsis posticis supra eximie, tibiisque anterioribus apicem versus tenuius, albo-sericeis. Long. 22—23, lat. (ad hum.) $6\frac{1}{2}$ — $6\frac{3}{5}$ millim.

Cerambyx albitarsus FABR. Syst. El. II: p. 267. — SCHÖNH. Syn. Ins. III: p. 350.

33. *Rhopalizus* (J. THOMS.) *cinctus*: elongatus, supra glaber, capite thoraceque nitidis, hoc supra inaequali, aureo-fulgente, basi apiceque coeruleo, lateribus nodosis; elytris cyaneis, subopacis. Long. 17, lat. (ad hum.) 4 millim. ♂.

Caput latitudine haud brevius, vertice parce punctulato, viridi, nitido, fronte inter antennas elevata, crebrius punctata, medio excavata et canaliculata, epistome nitido, aureo-marginato, labro fulvo-ciliato; oculi lunati, supra distantes. Antennae corpore duplo longiores, setaceae, nigræ, basi violaceo-tinctæ, scapo breviusculo, rugoso. Thorax latitudine baseos manifeste longior, intra basin apicemque fortiter constrictus, medio utrimque in tuberculum globulosum dilatatus, basi subtruncatus, apice leviter rotundato-productus, supra transversim trifariam impressus, antice late posticeque anguste coeruleo-virescens, parte intermedia aurea, nitidissima, praeter tubercula lateralia, sublævia, sat fortiter punctata, marginibus baseos apicisque rugulosis. Scutellum semi-ovale, coeruleum. Elytra thorace fere quadruplo longiora anticeque basi ejusdem conjunctim sesqui latiora, retrorsum leviter angustata, apice singulatim rotundata, dorso depressa, basin versus fortiter, postice tenuius rugoso-punctata, cyanea, violaceo-tincta, margine apicali griseo-fimbriato. Corpus subtus

cœruleum, coriaceum, tenuissime pubescens, pleuris pectoralibus acetabulisque coxarum albo-sericeis. Pedes elongati, pubescentes, femoribus cœruleis, petiolatis, apice fortiter clavatis, tibiis tenuibus tarsisque obscure violaceis.

34. *Litopus* (AND. SERV.) *dispar*: elongatus, obscure cœruleo-viridis, thorace subruguloso, elytris tenuiter coriaceis, opacis, palpis nigris, antennis ♀ elytra nonnihil excedentibus, ♂ corpore sesqui longioribus, nigro-cyanis, articulis 4—11 basi late flavo-annulatis; femoribus distincte petiolatis, apice clavatis, pedibus quatuor anterioribus totis testaceis, posticis cyanis, femoribus tibiisque basi late testaceis. Long. 15—20, lat. $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ millim.

Litopus dispar (BOHEM.) J. THOMS. Essai d. classif. d. Ceramb. p. 171. — CHEVROL. Journ. of Entom. I: p. 246.

Variat antennis articulis 1:o et 2:o totis nec non 3:o basi testaceis; tarsis 4 anterioribus fuscis, posticis aut totis aut tantum articulo 1:o basi flavescentibus.

35. *Litopus caffer*: obscure cœruleo-viridis, supra depresso, opacus, antennis nigris, articulis 7—11 basi flavescentibus; femoribus posticis basi pedibusque anterioribus, tarsis exceptis, rufis, thorace dorso subimpresso, lateribus incrassatis. Long. 15—17, lat. $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ millim.

Caput coriaceum, fronte modice elevata, elevatione late excavata, medio canaliculata, margine intra oculos utrimque tuberculatim adscendente; oculi profunde emarginati, supra distantes. Antennæ ♂ corpore sesqui longiores, articulo 1:o obscure cyaneo, obconico, apice interne acute angulato, reliquis nigris, 2—5 subtus parce pilosis, 3—4 aut 3—5 basi fusco-ferrugineis, reliquis basi flavescentibus. Thorax latitudine baseos haud longior, pone medium subangulatim dilatatus, antice posticeque truncatus, intra basin constrictus, tenuiter coriaceus, obscure cœruleo-viridis, dorso longitudinaliter late impressus, impressione rhombica, nigricante, opaca, striga media virescente divisa; lateribus dorsi utrimque inflatis. Scutellum apice acuminatum, basi impressum. Elytra thorace fere quintuplo longiora, ejusdem vero medio parum latiora, sublinearia, apice obtuse rotundata, dorso depressa, tenuiter coriacea; cœruleo-virescentia, opaca. Corpus subtus concolor, obsolete coriaceum, inæqualiter, parce pubescens. Pedes 4 anteriores rufi, tarsis fuscis, posticis elongatis, femoribus basi late flavescentibus, clava oblongo-ovali, cyanæ, tibiis tarsisque ejusdem paris nigris, illis compressis, arcuatis, articulo 1:o tarsorum reliquis, simul sumtis, fere longiore.

Variat tibiis posticis basi piceo-rufescentibus.

36. *Promeces* (AUD. SERV.) *purpuratus*: elongatus, gracilis, subtus cœruleo-virescens, capite thoraceque supra aut obscurius cyanis, aut virescentibus, sat crebre punctatis, nitidis; elytris linearibus, coriaceis, antice distinctius rugulosis, lâete purpureis, colore versus suturam plus minusve ad viridem vergente; antennis

pedibusque obseure cyaneis, elongatis, gracillimis. Long. 17
—18, lat. $2\frac{3}{5}$ — $2\frac{4}{5}$ millim. ♂.

Promeces purpuratus WHITE Longic. Brit. Mus. p. 170.

37. *Promeces velox*: elongatus, cyaneus, supra glaber, thorace inaequali, parcus punctato, nitido, elytris coriaceis, sub-opacis, ad suturam violaceis, extus prasinis. Long. 17, lat. $2\frac{4}{5}$ millim. ♀.

Caput latitudine baseos dimidio longius, rugoso-punctatum, nitidum, fronte inter antennas elevata, medio excavata et canaliculata; oculi lunati, supra distantes. Antennæ corpore manifeste longiores, nigrae, scapo ruguloso, cyaneo. Thorax latitudine baseos fere sesqui longior, pone medium rotundato-ampliatus, apicem versus angustatus, intra basin constrictus, postice truncatus, antice leviter rotundatus, supra inaequalis, disperse punctatus, nitidus. Scutellum triangulare, apice acuminatum. Elytra thorace quadruplo longiora eodemque conjunctim sesqui latiora, linearia, apice conjunctim rotundata, dorso depressa. coriacea, obseure viridia, vitta lata suturali violacea. Corpus subtus tenuiter coriaceum, coeruleo-virescens, inaequaliter pubescens. Pedes elongati, subtenues, coerulei, femoribus leviter incrassatis, tibiis antieis subtus albido-sericeis.

38. *Promeces fulvipes*: elongatus, coeruleo-viridis, elytris violaceis, opacis; thorace parce punctato; pedibus 4 anterioribus rufis. Long. 12, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. ♀.

Caput latitudine manifeste longius, vase punctatum, postice coeruleum, antice viride, nitidum, fronte excavata et canaliculata; oculi supra distantes. Antennæ nigrae, basin versus violaceo-tinctæ, scapo rugoso-punctato. Thorax latitudine baseos paulo longior, subcylindricus, pone medium leviter rotundato-ampliatus. supra intra apieem transversim impressus, vase et remote punctatus, coeruleo-viridis, nitidus, marginibus baseos apieisque transversim rugulosis, violaceis. Elytra thorace fere quadruplo longiora ac sesqui latiora, depressa, coriacea, violacea, callo humerali excepto opaea. Pectus et abdomen subtilissime punctulata, viridia, nitida, illud atque prosternum argenteo-pilosa. Pedes elongati, tenues, postici violacei, quatuor anteriores rufi, tarsis plus minusve infuscatis.

39. *Promeces pauper*: oblongus, depresso-violaceus aut virescente-coeruleus, capite thoraceque confertim ruguloso-punctatus; elytris opacis. Long. 9— $12\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{4}{3}$ — $2\frac{2}{3}$ millim. ♀.

Caput latitudine paulo longius, cibre rugoso-punctatum. coeruleo-viride, aut violaceum, fronte medio impressa et sulcata. Antennæ corpore paulo longiores, obseure violaceæ, scapo rugoso-punctato. Thorax latitudine nonnihil longior, pone medium rotundato-ampliatus, dorso subdepressus, confertim rugoso-punctatus, coeruleus aut obseure violaceus. Elytra thorace triplo longiora ac sesqui latiora, parallela, depressa, confertim ruguloso-punctata, praeter humeros opaca, aut coeruleo violacea, aut obseure

viridia. Corpus subtus confertim punctulatum, tenuiter pubescentis, prosterno ac mesosterno medio plus minusve albido-villosis. Pedes mediocres, violacei, postici elongati, femoribus hujus paris gracilibus, elytra manifeste excedentibus.

Promecidus¹⁾ nov. gen.

A gen. *Promece* (SERV.) discrepat solummodo epistome breviuscule, antennarum articulo quarto tertio nonnihil breviore, præcipue vero femoribus longissime petiolatis, apice abrupte clavatis.

40. *Promecidus chalybeatus*: elongatus, thorace supra inæquali verticeque sublævigatis, cœruleis vel cœruleo-virescentibus, nitidissimis, capite antice punctato corporeque subtus prasinis; elytris cyaneis, opacis, margine laterali antice interdum purpureo-violaceo, nitido; thorace subtus, mesosterno et nonnumquam abdominis lateribus plagiatis argenteo-sericeis. Long. 13—19, lat. $2\frac{2}{5}$ — $3\frac{4}{5}$ millim.

Promeces chalybeatus WHITE Longic. Brit. Mus. p. 169.

Hypocrites²⁾ nov. gen.

A gen. *Promece* tantum differt statura robustiore, subconvexa, thorace breviore, elytris retrorsum attenuatis, antennis articulo 3:o sequente paullo longiore, 4—10 distinctius sulcatis, 11:o etiam ♀ attenuato.

41. *Hypocrites mendax*: elongatus, cœruleus, nitidus, subtus maculatim albido-tomentosus; elytris cyaneis, basi cœruleo-tinctis. Long. 20, lat. 4 millim. ♀.

Caput latitudine paullo longius, sat fortiter punctatum, elevatione intra-antennali fere bipartita, medio canaliculata. Antennæ corpore nonnihil longiores, scapo rugoso-punctato, cœruleo, articulis reliquis violaceo-nigrescentibus. Thorax latitudine baseos vix vel parum longior, pone medium rotundato-ampliatus, intra basin apicemque constrictus, dorso parce punctatus, margine baseos impresso, transversim rugoloso. Scutellum triangulare, punctatum. Elytra antice basi thoracis conjunctim fere duplo latiora, latitudine sua triplo longiora vel ultra, retrorsum sat distincte angustata, apice conjunctim rotundata, dorso modice convexa, antice distinctius rugoso-punctata, postice sensim tenuius coriacea, cyanea, basi indeterminate cœruleo-micantia, lineis duabus longitudinalibus elevatis obsoletis. Corpus subtus subtiliter punctulatum, cœruleo-virescens, nitidissimum, prosterno toto, pectore abdominalisque lateribus tomento albo-sericeo maculatum obsitis. Pedes mediocres, femoribus punctatis, quatuor anterioribus virescentibus, basi petiolatis, pone medium sat va-

¹⁾ A »*Promeces*« gen. coleopt., & εἰδος, imago.

²⁾ α ὑποχριτής, simulator.

lide clavatis, posticis cœruleis, abdomen excedentibus, sensim parum incrassatis; tibiis omnibus violaceo-nigrescentibus.

42. *Hypocrites ambiguus*: oblongus, æneus, nitidus, subtus auroco-splendens, elytris violaceis, antice æneo-tinctis; prosterno fortiter rugoso-punctato, fere nudo. Long. 17, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.

Præcedenti propinquus; differt tamen elytris manifeste brevioribus, thorace non triplo longioribus, lineis elevatis vix conspicuis; thorace antice utrimque impresso; corpore subtus aureofulgente, mesosterno medio, macula postica matasterni liturisque marginalibus abdominis argenteo-sericeis, prosterno indumento fere destituto; femoribus anterioribus violaccis.

43. *Anubis* (J. THOMS.) *Mellyi*: elongatus, cœruleo-virescens, thoracis lateribus corporeque subtus albido-sericeo-pilosis; elytris flavis, fasciis tribus nigro-cyaneis, subæqualiter distantibus, postrema apicali. Long. 20—25, lat. 4—5 millim.

Polyzonus Mellyi WHITE Longic. Brit. Mus. p. 172.

44. *Anubis scalaris*: elongatus, cœruleus. subtus argenteo-sericeus. elytris flavis, fasciis tribus latioribus cyaneis, antica plerumque interne dilatata, postrema apicali. Long. 15—17, lat. $3\frac{3}{5}$ — $3\frac{4}{5}$ millim.

Anubis scalaris PASCOE Journ. of Entom. II: p. 53.

45. *Anubis grossicornis*: elongatus, subtus viridis, nitidus, tenuiter flavo-griseo-pubescent, thorace cœruleo, rugoso-punctato; elytris obscure cyaneis, basi maculisque duabus marginalibus flavis. Long. 15—16, lat. $3\frac{3}{5}$ — $3\frac{4}{5}$ millim.

Cerambyx grossicornis DE GEER Mem. d. Ins. VII, p. 656. tab. 49 f. 5. *Saperda clavicornis* FABR. Syst. El. II: p. 322; SCHÖNH. Syn. Ins. III: p. 354.

46. *Anubis pubicollis*: elongatus, nigricans, capite, thorace, pectore abdomineque dense flavo-griseo-tomentosis, elytris flavis, fasciis duabus, altera versus basin, interne dilatata, altera in medio dorsi, maculaque rotundata ante apicem nigro-violaceis. Long. 17—21, lat. $3\frac{4}{5}$ —4 millim. ♂.

♀ differt, præter antennas breviores, thoracis dorso glabriore, subnitido.

Polyzonus pubicollis PASCOE Journ. of Entom. II: p. 52.

Vavia signaturis elytrorum plus minusve oblitteratis.

47. *Closteromerus* (J. THOMS.) *gracilis*: elongatus, supra cyaneus, subtus cœruleo-viridis, nitidus, pectoris limbo antico liturisque lateralibus abdominis albo-sericeis. Long. 10, lat. $1\frac{1}{2}$ millim. ♂.

Caput latitudine duplo longius, vase punctatum, fronte inter antennas modice elevata, medio excavata; oculi supra parum distantes. Antennæ corpore nonnihil longiores, extrorsum incrassatae, nigræ. Thorax latitudine baseos duplo longior, pone medium levissime rotundato-ampliatus, antice posticeque truncatus, intra basin apicemque constrictus, supra convexns, minus crebre punctatus, basi impressa, transversim rugosa. Elytra

thorace vix triplo longiora at sesqui latiora, sublinearia, apice obtuse rotundata, dorso subdepressa, basi parcius, alibi sat crebre punctata, subcoriacea. Corpus subtus disperse punctatum, coxis, pectoris limbo antico liturisque ad latera abdominis albo-sericeis. Pedes elongati, tenues, punctulati, obscure cyanei, femoribus posticis apicem elytrorum attingentibus.

48. *Helymæus* (J. THOMS.) *notaticollis*: oblongus, ecruleus, capite antennarumque scapo rugoso-punctatis; thorace supra concinne punctato, lateribus pone medium subangulatim ampliatis ibique albo-sericeo-plagiatis; elytris depresso-ruguloso-punctatis, cyaneis, opacis, apice lâete violaceis, nitidis; corpore subtus punctato, nitido, vittis lateralibns albo-sericeis; pedibus posticis elongatis, nigris, femoribus distincte petiolatis, tibiis ejusdem paris arcuatatis, compressis, apicem versus dilatatis; femoribus 4 anterioribus fortiter clavatis, rufis, basi cum tibiis tarsisque nigris; tibiis anticus cum tarsis albo-sericeis. Long. $14\frac{1}{2}$; lat. 4 millim.

Helymæus cyanipennis J. THOMS. Syst. Ceramb. p. 180.

Litopus notaticollis PERROUD Mel. Ent. III, p. 45.

49. *Helymæus glabripennis*: oblongus, cœruleo-niger, subtus inæqualiter pubescens, thorace subangulato-dilatato, angulis supra albo-sericeis; elytris cœruleis, glabris, basi apiceque nitidioribus; antennis pedibusque nigris. Long. 14, lat. 4 millim. ♂.

Caput rugoso-punctatum, elevatione inter antennas modice excavata, brevissime canaliculata; oculi supra sat distantes. Antennæ corpore nonnihil longiores, versus apicem sensim incrassatae, articulis 6—10 serratis, scapo rugoso-punctato. Thorax latitudine baseos paullo brevior, pone medium fortiter, subangulatim, ampliatus, basi apiceque truncatus, dorso depresso, concinne reticulato-punctatus angulis, lateralibus supra albido-tomentosis. Scutellum triangulare, tomento albido vestitum. Elytra thorace quadruplo longiora anticeque medio ejusdem parum latiora, sublinearia, humeris callosso-elevatis; apice oblique truncata, dorso depressa, ubique sat crebre et profunde punctata; lateribus transversim rugulosis. Corpus subtus modice convexum, ventre tenuiter, prosterno pectoreque distinctius punctatis. Pedes 4 anteriores mediocres, femoribus fortiter clavatis, posticis elongatis, tibiis modice dilatatis.

50. *Helymæus rufipes*: oblongus, niger, subnitidus, thorace modice rotundato-ampliato; elytris cyaneis, crebre punctatis, pedibus 4 anterioribus femoribusque posticis rufis. Long. 13, lat. $3\frac{2}{3}$ millim. ♀.

Caput crebre rugoso-punctatum, fronte inter antennas parum elevata, medio canaliculata; oculi lunati, convexi, supra distantes. Antennæ medium clytrorum parum excedentes, extrorsum incrassatae, scapo vase punctato. Thorax latitudine postica paullo brevior, pone medium rotundato-ampliatus, apicem versus sinuatim angustatus, basi subtruncatus tenuiterque marginatus, apice

leviter subrotundatus, supra parum convexus, crebre reticulato-punctatus, nitidus, ftriga laterali albo-sericea. Scutellum oblongo-triangulare, apice acuminatum. Elytra linearia, thorace plus quadruplo longiora ejusdemque basi sesqui latiora, apice truncata, dorso subdepressa, tota cyanea, crebre rugoso-punctata, linea discoidali elevata obsoleta. Corpus subtus vase punctatum, nigrum, nitidum, lateribus pectoris albo-sericeis. Pedes mediocres, rufi, tibiis tarsisque posticis nigris; femoribus minus fortiter clavatis, tibiis postieis compressis, apice versus sensim dilatatis.

Evgenius¹⁾,

nov. gen., trib. *Compsocerid.* (LACORD.) propinquum.

Palpi breviusculi, subæquales, articulo ultimo subcylindrico. Mandibulæ sat validæ, apice breviter arcuatæ, acuminatæ. Antennæ 11-articulatæ, ♂ corpore plus duplo, ♀ hand sesqui longiores, scapo breviter obconico, scabro, apice dente valido munito, ♂ etiam basi subdentato, articulis 3—7 longitudine subæqualibus, apice plumatis, 8—11 ♂ distinete longioribus, attenuatis, ♀ subfiliformibus, longitudine decrescentibus, 8—10 serratis. Frons inter antennas elevata, modice excavata, tuberculis antenniferis obtusis, antice emarginatis. Oculi subtiliter granulati. Thorax transversus. Elytra retrorsum angustata, depressa. Pedes 4 anteriores mediocres, postici elongati, femoribus (posticis ultra medium) petiolatis, apice valide clavatis, tibiis 4 anterioribus tenuissimis, posticis compressis, subarcuatis, tarsis articulo primo reliquis, simul sumtis, longitudine æquali. Coxæ antice angulatæ, acetabulis postice apertis. Lobus prosterni intercoxalis angustus, apice declivis.

51. *Evgenius plumatus*: oblongus, cyanus, glaber, capite, thorace corporeque subtus nitidis, elytris subopacis; antennis pedibusque flavo-variis, illarum articulis 3—7 apice nigro-plumatis. Long. 16—17, lat. 4—4½ millim.

Caput latitudine dimidio brevius, tenuiter rugoso-punctatum, fronte inter antennas distinete canaliculata; oculi profundi emarginati, supra distantes. Antennæ ♂ apicem versus attenuatæ, scapo utriusque sexus articulo tertio breviore, scabro, cyaneo, tertio quartoque subasperatis, longitudinaliter subsulcatis, illo obscure cyaneo, 4—11 flavis, apice nigris, 3—7 parce pilosis, apice incrassatis, breviter at distinete nigro-plumatis. Thorax subquadratus, sat regulariter rotundato-ampliatus, postice truncatus, antice leviter rotundato-productus, supra parum convexus, vase subgranulato-punctatus, marginibus baseos apicisque transversim rugulosus. Scutellum triangulare. Elytra thorace fere quadruplo longiora illiusque basi conjunctim sesqui

¹⁾ ex ἵν, bene, & γένος, genus.

latiora, retrorsum sensim leviter angustata, apice anguste subrotundata, dorso depressa, crebre, antice sat fortiter, posterius tenuius ruguloso-punctata. Corpus subtus parum convexum, abdome fere lœvigate, pectore subcoriaceo, marginibus laterum argenteo-sériceis. Pedes 4 anteriores flavi, femorum clava, genibus tarsisque violaceo-nigris, postici violaceo-nigri, petiolis femorum flavis.

52. *Clyanthus* (J. THOMS.) *Westringii*: oblongus, niger, opacus, thorace pulvinato, coriaceo; elytris parallelis, fascia postica signaturisque aliquot basalibus, e pube griseo-albida, ornatis. Long. 9, lat. $2\frac{3}{5}$ millim.

Caput exiguum, deflexum, subtiliter coriaceum, fronte carinula longitudinali tenuissima notata; oculi majusculi, lunati. Antennæ humeros parum excedentes, filiformes, tenuissime griseo-pubescentes. Thorax latitudine baseos dimidio longior, fortiter rotundato-ampliatus, apicem versus angustatus, mox intra basin constrictus, antice posticeque truncatus, supra pone medium transversim convexus, ubique subtiliter coriaceus, pube tenuissima grisea obductus. Scutellum triangulare, griseo-sériceum. Elytra linearia, thorace vix triplo longiora, basi vero ejusdem conjunctim sesqui latiora, apice oblique truncata, angulo exteriore spinula armato; dorso æqualiter convexa, subtiliter coriacea, plaga magna humerali, callum haud tegente, macula parva basali juxta scutellum utrimque, linea e regione scutelli singulatim ad medium dorsi arcuatim ducta, fasciaque determinata, integra, pone medium, griseo-albido-pubescentibus. Corpus subtus et pedes nigra, pube griseo-albida æqualiter obducta.

53. *Xylothrecus* (CHEVROL.) *caffer*: oblongus, ater, opacus, thorace subdepresso, punctis quatuor dorsalibus lineolaque media albido-pubescentibus; elytris parallelis, lineis liturisque albido-pubescentibus notatis; femoribus supra rufoplagiatis. Long. 12, lat. $3\frac{1}{5}$ millim.

Caput deflexum, coriaceum, tenuiter griseo-pubescent, fronte inter antennas longitudinaliter sulcata, antice obsolete tricarinata; oculi laterales, lunati, convexi. Antennæ medium corporis haud attingentes, subtenues, nigræ, extrorsum piceæ. Thorax latitudine baseos vix longior, leviter rotundato-ampliatus, intra basin constrictus, antice posticeque truncatus, supra parum convexus, tenuiter coriaceus, punctis quatuor in disco, duobus scilicet ante totidemque pone medium, his magis distantibus, lineolaque media, postica, griseo-albido-pubescentibus. Scutellum breve, apice rotundatum. Elytra pone humeros linearia, thorace triplo longiora ejusque basi sesqui latiora, apice oblique truncata, angulo exteriore subdentato; dorso subdepressa, coriacea, nigra, epipleuris ferrugineo-piceis, vittis discoidalibus griseis atrisque alternantibus plus minusve distinctis; linea suturali, macula pone scutellum, lineola ante medium prope suturam, plaga apicali liturisque duabus lateralibus totidemque pone

lineolam dorsalem grisco-albido-pubescentibus, interdum obliteratis. Corpus subtus coriaceum, capite prosternoque dense albido-hirsutis, pectore abdomineque tenuius pubescentibus. Pedes mediocres, nigri, femoribus incrassatis, supra rufo-plagiatis.

Cosmius¹⁾, nov. gen.

Palpi minuti, articulo ultimo subcylindrico. Mandibulæ breves, apice arcuato, mutico. Antennæ dimidio corporis parum longiores, apicem versus incrassatae, 11-articulatae, scapo sat valido, parum arcuato, articulo 2:o latitudine paulo longiore, 3:o sequente plus duplo longiore, 4—8 longitudine æqualibus, reliquis longitudine decrescentibus, 5—10 intus canaliculatis. Tubercula antennifera modice elevata, antice emarginata. Oculi lunati, subtiliter granulati. Thorax oblongus, cylindricus, leviter rotundato-ampliatus. Elytra linearia, depressa, apice oblique truncata, pygidium haud tegentia, margine laterali subinflexo. Coxæ antice rotundatae, acetabulis vix apertis. Lobus prosterni intercoxalis latiusculus, apice inflexus²⁾.

54. *Cosmius vittatus*: oblongus, piceo-niger, supra opacus, subtus inæqualiter niveo-tomentosus; thorace elytrisque crebre punctatis, his vitta laterali abbreviata suturaque flavo-testaceis. Long. 8, lat. 2 millim.

Caput latitudine paulo longius, crebre punctulatum, fronte declivi, vertice interdum rufescente. Antennæ totæ nigræ, tenuiter griseo-pubescentes. Thorax latitudine baseos manifeste longior anticeque haud angustior, leviter rotundato-ampliatus, basi apiceque truncatus, supra subdepressus, sat crebre punctatus, niger, opacus, margine antico interdum rufescente. Scutellum parvum, obtusum, fuscum. Elytra parallela, basi thoracis conjunctim fere duplo latiora, apice singulatim oblique truncata, dorso depressa, crebre et subtilissime punctulata, parce et tenuissime pubescentia, nigra, opaca, vitta laterali, postice abbreviata, cum margine baseos, suturaque cum margine apieis flavo-testaceis. Pygidium exsertum, apice rotundatum, punctulatum, piceum. Corpus subtus modice convexum, punctulatum, piceum, tomento niveo, in segmentis ventralibus fasciatim condensato, indutum. Pedes longitudine subæquales, rugulosopunctati, picei, tenuissime pubescentes, femoribus basi arcuatiss, versus apicem clavatis, subtus ante apicem emarginatis; tarsis articulo 1:o duobus sequentibus, simul sumtis, longitudine æquali.

Variat sutura apiceque elytrorum concoloribus nec non indumento paginæ inferioris rariore, ventre vix fasciato.

¹⁾ a *κόσμιος*, modestus.

²⁾ Genus hocce ac proxime sequens sect. B *Cerambycid.* LACORD (Gen. Col. VIII p. 400) adnumerandum, inter genera vero incertæ sedis.

Evtactus¹⁾, nov. gen.

Palpi medioeres, maxillares labialibus longiores, articulo ultimo subovali. Mandibulae breves, arcuatæ, apice acuminatæ. Antennæ longitudine corporis, filiformes, 11-articulatæ, scapo valido, sat elongato, obconico, articulo 2:o brevi, 3:o sequente duplo longiore, 5:o et 6:o quarto sesqui longioribus, 7—11 longitudine æqualibus. Oculi lunati, subtiliter granulati. Epistome a fronte impressione transversa distinctum. Thorax oblongus, subcylindricus. Scutellum triangulare. Elytra linearia, depressa, thorace latiora. Coxæ anticæ rotundatæ. Lobus prosterni apice vix arcuatus. Pedes mediocres, femoribus posticis abdomen paullo excedentibus, tarsis articulo 1:o duobus sequentibus, simul sumtis, longitudine æquali.

55. *Evtactus lineatus*: oblongus, subtus piceus, supra opacus, capite thoraceque nigris, elytris cyaneis, vitta discoidali flava; thorace antice coarctato, lateribus albo-sericeo-vittatis. Long. $7\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{4}{5}$ millim.

Caput porrectum, obsolete punctatum, nigrum, tenuissime pubescens, epistome rufescente; oculi prominuli, profundissime emarginati. Antennæ totæ nigræ, scapo punctulato. Thorax latitudine baseos paullo longior anticeque non angustior, modice rotundato-ampliatus, ante medium transversim late impressus et coarctatus, basi apiceque truncatus, supra parum convexus, obsolete punctatus, tenuiter griseo-pubescentis, vitta laterali prosternoque dense albo-sericeis. Scutellum triangulare, testaceum. Elytra thorace distincte latiora et triplo longiora, linearia, apice rotundata, dorso depressa, distincte punctata, cyanæ, vitta discoidali flava distinctissima, ante apicem abbreviata, lineam tenuem elevatam includente, ornata. Corpus subtus modice convexum, griseo-pubescentis, pectore distinctius punctulato, piceo, pleuris abdomineque dilutioribus. Pedes piceo-nigri, tenuiter griseo-pubescentes, postici elongati, femoribus omnibus regulariter clavatis.

56. *Philagathes* (J. THOMS.) *Wahlbergii*: oblongus, niger, supra opacus, capite thoraceque subtus rufis; elytris a basi ultra medium ventreque flavis. Long. 14—23, lat. 4—6 $\frac{1}{2}$ millim.

♂ Caput sat fortiter punctatum, glabrum, totum sanguineum, fronte antice retusa, utrimque marginata, tuberculis annularis interne valide unispinosis. Antennæ duplo longiores vel ultra, setaceæ, totæ nigræ, scapo rude punctato, basi excavato. Thorax latitudine baseos haud brevior anticeque vix angustior, medium versus ampliatus ibique tuberculo conico armatus, intra basiu constrictus, supra sat crebre punctatus, setulis minutis concecoloribus pilisque fuscis adspersus, in medio dorsi carinula brevi et ante medium utrimque tuberculo obtuso praeditus, ater, pagina inferiore, basi excepta, lateribusque ante

¹⁾ ab ἐντακτος, moderatus.

tubercula sanguineis. Scutellum triangulare, atrum. Elytra thorace triplo longiora illiusque basi conjunctim sesqui latiora, parallela, apice conjunctim rotundata, modice convexa, minus crebre punctata, antice lāete flava, postice atroholosericea, flavedine ad suturam haud medium dorsi excedente, versus margines laterales oblique retrorsum extensa. Pectus convexus, disperse punctatum, tenuiter griseo-pubescent. Lobus prosterni apice tuberculatus. Abdomen totum flavescens aut testaceum. Pedes validiusculi, nigri, nitidi, breviter setulosi.

♀ differt antennis crassiusculis, corpore brevioribus, articulis 7—10 subserratis, scapo indistincte foveolato.

Variat species quoad colorem thoracis sculpturamque scapi antennarum; color scilicet illius sanguineus, qui in typo descripto dorsum haud tangit, jam limbum anticum occupat, jam fere ad basin dorsi extensus, relictis tantum margine liturisque 3 basilibus nigris; foveola scapi antennarum in individuis minoribus, etiam masculis, plus minusve obsoleta et in his tubercula frontalia quoque minus valida.

57. *Eleanor* (J. THOMS.) *tragocephaloides*: oblongus, subcylindricus, ater, supra, elytrorum apice excepto, opacus; elytris basi, cum margine laterali antico, fasciaque communi, integra, pone medium, aurantiacis. Long. 14—20, lat. $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{3}$ millim.

Eleanor tragocephaloides J. THOMS. Syst. Ceramb. p. 198.

58. *Eleanor Dohrnii*: oblongus, linearis, niger, thorace supra sanguineo, striga marginali baseos, medio lobata, maculisque quatuor dorsalibus atris; elytris fasciis duabus, margine connexis, flavis. Long. 20, lat. $5\frac{1}{2}$ millim. ♀.

Caput rugoso-punctatum, elevatione frontali medio sulcata; oculi lunati, supra modice distantes. Antennae nigrae, nitidae, scapo rugoso-punctato. Thorax latitudine baseos vix brevior, antice nonnihil angustior, distincte rotundato-ampliatus, basi marginatus, levissime sub-bisinuatus, apice truncatus, supra parum convexus, sanguineus vel aurantiacus, squamulis micantibus pilisque sparsis indutus, margine baseos nigro, nigredine medio cuneatim producta; in dorso præterea maculis quatuor rotundatis ejusdem coloris notatus, duabus versus apicem, reliquis cum nigredine baseos conniventibus, paullo magis distantibus. Prosternum determinate nigrum, griseo-pilosum. Scutellum triangulare, nigrum. Elytra parallela, thorace quadruplo longiora, medio vero ejusdem conjunctim non latiora, dorso æqualiter convexa, apice granulato-rugosa, subnitida, alibi minus crebre punctulata, opaca, atro-holosericea, fasciis duabus communibus latis, una scilicet basali, altera mox pone medium, margine connexis, flavis, ornata. Pectus et abdomen confertim punctulata, nigra, pilis longis griseis vestita. Pedes mediocres, nigri, femoribus, basi anticorum excepta, rude punctatis, subtus, cum tibiis, nigro-ciliatis.