

## CATALOGUE DES LONGICORNES GALLO-RHÉNANS.

ADDITIONS ET CORRECTIONS CONCERNANT LA BELGIQUE

PAR

AUG. LAMEERE,

---

Prévenu de la publication des Longicornes gallo-rhénans alors que cet ouvrage était déjà terminé, j'ai vu que M. Fauvel avait dû se borner presque exclusivement, en ce qui concerne la Belgique, aux indications données par Mathieu dans son *Catalogue* des Coléoptères de ce pays.

L'étude assidue de la faune des Longicornes belges m'a convaincu dès longtemps que ce catalogue fourmillait d'erreurs et devait être considéré comme non avenu.

Plusieurs renseignements inexacts de Mathieu ayant été consignés par M. Fauvel dans son travail, je crois devoir les signaler afin qu'ils ne s'accréditent pas davantage dans la science: je profite également de l'occasion pour compléter les données relatives à la Belgique.

*Leptura attenuata* Linn. — Les localités citées par Mathieu n'ont pas encore été vérifiées. — Calmpthout (Jacobs).

*L. rubra* Linn. — Rouge-Cloître.

*L. virens* Linn. — Les localités indiquées par Mathieu sont certainement erronées. — Hertogenwald (Miedel).

*L. maculicornis* Dej. — Carlsbourg.

*Grammoptera ustulata* Schall. — Semble ne pas exister en Belgique.

*G. variegata* Germ. — Tournai (Fromont).

*Cortodera humeralis* Schall. — J'en ai trouvé une nymphe enterrée dans la forêt de Meerdael à Weert-St-Georges; l'individu que j'ai obtenu d'éclosion appartient à la var. *suturalis* Fab.

*Gaurotes virginea* Linn. — L'indication de Mathieu est très-suspecte.

*Oxymirus cursor* Linn. — Hertogenwald (Miedel).

*Rhagium inquisitor* Linn. — Hertogenwald (Miedel).

*Clytus arcicola* Oliv. — Assez commun aux environs de Liège; la localité Maestricht n'est pas vérifiée.

*C. tropicus* Panz. — Les indications de Mathieu sur cette espèce n'ont aucune valeur. — Ocquier (Kerremans).

- C. ornatus* Herbst. — La localité : Ruremonde, est plus que problématique ; je n'ai jamais vu d'exemplaire de cette espèce capturé en Belgique.
- C. verbasci* Linn. — Même observation ; la présence de cet insecte à Ruremonde est tout ce qu'il y a d'impossible.
- C. figuratus* Scop. — Tilff (Miedel).
- Anaglyptus mysticus* Linn. var. *hieroglyphicus* Herbst. — Bruxelles, Jemeppe (de Borre).
- Purpuricenus Kæhleri* Linn. — N'a été rencontré que dans le jardin botanique de Liège où il a été certainement importé.
- Cerambyx cerdo* Linn. — Acclimaté depuis quelques années aux environs de Liège.
- Hesperophanes cinereus* Villers. — Introduit dans les deux localités citées par Mathieu.
- Rhopalopus clavipes* Fab. — L'indication : Arlon, pour cette espèce est due à une erreur d'impression dans les *Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique*, 1881, p. XXXV, erreur qui a été rectifiée p. LIII du même recueil ; il s'agissait du *Callidium rufipes* Fab.
- Callidium alni* var. *infuscatum* Chevrol. — D'après ce que m'écrit M. Dietz, l'unique exemplaire qu'il croyait pouvoir rapporter à cette variété ne diffère du type que par la base des élytres assombrie : dès lors il ne me paraît pas pouvoir être considéré comme appartenant à la variété *infuscatum* Chevrol. Celle-ci est caractérisée en effet par l'absence de toute couleur ferrugineuse même sur les pattes et les antennes. La variété *nitidum* du même auteur forme la transition entre cette forme extrême et le type ordinaire.
- C. rufipes* Fab. — Arlon (Wesmael) ; Angleur, Wandre (Miedel).
- Monochammus sartor* Fab. — L'indication : Walverghem (Mors), doit être rapportée au *M. sutor* Linn.
- Mesosa curculionoides* Linn. — Cette belle espèce a été prise effectivement à Postel.
- Pogonocherus fasciculatus* Deg. — C'est par erreur que cette espèce a été citée de Belgique (Mathieu) ; je l'y ai cherchée jusqu'ici en vain.
- Agapanthia cyanea* Herbst. — Paraît ne pas exister en Belgique.
- Phytæcia pustulata* Schrank. — Quoi qu'en dise Mathieu, cette espèce, loin d'être assez répandue en Belgique, semble ne devoir s'y rencontrer jamais.
- P. ephippium* Fab. — Bary-Maulde (Fromont).
- Oberca pupillata* Gyll. — La localité : Charleroi, n'a pas encore été vérifiée.
-