

Verzeichniss der Coleopteren Griechenlands und Cretas,

nebst einigen Bemerkungen über ihre geographische Verbreitung
und 4 die Zeit des Vorkommens einiger Arten betreffenden
Sammelberichten

von

E. v. Oertzen.

In dem nachstehenden Verzeichnisse sind diejenigen Arten zusammengestellt, welche in dem Königreiche Griechenland innerhalb seiner jetzigen Grenzen und auf der Insel Creta bisher aufgefunden wurden.

Ein Verzeichniss der aus diesen Gebieten bekannten Coleopteren existirte bisher noch nicht, obwohl wir schon durch verschiedene theilweise recht umfassende faunistische Beiträge deutscher und französischer Entomologen eine ziemlich grosse Artenzahl kennen gelernt haben.

In den Jahrgängen 1857—1864 der „Berliner Entomologischen Zeitschrift“, welche in den Beiträgen zur Käferfauna Griechenlands von Schaum, Kraatz und Kiesenwetter das erste Mal im Zusammenhange die damals aus Griechenland und Creta bekannten Arten mit Ausnahme derjenigen der Cerambycidae, Chrysomelidae, Coccinellidae und einiger kleiner Familien brachten, werden wir mit einer für die damalige Zeit schon recht bedeutenden Artenzahl bekannt gemacht.

Während diese Beiträge noch im Erscheinen begriffen waren, brachte Miller in dem Jahrgang 1862 der „Wiener Entomologischen Monatsschrift“ einen Beitrag zur Fauna der Inseln Corfu und Kephalaria, wodurch unsere Kenntniss der griechischen Coleopteren wiederum wesentlich vermehrt wurde.

Seit dieser Zeit erfolgte eine längere Pause, in der zwar in verschiedenen Zeitschriften von verschiedenen Autoren neue Arten aus Griechenland beschrieben, andere, als auch in Griechenland vorkommend, bekannt gemacht wurden, aber keine zusammenhängende faunistische Arbeit publizirt wurde.

In neuerer Zeit hat namentlich Reitter in „Deutsche Entomologische Zeitschrift“ 1884, theils in Verbindung mit den Herren

Thamnurgus Eichh.

- * 1. *euphorbiae* Küst. Att. auf Wolfsmilch (Krüper).

Tomicus Latr.

- * 1. *6-dentatus* Boerner. Tayg. (Krüper).
- 2. *curvidens* Grm. Kephal.

Dryocoetes Eichh.

- * 1. *villosus* F. Unter Rinde von *Castanea vesca* im westlichen Cret. (Oertzen).

Xyleborus Eichh.

- * 1. *dispar*. F. Griechenl. (Krp.).
- * 2. *Saxeseni* Ratzeb. El., Cret. (Brenske, Oertzen)¹⁾.
- * 3. *dryographus* Ratz. El. (Brske.)
- * 4. *monographus* F. El. (Brske., Oertzen).

Trypodendron Steph.

- * 1. *domesticum* L. Eub. (Krp.).
- * 2. *lineatum* Ol. Parn. (Oertzen).

Platypidae**Platypus** Hbst.

- * 1. *cylindrus* F. El. (Oertzen).
- * 2. *oxyurus* Dufour. Parn., Eub. (Oertzen, Emge).

Cerambycidae.**Spondylis** F.

- * 1. *buprestoides* L. Tayg. (Krp.).

Prionus Geoffr.

- * 1. *coriarius* L. Vel., El., Eub. (Krüper, Emge, Oertzen).
- 2. *asiaticus* Falb. Griechenl.

¹⁾ Auf Creta unter der Rinde wilder Birnbäume.

Ergates Serv.

- * 1. *faber* L. Tayg., Eub., Kephal. (Krüper, Emge, Oertz.)¹⁾.

Macrotoma Serv.

- * 1. *scutellaris* Germ. Olympia (Dr. Purgold), Cret. (Oertz.)²⁾.

Aegosoma Serv.

- * 1. *scabricorne* Scop. Parn., Akarn., Eub. (Krüper).

Vesperus Latr.

- 1. *creticus* Gglb. El.³⁾,

Stenocorus Geoffr.

- * 1. *sycophanta* Schrnk. Vel. (Krüper).
- * 2. *bifasciatus* F. Parn. (Krp.).
- * 3. *inquisitor* L. Parn., Vel., El., Eub. (Krüp., Brske., Emge).

¹⁾ 1 Exemplar fand ich unter der Rinde von *Abies cephalonica* Loud. auf dem Ainos (Monte nero). Die Insektenfauna, welche diese Linne belebt, ist fast dieselbe wie die der Apollo-Tanne auf dem griechischen Festlande und auf Euboea.

²⁾ Von dieser in Griechenland sehr seltenen Art fand Herr Dr. Purgold 1 Stück im neuen Museum in Olympia; den Thorax eines Exemplares fand ich in einem alten Stamm von *Castanea vesca* in Creta.

³⁾ In Folge eines Missverständnisses gab Ganglbauer dieser Art den Namen „*creticus*“. Das einzige bisher bekannte Exemplar dieser Art stammt nicht aus Creta, sondern wurde in dem Dorfe Kumania in Elis von dem Lehrer Panagiotis Papalias gefangen und mir von diesem überbracht.

Rhamnusium Latr.

- * 1. *bicolor* Schrnk. Parn., Olymp (Krüper).

Leptorrhabdium Kr.

- 1. *gracile* Kr. Griechenl.

Toxotus Serv.

- * 1. *meridianus* Pnz. Eub. (Emge).
- 2. *Lacordairei* Pascoë. Griechl.

Acmaeops Leconte.

- * 1. *collaris* L. Parn., El. (Krüp., Brenske).

Cortodera Muls.

- * 1. *femorata* F. Eub. (Emge).

Grammoptera Serv.

- * 1. *ustulata* Schall. Parn., Vel., El., Cret. (Krüp., Brnske, Oertzen).

- * 2. *ruficornis* F. Aetol., Eub. (Emge).

Leptura L.

- 1. *Krüperi* Ganglb. Eub.
- * 2. *impunctata* F. Parn. (Krüp.).
- 3. *bisignata* Brll. Thessal., Att., El.
- * 4. *livida* F. Att., Parn., El. (Emge, Krüper, Brenske).
- 5. *pallens* Brll. Att., Mor., Eub.
- 6. *picticornis* Rtrr. Att., Cret. ¹⁾.
- * 7. *fulva* Deg. Parn., Eub. (Emg.).
- 8. *rufa* Brll. Att., Parn., Mor. v. *Silbermanni* Lef. Att.
- * 9. *rubra* L. Olymp, Oet., Vel., Akarn., Eub. (Krp., Emg.).

¹⁾ Auf Kümmelblüthen in den Gärten des Dorfes Elos im westl. Creta fand ich diese Art nicht selten.

- *10. *cordigera* Fuessl. Att., Akarn., Eub., El., Cret. (Emge, Brenske, Oertzen) ¹⁾.
- *11. *scutellata* F. El. (Brenske).
- *12. *dubia* Scop. Parn., Eub. (Oertzen, Emge).
- *13. *sanguinolenta* F. Eub. (Emge).
- 14. *montana* Muls. Cret.
- *15. *erratica* Dalm. Eub. (Emge).
- *16. *sexmaculata* L. Vel. (Krüp.).
- *17. *chrysomeloides* Schrnk. El. (Brenske).
- *18. *maculata* Poda. Att., Aetol., Olymp, Mor., Eub. (Krüp., Oertzen, Emge).
- *19. *aethiops* Poda. Olymp (Krüp.).
- *20. *pubescens* F. Olymp (Krüp.).
- 21. *verticalis* Germ. Parn., Vel., Eub.
- *22. *melanura* L. Att., Olymp (Emge, Krüper).
- *23. *bifasciata* Müll. Parn., Mor., Eub. (Krüper, Oertzen, Emge).
- 24. *emmipoda* Muls. Parn.
- *25. *septempunctata* F. Parn., Oet., Aetol., Mor. (Krüp., Emge).
v. *suturata* Rche. Mor.
- *26. *nigra* L. Aetol. (Emge).

Necydalis L.

- * 1. *major* L. Olymp, Parn., Vel., Tayg. (Krüper).

¹⁾ Die Stücke aus Cret. unterscheiden sich durch gelbliches Toment des Halsschildes und der Beine sowie durch die Fleckenzeichnung der Flügeldecken von den griechischen Stücken.

- | | |
|--|---|
| Molorchus F. | Oxypleurus Muls. |
| * 1. minor L. Parn., Eub. (Krüp., Emge). | 1. Nodieri Muls. Griechenl. |
| Brachypterooma Heyd. | Hesperophanes Muls. |
| 1. ottomanum Heyd. Eub. | * 1. sericeus F. Att., El. (Emge, Oertzen). |
| Stenopterus Ol. | * 2. cinereus Vllrs. Eub. (Emge). |
| * 1. flavidornis Küst. Att., El. (Oertzen). | * 3. griseus F. Att. (Emge). |
| * 2. rufus L. Att., Mor. (Oertz., Emge). | Stromatium Serv. |
| * 3. praeustus F. Cret. (Oertz.). | * 1. unicolor Ol. Olymp, Att., Eub., El., Cret. (Krüper, Oertzen, Gregorios). |
| Callimoxys Kr. | Criocephalus Muls. |
| 1. gracilis Brll. Olymp. | * 1. rusticus L. Att., Eub. (Emge). |
| Callimus Muls. | Cyamophthalmus Kr. |
| * 1. angulatus Schrnk. Parn. (Krüper). | 1. moesiacus Friv. Att. |
| * 2. femoratus Grm. Olymp (Krp.). | Asemum Eschsch. |
| Cartallum Serv. | * 1. striatum L. Olymp (Krüper). |
| * 1. ebulinum L. Att. (Krüper, Emge, Oertzen). | Anisarthron Redt. |
| Dilus Serv. | 1. barbipes Charp. Griechenl. |
| * 1. fugax Ol. Eub. (Krüper, Emge). | Callidium F. |
| Obrium Latr. | * 1. Kollari Redt. Parn. (Krüp.). |
| 1. bicolor Kr. Akarn. | 2. lineare Hampe. Att., Aeg., El. auf Mandelbäumen. |
| Gracilia Serv. | * 3. variabile L. Parn., Eub. (Krüper). |
| * 1. minuta F. Auf Castanea vesca und auf Wiesen im westl. Cret. (Oertz.). | * v. analis Redt. Cret. (Oertz.). |
| Exilia Muls. | * 4. lividum Ross. Olymp (Krp.). |
| 1. timida Mén. Parn. (Krüp.). | * 5. alni L. Att. (Emge). |
| Axinopalpus Redt. | * 6. unifasciatum Ol. Vel. (Krp.). |
| 1. gracilis Kryn. Parn., Akarn. | * 7. glabratum Charp. Olymp (Krüper). |
| Icosium Luc. | 8. aeneum Deg. Parn., Vel., Tayg., Kephal. |
| 1. tomentosum Luc. | * 9. sanguineum L. Griech. Festl., Eub., Cret. (Krüp., Emge, Oertzen). |
| v. atticum Gglb. Att. | |

- Rhopalopus* Muls.
- * 1. *femoratus* L. Eub., El.
(Emge, Oertzen).
 - * 2. *clavipes* F. Att., Poros,
Mor., Eub., Olymp (Emge,
Heldreich, Krüper).
 - 3. *hungaricus* Hbst.
 - * v. *insubricus* Grm. Tayg.
(Krüper).
- Semanotus* Muls.
- * 1. *russicus* F. Olymp, Parn.,
(Krüper).
- Hylotrupes* Serv.
- * 1. *bajulus* L. Att., Poros, El.,
Tayg. (Emge, Heldreich,
Oertzen, Krüper).
- Clytus* Laich.
- * 1. *detritus* L. Eub., Cret.
(Emge, Oertzen)¹⁾.
 - * 2. *arcuatus* L. Aetol., Eub.,
Cret. (Krüper, Emge,
Oertzen).
 - 3. *Bobelayei* Brll. Aetol.
 - 4. *scalaris* Brll. Akarn., Aetol.
 - * 5. *floralis* Pall. Thessal., Att.,
Parn., Akarn.
 - * 6. *rusticus* L. Parn. (Krüper).
 - * 7. *arvicola* Ol. Olymp, Parn.,
Mor. (Krüper, Oertzen)²⁾.
 - * 8. *antilope* Zett. El. (Brenske).
 - * 9. *arietis* L. Eub. (Emge).
 - 10. *rhamni* Germ. Olymp, Att.,
Tayg., Kephal.
- *11. *verbasci* L. Att., Parn., El.
(Emge, Krüper, Oertzen).
12. *nigripes* Brll. Att., Parn.,
Mor., Aeg.
- *13. *aegyptiacus* F. Att., Eub.
(Oertzen, Emge).
- *14. *massiliensis* L. Olymp, Oet.,
Parn., Att., Cret. (Krüper,
Emge, Oertzen).
- *15. *figuratus* Scop. Olymp, Parn.,
Akarn., El., Eub. (Krüper,
Emge).
- *16. *speciosus* Schneid. Parn.,
Tayg., Eub. (Krüper).
- Anaglyptus* Muls.
- * 1. *mysticus* L. Parn. (Krüper).
- Rosalia* Serv.
- * 1. *alpina* L. Olymp, Parn.,
Aetol., Mor. (Krüper),
Ossa (Stussiner).
- Calchaenesthes* Kr.
- 1. *oblongomaculata* Guér. Tayg.,
Eub.
- Purpuricenus* Fisch.
- * 1. *Köhleri* L. El., Eub. (Oertz.,
Emge).
 - v. *cinctus* Villa. Griechenl.
 - 2. *budensis* Göze.
v. *affinis* Brll. Griechenl.
 - 3. *Desfontainei* F. Dor., Akarn.,
Thessal., Mor.
 - 4. *dalmatinus* Strm. Att., Mor.,
Nax.
- Cerambyx* L.
- * 1. *velutinus* Brll. Att., Parn.,
Akarn., El., Cret. (Krp.,
Brenske, Oertzen).
 - * 2. *cerdo* L. Parn., Eub. (Krp.,
Emge).

1) Die Larven dieser Art fand ich zahlreich unter der Rinde von abgebrochenen Stämmen der *Castanea vesca*.

2) Im Walde von Kumani auf Haselnuss-Stauden.

- * v. acuminatus Mot. El.
(Oertzen).
- v. Pfisteri Stierl. Griechenl.
- * 3. miles Bon. Att. (Emge).
- 4. nodulosus Germ. Att.
- * 5. Scopolii Füssl. Vel., Tayg.,
Eub. (Krüper, Emge).

Aromia Serv.

- * 1. moschata L. Parn. (Krüp.).

Acanthocinus Steph.

- * 1. aedilis L. Tayg. (Krüper).
- * 2. costatus F. Parn., Tayg.
(Krüper).

- * 3. griseus F. Parn., Vel. (Krp.).

Exocentrus Muls.

- * 1. punctipennis Muls. Akarn.
(Emge).

Acanthoderes Serv.

- 1. Krüperi Kr. Akarn.

Pogonochaerus Latr.

- * 1. fasciculatus Deg. Olymp,
Parn., Tayg., El. (Krüp.,
Brenske).
- 2. Plasoni Gglb. Griechenl.

Belodera Thoms.

- * 1. Troberti Muls. Att. (Krüp.,
Emge).

Parmena Latr.

- 1. pilosa Brll. Att., Akarn.,
Tayg.
- 2. pubescens Dalm. Griechenl.

Dorcadion Dalm.

- 1. lugubre Kr. Thessal.
- * 2. lineatocolle Kr. Aetol. (Krp.).
- 3. femoratum Brll. Griechenl.
- 4. minutum Kr. Parnes, Boeot.,
Parn., Aetol.

- v. Brenskei Gglb. Korinth.
- 5. Heldreichi Kr. Parn.
- 6. atticum Kr. Att., Parn.
- v. corecyricum Gglb. Corf.
- v. Parnassi Kr. Parn.
- 7. Krüperi Gglb. Thessal.
- 8. Emgei Gglb. Arkad.
- 9. Oertzeni Gglb. Att.
- 10. divisum Germ.
- v. granigerum Gglb. Att.
- v. insulare Kr. Nax.¹⁾.
- 11. Eugeniae Gglb. Arkad., Vel.
- 12. 4-maculatum Küst. Att., Eub.

Neodorcadion Gglb.

- 1. Virleti Brll. Dor., Aetol.,
Nördl. Mor., Kephal.,
Corf.
- 2. bilineatum Grm. Dor., Corf.
- 3. fallax Kr. Ol.

Herophila Muls.

- 1. tristis L. Griech. Festl.,
Corf., Kephal., Zant.,
Nax., Cret.
- 2. Fairmairei Thoms. Parn.

Morimus Serv.

- * 1. funereus Mls. Ossa, Olymp
(Krüper).
- 2. asper Sulz. Parn., El., Eub.,
Kephal.

Monochamus Latr.

- * 1. galloprovincialis Ol. Olymp,
Tayg. (Krüper, Emge).

Mesosa Serv.

- * 1. curculionoides L. Griech.
Festl., Eub. (Krüper,
Brenske, Emge).

¹⁾ Von dieser Art fing ich
♂♂ von 11—14,5 und ♀♀ von
13—17 mm. Länge.

Niphona Mls.* 1. *picticornis* Mls. Att. (Emge).*Calamobius* Guér.* 1. *gracilis* Creutz. Att., Parn., Akarn. (Oertzen, Krüp.).*Agapanthia* Serv.* 1. *Kirbyi* Gyll. Att., Parn. (Emge, Oertzen).2. *aspmodeli* Latr. Att., Parn., Kephali.3. *cynarae* Germ. Att., Parn., Kephali., Cret.* 4. *lineatocollis* Don. Tayg. (Krüper).5. *maculicornis* Gyllh. Griechl.* 6. *cardui* L. Att. (Emge, Oertz.).* 7. *cyanea* Hbst. Parn., Akarn. (Krüper, Emge).8. *Lais* Reiche. Mor.* 9. *lateralis* Gglb. El, (Brske.).*Saperda* F.* 1. *populnea* L. Att. (Krüper).* 2. *scalaris* L. Vel., Aetol., Olymp (Emge, Krüper).* 3. *punctata* L. Akarn., Aetol., Parn. (Krüper).*Tetrops* Steph.* 1. *praeusta* L. Att., Oet., Aetol., Eub., Parn. (Krüper, Emge, Oertzen).*Stenostola* Muls.1. *alboscutellata* Kr. Parn.*Oberea* Muls.* 1. *oculata* L. Parn., Oet., Vel. (Emge, Krüper).* 2. *euphorbiae* Grm. Eub. (Emg.).* 3. *insidiosa* Mls. Tayg., Eub. auf Wolfsmilch (Krüper, Emge).4. *linearis* L. Att., Parn.*Phytoecia* Muls.* 1. *affinis* Harrer. Olymp (Krüp.).2. *cephalotes* Küst. Griechenl.3. *fumigata* Küst. Att.4. *virgula* Charp. Att., Corf.* 5. *pustulata* Schrnk. Att. (Krüp.).6. *geniculata* Mls. Att., Olymp.* 7. *rufimana* Schrnk. Att., Parn. (Oertzen, Krüper).v. *Baccueti* Brll. Tayg.* 8. *virescens* F. Att., Parn., Nax. (Emge, Oertzen Krüper).*Cardoria* Muls.1. *orbicollis* Rche. Griechenl.*Oxylia* Muls.1. *Duponcheli* Brll. Att., Parn.*Pilemia* Fairm.* 1. *hirsutula* Froel. Att., Parn. (Emge, Krüper).*Helladia* Fairm.1. *flavescens* Brll. Att.*Coptosia* Fairm.1. *albovittigera* Heyd. Att.*Mallosia* Muls.1. *graeca* Strm. Att., Parn., Dor., Mor.**Chrysomelidae.***Orsodacna* Latr.* 1. *cerasi* L. Att., Eub., El. (Emge, Brenske).