

21
Faunae Insectorum Germanicae
Initia

Deutschlands Insecten

herausgegeben
von

Dr. G. W. F. Panzer
Ites Heft.

Nürnberg
in der Felseckerschen Buchhandlung.

Bibliotheek
der

Landbouwhoogeschool
WAGENINGEN

Bibliotheek der
Landbouwhoogeschool

353

D 1

R

SAPERDA tremula.

Der hallische Zitterbock. Der Achtpunkt. Der punktirte Schneckenkäfer.

Saperda tremula : viridis thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris. *Fabric. Syst. Ent. n. 15. p. 186. Spec. Ins. T. I. n. 19. p. 234. Mant. Ins. T. I. n. 28. p. 149.*

Schaeffer Ic. Ins. Ratisb. tab. 101. fig. 1.


Harrer Besch. d. Schäff. Ins. 1. Th. n. 340. p. 208.

Schrank Enum. Ins. Austr. n. 267.

v. Laichard. tyr. Ins. 2. Th. n. 2. p. 32.

Auf Linden, Obstbäumen, doch nicht alle Jahr gleichhäufig.
Ausser Halle, Regensburg, Nürnberg, Wien, Mainz, auch an mehreren Orten Deutschlands.

a. Der Kopf vorwärts.



Saperda tremula Fabr.

SAPERDA oculata.

Augigter Bockkäfer. Augigter Schneckenkäfer. Schildaugenbockkäfer.

Saperda oculata: thorace luteo, punctis duobus atris, elytris nigris.

Fabric. Syst. Ent. n. 3. p. 184. Spec. Ins. T. I. n. 4. p. 231. Mant. Ins. T. I. n. 6. p. 147.

Cerambyx oculatus. Linn. Syst. nat. n. 60. p. 633. ed. XIII. n. 60. p. 1841.

Leptura oculata. Scop. carn. n. 152. fig. 152.

Schaeff. Ic. Ins. Rat. tab. 128. fig. 4.

Harrer Besch. d. Schöff. Ins. 1. Th. n. 344. p. 209.

v. Laichard. tyr. Ins. 2. Th. n. 8. p. 42.

Nicht selten. An Obstbäumen, und verschiedenen Staudengewächsen. Die Fühlhörner sind meist so lange als die Flügeldecken, nicht aber so lange, als das ganze Insekt.



Saperda oculata Fabr.