

H. ALURNOIDES Thomson.

Patrie : Cayenne.

Long. 17 à 18 mill. ; larg. 9 mill.

Pl. 9, fig. 3.

1 individu ♂. Coll. de Mniszech.

Tête, antennes, labre, mâchoires, prothorax, écusson, poitrine, pattes et tarsi noirs; les pénultièmes avec quelques reflets métalliques. Palpes bruns. Élytres d'un jaune très clair; deux taches transversales noires avec des reflets violets, commençant au tiers antérieur, et descendant obliquement vers les bords latéraux; deux taches très larges à l'extrémité.

Tête fortement ponctuée, excepté sur l'occiput; deuxième article des antennes avec des points enfoncés. Labre lisse. Mandibules très ponctuées. Prothorax avec des petits points très fins et assez distants les uns des autres. Écusson lisse. Élytres substriées, très finement et très légèrement ponctuées; poitrine ponctuée; saillies inférieures thoraciques et abdomen, lisses et brillants. Pattes ponctuées.

DESCRIPTION**D'UNE ESPÈCE DE BATOCERA.**

Je crois être agréable aux lecteurs des *Archives* en leur offrant la description suivante d'un magnifique insecte, que j'ai déjà publié dans le Magasin de Guérin, mais sans le figurer.

BATOCERA VICTORIANA Thomson.

Rev. et Mag. de Zool. 1856, p. 529.

Patrie : Borneo.

Long, 62 mill. ; larg : 19 à 20 mill.

Frontispice.

Diffère de la *B. Ajax* par sa forme moins allongée et comparativement plus large. Couleur générale des élytres d'un brun parfois luisant; ces dernières recouvertes le plus souvent, surtout chez le ♂, d'une pubescence jaunâtre, avec de nombreuses taches de même couleur.

♂. Cinquième et dixième articles des antennes avec des excroissances convexes en dehors et concaves en dedans; chez les sixième, septième, huitième et neuvième articles, cette excroissance est rudimentaire; elle n'existe plus dans les onzième et douzième articles.

Deux taches blanches sur les joues, se prolongeant en dessous du prothorax jusqu'à la poitrine; deux taches jaunes en dessus, au milieu. Écusson blanc. Naissance des élytres avec des granulations moins prononcées que chez les autres espèces du genre; taches très irrégulières, grandes et affectant des formes plus ou moins bizarres, suivant les individus. Poitrine blanche sur les côtés, avec deux grandes taches d'un brun soyeux au milieu.

Abdomen brun, pattes de même couleur, sauf les antérieures, qui sont noirâtres.

Je ferai remarquer à cette occasion que ma *Cerosterna voluptuosa*, Rev. et Mag. de Zool. 1856, p. 529, ne me paraît être qu'une variété de l'*Oplophora (Cerosterna) Horsfieldii* Hope. Trans. Ent. Soc. of London, vol. IV, 1845-47, p. 42, pl. 1, figure 2.



Nisus pinus

Levan

Cataglyphis Vietnamiensis

Imp. Sin.