

SYNOPSIS DU GENRE TRACHYSOMUS.

1^{er} février 1858.

TRACHYSOMUS Serv., Ann. Soc. Ent., 1835, p. 40.

— Buquet, Ann. Soc. Ent., 1852, p. 349.

1. TRACHYSOMUS FRAGIFERUS Kirby (*Lamia*), Trans. Linn., XII, p. 440.

— *fragifer* Serv. Ann. Soc. Ent., 1835, p. 40.

— *monstrosus* Dej. Cat., 3^e édit., p. 369.

Patrie : Brésil. Long. 17 à 19 mill.; larg. 7 à 9 mill.

D'un brun obscur; antennes à articles annelés de jaune; quelques petites taches blanchâtres vers le tiers postérieur.

Court. Prothorax subépineux. Deux très fortes bosselures tuberculeuses sur la partie antérieure des élytres, qui sont arrondies à l'extrémité. Corps rugueux.

2. TRACHYSOMUS GIBBOSUS Buquet, Ann. Soc. Ent. 1852, p. 354,
pl. 7, fig. 4.

Patrie : Brésil. Long. 20 à 22 mill.; larg. 8 à 9 mill.

Tête, prothorax, écusson, extrémité des élytres, ainsi que les deux taches transversales au tiers postérieur de ces dernières, bruns; reste des élytres grisâtre. Deux taches blanches sur les bords latéraux du prothorax.

Allongé. Deux fortes bosselures tuberculeuses sur la partie antérieures des élytres, qui sont coupées obliquement à l'extrémité.

Je cite textuellement les diagnoses de M. L. Buquet pour les trois espèces suivantes, que je ne possède pas :

3. TRACHYSOMUS ELEPHAS Buquet, Ann. Soc. Ent., 1852, p. 351,
pl. 7, fig. 1.

Patrie : Brésil. Long. 28 mill.; larg. 12 mill.

Modice elongatus, rufo-ferrugineus. Thorace lateribus, elytrisque apice flavescens. Abdomine pedibusque rufo-variegatis.

4. TRACHYSOMUS CAMELUS Buquet, Ann. Soc. Ent., 1852, p. 352,
pl. 7, fig. 2.

Patrie : Brésil. Long. 25 mill.; larg. 11 mill.

Modice elongatus, rufus, thorace lateribus, elytris pedibusque albo-variegatis.

5. TRACHYSOMUS DROMEDARIUS Buquet, Ann. Soc. Ent., 1852, p. 353,
pl. 7, fig. 3.

Patrie : Brésil. Long. 26 mill.; larg. 11 mill.

Modice elongatus, albogriseus. Capite, thorace, elytris basi lacteo maculatis. Abdomine pedibusque flavo-variegatis.

6. TRACHYSOMUS BUQUETHI Thomson.

Patrie : Brésil. Long. 22 a 23 mill.; larg. 9 à 10 mill.

1 indiv. Coll. de l'auteur.

D'un brun terreux. Tête et prothorax jaunâtres sur les bords latéraux. Antennes également jaunâtres après leur cinquième article. Mandibules noires; palpes bruns. Un peu après le milieu de la longueur des élytres, une large tache grise, transversale, mal limitée antérieurement, bordée d'un noir velouté postérieurement; de cette bordure s'échappent plusieurs filets longitudinaux également noirs; saillies postérieures garnies de poils d'un jaune clair soyeux. Dessous du corps et pattes poilus, variés de jaune brunâtre.

Allongé. Un espace clair, subquadrangulaire au milieu du front, entre les yeux, limité supérieurement par deux faibles saillies tuberculeuses; occiput avec une carène longitudinale médiane, au milieu de laquelle court une ligne assez bien marquée quoique légère; premier article des antennes tuberculeux. Prothorax tuberculeux, surtout latéralement, mutique, subquadrangulaire; à sillon transversal antérieur formé par des lignes en zig-zag; ligne médiane très profonde en arrière, faiblement ponctuée antérieurement. Ecusson grand, arrondi. Elytres allongées, un peu plus larges antérieurement et garnies d'un tubercule à l'angle huméral; antérieurement, deux très fortes élévations gibbeuses garnies de tubercules épineux; deux saillies vers l'extrémité qui est subaiguë; disque offrant quelques tubercules par ci par là, ainsi que quelques points obsolètes sur les bords latéraux. Dessous du corps et pattes poilus, non ponctués.

Rapporté du Brésil par M. F. Chabrillac, et dédié à M. Lucien Buquet.

7. TRACHYSOMUS PEREGRINUS Thomson.

Patrie : Brésil. Long. 14 mill.; larg. 6 à 7 mill.

Brunâtre. Tête variée d'une couleur blanchâtre, ayant des petites taches noires, plus nombreuses antérieurement; sur l'occiput, trois taches rondes d'un noir velouté, dont deux en dessus et une en dessous; antennes obsolètement annelées de jaune, sauf le premier article qui est blanchâtre; mandibules noires; palpes bruns. Prothorax également blanchâtre sur les bords latéraux seulement, recouvert par ci par là d'un duvet clair. Ecusson recouvert d'un duvet semblable. Elytres devenant blanchâtres sur les bords latéraux postérieurs, où l'on aperçoit quelques filets noirs; après le milieu de leur longueur, deux grandes taches d'un noir velouté en forme de demi-cercle, ne se réunissant pas cependant à la suture; saillies postérieures recouvertes de poils soyeux jaunâtres. Abdomen blanchâtre. Pattes obscures.

Médiocrement allongé. Deux faibles crêtes transversales entre les yeux; antennes non ponctuées; ligne médiane de l'occiput légère, mais bien marquée. Prothorax subquadrangulaire, tuberculeux, inerme; sillons transversaux peu apparents; ligne médiane élevée, ayant une impression profonde après le milieu de sa longueur. Ecusson arrondi. Elytres un peu plus larges antérieurement, et garnies d'un petit tubercule à l'angle huméral; antérieurement deux élévations gibbeuses garnies de tubercules épineux; deux saillies vers l'extrémité qui est arrondie; quelques tubercules par ci par là sur le disque. Dessous du corps et pattes non ponctués.

Rapporté du Brésil par M. F. Chabrilac.

